

藥品辨義

二

藥品辨義卷中

吳門尤乘生洲父增補

氣藥類

凡氣藥皆屬辛香。辛香則通氣。取其疎利導滯。為快氣。破氣。行氣。清氣。順

氣。降氣。提氣之用。非補氣藥也。肺藥脾藥門。有補氣之品劑。

桔梗  
陳皮

主治氣膈。為升提開散之品

桔梗

屬

陰

體

乾

色

白而淡黃

氣

和

味

微苦。云

性

涼。云

帶辛。非

溫。非

能升力

主開提。升氣以利膈。

性氣味

俱薄。

入

脾

二經。

故屬

陰也。

或問桔梗爲舟楫之品。浮而不沉者也。何以下氣。生洲曰。桔梗甘而微苦。爲陽中之少陰。甘者戀膈。苦者下氣。故初則戀膈。久則下氣。

桔梗是根。根主上行。其氣味俱薄而清。輕清者升。是以專入肺經。與甘艸並用。爲舟楫之劑。如入涼膈散。偕硝黃諸品。以導胸中。使不峻下。入四物湯。同歸芍等。以治咽嗑。取其居於上焦。提載之力也。因其味苦。苦亦能發。若欬嗽喘急。痰火之邪。鬱在肺中。及利下腹痛。乃肺金之氣。鬱在大腸。取其苦以開之也。又氣味俱清。如風熱壅閉。頭目不清。咽痛不利。鼻塞不通。及胸膈痞

又能通天氣於地道也

陳皮辛以醒脾同藿香之竄以開脾治霍亂良

滿能上行入表達竅之先劑也倘下虛及怒氣併血病火病炎上者切不可用南產者佳北產者味甘但能提載不能開發用者別之

陳皮屬陽中乾大色皮黃氣香而味辛性溫有陰體而輕肉白氣細

能升能力理脾性氣薄味厚入脾兼走各經

陳皮留白取其入肺氣香入脾因體大則緩緩

則遲下故主上部而和中味辛則散散則分解

故泄氣逆而快膈痰涎嘔逆穀食酒毒功在枳

殼蘇梗之上。以其性溫能補肺脾。須藉監制之藥用之。助參芪暖胃。佐白朮健脾。和甘艸益肺。同半夏滲濕。合青皮去滯。參竹茹治呃。且辛香泄氣。如目痛脇脹。盛怒動氣。俱忌用之。因主至高之分。故曰陳皮治高氣。青皮治低氣。此言大略。然亦通用。廣產者佳。取其陳久燥氣全消。溫中而不燥。行氣而不峻。故曰陳皮。

香附  
烏藥

主治氣鬱。爲快滯散結之品。

香附  
屬

陽中微體

重實色

紫氣

香味

辛重。苦微。云甘非。

辛香能  
開鬱故  
用香附  
蒼朮苦  
寒能泄  
火故用  
本連梔  
柏然三  
黃之寒  
得蒼附  
而不滯  
蒼附之  
香得三  
黃而不

性溫而燥能降力快性氣重而入肺肝經

香附辛主散苦主降用以疎氣開鬱非獨女人之聖藥也但女性偏滯多氣多鬱尤宜疎散耳因氣香燥用童便製之凡氣橫行胸臆痞悶不舒及客熱氣滯藉以降下而解散也因味辛散乃用醋炒佐入肝經以理兩脇及小腹痛凡血瘀經滯藉以行氣而快滯也若炒黑治淋瀝及崩漏蓋因氣鬱以此疎之順其氣而血自止也

燥其互  
以成功  
乃治鬱  
火嘈雜  
之症。

食不自  
膈也或  
由氣寒  
或因火  
鬱然后  
停食而

由血隨氣行。血藥中多用之。但氣實而血不大

虛者為宜。若氣虛者用之。愈損其氣。燥其血矣。

故血虛崩漏者。又不可用。童便浸一日一換。多製妙。忌鐵器。

烏藥屬陽中微體堅實色肉蒼氣雄味辛帶性微苦

溫能升降力行性氣厚而入脾腎經

烏藥氣雄。性溫。故快氣宣通。疎散凝滯。甚於香

附。外解表而理肌。內寬中而順氣。以此散寒氣。

則客寒冷痛自除。驅邪氣。則天行疫瘴。即却開。

平膈島  
藥快氣  
溫中佐  
以梔子  
最效

平胃散  
中蒼朮  
味甘而  
辛甘入  
脾辛燥  
溫厚朴  
性溫味  
苦溫則  
快脾苦  
則燥溫  
故二物

鬱氣中惡腹痛胸膈脹滿頓然可減疎經氣中

風四肢不遂初產血氣凝滯漸次能通皆藉其

氣雄之功也

米泔水浸透產天台者佳切片微炒

厚朴  
腹皮

主治氣滿為平胃寬脹之品

厚朴屬

陽中有陰有土與火體重色

紫

氣

微辛香

味

微辛

性

微溫

能

升

能

降

力

泄實滿

性

氣

與味俱厚

入

胃

經

厚朴性味辛溫能散去寒濕之邪帶苦能降泄

腸胃之實因脾胃惡濕以此燥之專平胃氣主

可以平  
敦阜之  
土。陳皮  
泄氣。甘  
艸和中。  
氣泄自  
無溫滯  
之患。淫  
去則有  
健運之  
能。一補  
一泄。用  
藥之則  
也。

瀉中焦壅滯。若胸腹脹滿。鬱而不散。食積於胃。

留而不行。非此不能條達舒暢。故用治痞悶噎

氣吞酸。嘈雜嘔吐。同解散肌表之藥。却衛氣有

餘。助分理陰陽之劑。清大腸多阻。但瀉而腹痛

有積滯者。用之為宜。若暴瀉如水。滑瀉無度者。

腸胃已虛。忌此辛散。

厚而色紫者佳。去粗皮。挫。忌荳同食。食之動氣。

大腹皮屬

陽

體

輕

色

蒼

氣

和

味

微鹹。云

性

涼。云

苦辛非

溫。云

寒能升能降力

消腫

性氣

與味俱入。肺脾胃

薄而淡。大小腸

五經

大腹皮。皮主走表。故能寬脹。味鹹。飲物。故能消腫。體質輕枯。輕可去實。用此疎通脾肺之鬱。氣味淡薄。主滲泄。用此暢利腸胃之滯。若皮膚浮腫。若脚氣脹痛。若鼓脹之陰陽不能升降。獨此爲良劑。丹溪常用之。故疑爲有毒。或輕爲賤物。皆非其意矣。

其樹多栖鴆鳥。恐染鴆毒。宜以酒淨。或鹹湯淨晒乾。

木香  
栝郎

主治氣壅。爲調中降下之品。

木香屬

陽體重而堅

色蒼

氣香味

辛而苦

性熱

能升

降力

調諸氣

性氣

與味俱厚

入肺脾

四經

歸脾湯

用木香

交通之

使也火

苑氣滯

脾氣不

醒不能

上通於

心下達

於肝失

其統屬

之令矣

木香香能通氣和合五藏爲調諸氣要藥蓋諸氣積鬱皆屬於肺故上焦氣滯用之爲金鬱則泄之也中氣不運皆屬於脾故中焦氣滯用之爲脾喜芳香也大腸氣閉則後重故下焦氣滯用之爲塞者通之也以此治痞悶噎氣水腫腹脹痢疾脚氣皆散滯調氣之功但辛香屬陽陽

參芪朮  
草歸芎  
之滯得  
木香之  
疎達肝  
心脾三  
經流通  
無碍矣

則升浮。如中焦下焦結滯。須佐枳郎。墜之下行。

因性香燥。同黃連黃芩治痢疾。同黃栢防已治

脚氣。皆藉寒藥以製其燥。則用斯神矣。若怒氣

拂鬱攻衝。遍身作痛。以此使肺氣調。則肝氣自

伏。若肝氣鬱。致脇肋小腹間痛。同青皮疎之。令

肝氣行。則血順痛止。惟兒科痘瘡實熱者忌用。

廣產者體重如枯骨而堅。咬之沾牙則良。臨用切片勿令隔宿。恐走香氣。減力效少。

檳郎屬陰中體實重色紫有氣和味辛性溫能降沉

力

破結滯

性氣

輕而入肺胃

大腸

三經

檳榔體重而實味厚而沉沉實主降專墜諸藥

以導中焦下焦結滯之氣也故能逐水氣消穀

食除痰癖削積塊追諸蟲攻脚氣通痢疾後重

數症之功性若鐵石驗如奔馬東垣言之詳矣

但瀉至高之氣較枳實青皮尤甚不可過服

頂尖

狀如雞心者佳閩粵人佩服以逐瘴氣同類頂平者名大腹子功力不及宜辨

萊菔子

卽蘿蔔子

爲下氣消食之品

萊菔子屬

陽體細而色肉潤皮黃氣炒味辛性溫而

能

升降

力

氣下

性

氣與味俱厚

入

胃肺脾

三

經

經

萊菔子

體

細

性

銳

味

辛

能

升

熟

則

能

降

入

肺

生

用

吐

風

痰

散

風

寒

發

瘡

疹

降

則

定

喘

嗽

調

下

後

重

止

氣

痛

用

之

寬

中

滿

解

鬱

結

長

於

利

氣

味

甘

氣

香

走

脾

而

助

胃

化

食

治

老

幼

之

佳

珍

丹

溪

云

萊

菔

子

治

痰

有

衝

墻

倒

壁

之

功

必

取

生

用

耳

畧炒香研用

不宜經久

用

久

用

久

用

久

用

久

用

久

用

久

蘇梗枳壳主治氣逆爲寬胸利膈之品。

蘇梗屬陽體乾而色青氣和味甘微性微能升

降力氣順諸性氣與味俱薄入肺脾三經

蘇梗體質中通。通可去滯。能使鬱滯上下宣行。

凡順氣諸品。惟此純良。其性微溫。比枳殼尤緩。病之虛者。寬胸利膈。疎氣而不迅下。如安胎飲。

順氣養陰。入消脹湯。散虛腫滿。葉梗子鈴各分功用向來混列

枳殼屬陰體乾大色淡黃氣微味苦微辛性微

而能降力利肺氣性氣薄而入肺脾胃四經

枳殼色白味苦專利肺氣因體質大則性寬緩

而遲下通利結氣而不致驟泄故主上焦以治

氣分因味帶辛用之散滯療胸膈間痞滿寬膨

脹逐水氣消痰飲推宿食順氣逆止欬嗽又肺

與大腸為表裏兼寬大腸以除結痢驅痔漏理

腸風抑其氣以行血使胎前無滯佐白朮安胎

最為神妙凡快氣之品勿宜多用枳殼枳實本一種也大者

曰壳小者曰實。  
用陳久者良。

枳實 青皮 主治氣結為調胃瀉肝之品。

枳實屬純體實色黃氣香而味大苦微辛性寒

而能降力泄胃性氣與味入脾胃三經

枳實色黃味大苦專泄胃實因體質中則性猛

酷而速下開導堅結有推牆倒壁之功故主中

脘以治血分療臍腹間實滿消痰癖驅停水逐

宿食破結胸通便閉非此不能也若痞滿者因