

王氏醫案續編卷二 原名本齋志



秀水盛鈞少雲

續輯

錢塘周鑠光遠



南京中医药大学图书馆版权所有

古杭王士雄孟英醫案

此案步步合法
特少一番蕩滌
之功故覺少延
時日耳然涼劑
已畏其寒若加
蕩滌之品必不
敢服此治病之
所以難也

莊芝階舍人之外孫汪震官。春前陡患赤癥。孟英診之。脈滑數。
而沈面赤苔黃。手足冷過肘膝。當臍鞭痛。小溲濇少。伏熱爲病。
也與大劑芩連卮。棟滑石丹皮砂仁。延胡查麴銀花草決明等。
藥兩服。手足漸溫。而腳背紅腫起泡如蒲桃大。一二十枚。四服。
後腹痛減。苔退而渴。於原方去查麴砂仁。加白頭翁、赤芍、海螵。

至
此

王氏醫案續編卷二 原名本齋志



秀水盛鈞少雲

續輯

錢塘周鑠光遠



南京中医药大学图书馆版权所有

古杭王士雄孟英醫案

此案步步合法
特少一番蕩滌
之功故覺少延
時日耳然涼劑
已畏其寒若加
蕩滌之品必不
敢服此治病之
所以難也

莊芝階舍人之外孫汪震官。春前陡患赤癥。孟英診之。脈滑數。
而沈面赤苔黃。手足冷過肘膝。當臍鞭痛。小溲濇少。伏熱爲病。
也與大劑芩連卮。棟滑石丹皮砂仁。延胡查麴銀花草決明等。
藥兩服。手足漸溫。而腳背紅腫起泡如蒲桃大。一二十枚。四服。
後腹痛減。苔退而渴。於原方去查麴砂仁。加白頭翁、赤芍、海螵。

至
此

旬日後痢色轉白。而腿筋抽痛。乃去丹皮滑石赤芍。加鷄金橘紅生苡石斛。兩服痛止。洩長糞色亦正。腳胞潰黃水而平。穀食

此救法好

熱久傷陰也。古人急下存陰之法。原以防

合法。

遂安。改用養胃陰清餘熱之法而愈。聞孟英治此證。每劑銀花

輒兩許。尙須半月而瘳。設病在他家。焉能如此恪信。苟遇別手。

斷無如此重劑。况在冬春之交。誠古所未有之痢案。後人恐難

企及。

吳馥齋室新產後。嘔吐不止。湯水不能下嚥。頭痛癟多。苔色白。

○此○瘀○飲○挾○肝○氣○上○逆○也○故○方○以○降○氣○滌○飲○爲○治○

滑。孟英用蘇梗橘半。吳萸茯苓旋覆薑皮柿蒂紫石英竹茹一

劑知二劑已。

此證明明虛寒
何以作虛寒治
不效蓋虛寒乃
此人之本體而
痰咳乃新受之
外邪不治其邪
而專補其虛則
邪無出路以致
積補生熱此舌
胎之所以黃膩
也孟英以清熱
化痰爲治尚是
治藥誤也

鄭媼患咳嗽自覺痰從腰下而起吐出甚冷醫作腎虛水泛治漸至咽喉阻塞飲食礙進卽勉強嚥之而胸次梗不能下便溏溲頻無一人不從虛論孟英診曰脈雖不甚有力右部微有絃滑苔色黃膩豈屬虛證以葷莖湯合雪羹加貝母知母花粉竹茹麥冬枇杷葉柿蒂等藥進十餘劑而痊

滿洲少婦懷娠漏血醫投補藥漏如故間或不漏則吐血延踰二載腹中漸動孕已無疑然血久溢於上下甚至納食卽吐多醫不能治孟英診之脈滑數有力是氣實而血熱也證不屬虛一半治病一半

補藥反能助病愈補愈漏胎無血蔭而不長其所以不墮者氣

分堅實耳。與大劑清營藥。血溢遂止。而稀沫頻吐。得飲卽嘔。
 渴心忡氣短似促。乃用西洋參、麥冬、知母、石斛、枇杷葉、竹茹、柿蒂、生白芍、木瓜、重加烏梅投之。覆杯卽安。次日能喫飯矣。

此俗所謂、蝦、蟆、漚也。

珠小輝太守令媛驟患頤腫。連及脣鼻。乃至口不能開。舌不得出。孟英視之曰。溫毒也。用射干、山豆根、馬勃、羚羊、薄荷、銀花、貝母、花粉、杏仁、竹黃爲劑。并以紫雪搽於脣內。錫類散吹入咽喉。外將橄欖核磨塗腫處。果吐齰涎而腫漸消。詰朝卽啜稀粥。數日而愈。

一男子患便血。醫投溫補。血雖止而反泄瀉浮腫。延及半年。孟

七。

英診之脈數舌絳。曰此病原溼熱溫補翻傷陰液。與芩連后。○桑葉丹皮銀花石斛棟實冬瓜皮鼈甲鷄金等藥旬餘而愈。

院痛何以按溫補不問可知其誤矣。

補藥因寒熱氣逆自汗不寐登圊不能解而臥則稀水自流口

渴善嘔杳不納穀僉云不起矣乃父速孟英診之脈絃數而滑

產後肝血大虧所以陰虛肝失血養故陽獨盛。

日本屬陰虧肝陽侮胃誤投溫補澀滯之劑氣機全不下降

以致諸證蠻起醫者見而卻走是未明其故也與沙參竹茹棟實延胡、僵、連、橘、貝、杏、斛、枇杷葉爲肅肺以和肝胃法覆杯卽安但少腹隱隱作痛於前方去杏貝竹茹加知母花粉蕤蓉白芍橘

核海蛇乃解宿垢而瘳。

此肺痛之根

PRINTED IN THE UNITED STATES OF AMERICA
BY THE UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE

周子朝患惡寒頭痛發熱。酷似傷寒。而兼心下疼脹。孟英脈之。
先○解○表○後○清○裏○右部沈滑苔黃不渴。溲如蘇木汁。先以葱豉湯加卮連杏貝婁。

橘爲方。服後微汗。而不惡寒反惡熱。雖湯飲略溫。卽氣逆欲死。

孟英曰。客邪解矣。清其痰熱可也。與知母花粉杏貝旋滑斛橘。

杷茹茅根蘆根地栗海蛇等藥。果吐膠痰甚多。而納食漸復。惟動則欲喘於肅上之中。佐以滋下爲善。其後而瘥。

濮樹堂室懷妊五月患春溫。口渴善嘔。壯熱無汗。旬日後始汎孟英視之。見其煩躁譫語。苔黃不燥。曰痰熱阻氣也。病不傳營。

孟英於溫熱痰飲獨有心得故遇此等證如摧枯拉朽合觀諸案可以得治溫病之法

血藥禁用。試令按其胸次。果然堅痛。而大解仍行。法當開上。用小陷胸加石菖蒲。枳實。杏貝。茹鬱。卮翹等藥。蘆菔湯煎服。服劑神情卽安。四帖心下豁然。惟心腹如焰。嘔吐不納。改投大劑。甘寒加烏梅。頻啜漸康。秋閒得子亦無恙。

胡振華以花甲之年。患溺後出血水甚痛。自云溲頗長激似非火證。孟英察脈有滑數之象。與元參。生地。犀角。卮棟。槐蕊。側柏。知母。花粉。石斛。銀花。甘草。梢綠豆等藥。旬日而瘳。踰四載以他疾終。

管氏婦自去秋患赤痢。多醫罔效。延至暮春。孟英診脈絃數。苔

黃渴飲腹脹而墜。五熱夜甚。用白頭翁湯合金鈴子散加芩芍。卮斛吞駐車丸。浹旬而愈。

三

凡厥逆脈伏之證其熱深藏多不易解非卓識亦必搖於眾議

解表

濮樹堂室病。孟英甫爲參愈。而樹堂繼焉起。卽四肢厥逆脈伏惡寒發熱頭痛。左爲甚。惟口渴。因與葱豉二帖。熱雖退。脈仍伏。四肢冷過肘膝。大解頻行。人皆疑爲虛寒。孟英曰。此證儼似陰厥。然渴飲洩赤。真情已露。豈可泥於一起卽厥。而必定其爲寒乎。徑投涼解。熱果復發。而肢冷脈伏如故。幸病者堅信服藥不疑。至第七日。大便瀉出紅水。溺則管痛。嘔惡煩躁。徹夜不瞑。人更危之。孟英曰。熱邪旣已下行。可望轉機。以白頭翁湯加銀花。

通草芩芍茹滑知斛卮棟羚角之類。投三日紅水始止。四肢漸和。頗有昏瞀譫語。用王氏犀角地黃湯一劑。四肢熱而脈顯數。苔轉灰黃。大渴遺溺。病人自述如卧烘箱上。於昨方加入元參銀花竹葉生石膏知貝卮斛。服一劑夜間卽安寐。而苔轉黑燥。於昨方復加花粉。服一劑熱退。而頭面汗多。嬾言倦寐。小溲病已陰虛於下。將愈何病之有。欲解不通。諸戚友咸以爲危。各舉所知。而羣醫僉云挽救不及。病家惶惑。孟英曰。此證幸初起。卽予診視。得盡力以爲死裏求生之舉。非比他人之病。皆因誤治致危。然不明言其險者。恐病家惶惑。而築室於道旁也。今生機已得。不過邪去。真陰未復。但

當恪守予法。自然水到渠成。切勿二三其德。以致爲山虧簣。賴有一二知音。竟從孟英議。服西洋參。生地。蕤蓉。麥冬。棟芍。知母。藥一劑。溺行索粥。再服而黑苔退。三服而神清音朗。舌潤津回。唯有嗽痰不能吐。左偏頭微痛。於原方加二至桑菊。貝母。牡蠣。又復五劑。得解鞭矢一次。各患始安。眠食漸適而瘳。

陳足甫溲後見血。管痛異常。減餐氣短。孟英以元參。生地。知母。棟實。銀花。側柏葉。卮子。桑葉。丹皮。綠豆爲方。藕湯煎服。二劑病大減。乃去丹皮。柏葉。加西洋參。熟地。服之而瘳。

王開榮偶患腹中絞痛。自服治痧諸藥。而大便瀉血如注。孟英

伏暑在內。香燥可以益熱。

弦滑者痰也大者熱也

診之左頗和右關尺絃大而滑面色油紅喘逆不寐與葦莖湯
合金鈴子散加銀花側柏葉卮斛芩連二帖後面紅退血亦
乃裁柏葉銀花加雪羹枯荷梗又二帖始發熱一夜得大汗周
時而腹之痛脹爽然若失卽能安寐進粥改投沙參知母花粉
桑葉杷葉石斛白芍橘絡杏仁冬瓜子茅根荷梗三帖大解行
而脈柔安穀

肺氣不清

熱結在肺

陳叟久患痰嗽氣逆夏初因惡寒自服理中湯遂痰中帶血氣
喘而厥二便不通冷汗腹脹孟英察脈洪大按腹如烙與葦莖
湯加卮棟旋貝花粉海蛇外以田螺大蒜車前草搗貼臍下卽

溺行而平。

高某患兩膝後筋絡痠疼略不紅腫臥則痛不可當徹夜危坐

孟英切脈虛細苔色黃膩咽燥溺赤

培其下○井井有法○陰虛於下火○煎劑以治其上○丸藥以

枝竹瀝爲方送虎潛丸旬日而瘳。

楊某方作事不知背後有人潛立回顧失驚遂不言不食不寐

不便別無他苦孟英按脈沈絃以石菖蒲遠志琥珀膽星旋貝

竹黃杏仁省頭草羚羊角爲劑化服蘇合香丸二帖大解行而

啜粥夜得寐而能言復與調氣寧神蠲飲藥數日霍然

趙聽樵令妹每汎至則腹脹嘔吐腰脊痠疼兩腿腫痛筋掣腕

用氣逆

用血虛

俱肝氣橫逆之證。其發於汛期者。肝失所養也。孟英先平肝驅痰而後養血柔肝。亦先標後本之法。

病甚至瘡厥。多藥不效。孟英以金鈴子散合左金加二陳竹茹枳實桂苓數劑而愈。續用蕤蓉菟絲淫羊杜仲桑葚木瓜續以補之。利而去其弊。香附歸芍茴棟調之。汛至如期。略無痛苦。初冬適楊子樸尋卽受孕。

病不甚重治亦合法而難收捷效者。以陰虛之體不勝溫熱之氣也。此卽四損設治不如法則危矣。

濮東明令孫女。素稟陰虛。時發夜熱。少餐不寐。仲夏患感發疹。血熱。汛不當期而至。孟英用犀羚知貝石膏生地厄翹花粉甘草竹葉蘆根等藥。滲透神清。唯鼻燥異常。吸氣入喉。辣痛難忍。甚至肺熱。肺中餘熱。血因熱而虛。肢冷復於方中加元參竹茹菊葉荷梗。各患始減。而心忡吐沫。不可正治之例。改投西洋參生地麥冬小麥竹葉黃連真

珠、百合貝母、石斛、牡蠣、龜板、蔗汁、諸藥而愈。季秋適姚益齋爲室。

金亞伯廷尉筵室產後惡露不行。渴瀉痰多。孟英以北沙參、滑石、生薏苡、生扁豆、蛤殼豆、卷石斛、竹茹、枇杷葉、琥珀茯苓等藥數劑而愈。

廿

廿一

廿二

廿三

葉氏云溫邪中人首先犯肺其次則入心正此病也

顧竹如孝廉令媛患感十餘日。耳聾不語。昏不識人。而客未入室。彼反先知醫以爲祟。凡犀角地黃牛黃清心復脈等湯。徧服無效。已摒擋後事矣。所親濮根匡囑其延診於孟英。脈至渴數下。證已悉備矣。舌不能伸。苔色黃膩。遺溺便祕。目不交睫者已四晝夜。胸腹按

雖不用下劑而
通經透絡之品
大劑用之亦足
以蕩滌邪穢

之不柔。與白虎湯去米草加石膏元參犀角鼈甲花粉杏仁。
竹葉竹黃竹沥投一劑卽諳語滔滔渠父母疑藥不對病孟英
曰不語者欲其語是轉機也再投之大渴而喜極熱之飲又疑
涼藥非宜孟英姑應之曰再服一劑更方可也三投之痰果漸
止四劑後舌伸便下神識漸清乃去菖蒲石膏犀角鼈甲加生地石斛麥冬貝母數帖熱盡退而痰味甚鹹又去杏貝竹黃加西洋參牡蠣龜板蓴蓉服之全愈踰年失怙繼遭祝融鬱損情懷誤投溫補至戊申年殞

邵魚竹給諫患感楊某作瘧治不應始迓孟英診之脈稊汗多熱爲溼所

持、故、脈、更、、、、、、
熱不甚壯。苔色厚膩。嘔惡煩躁。痰多腿痠。顯是溼溫。因謂其令
郎子旅曰。溼溫者。溼蘊久而從時令之感以化熱也。不可從表
治。更勿畏虛率補。與宣解一劑。各恙頗減。奈眾楚交咻。謂病由
心力勞瘁而來。况汗多防脫。豈可不顧本原。羣醫附和。遂服參
增溼益熱。宜乎不救。
歸熟地之藥。病日以劇。最後吳古年診之云。此溼溫也。何妄投
補劑。然已末從挽救。交十四日而殞。始悔不從王議。

康康侯司馬之夫人。久傷謀慮。心火外浮。面赤齒疼。因啖西瓜。
此寒溼鬱閉其熱也。用辛通淡滲之。則斯愈矣。
遂脘悶不舒。喜得熱。按泄瀉不饑。自覺舌厚數寸。苔色灰膩。孟
英與厚朴滑石。葱白薤白枇杷葉橘皮薄荷旋覆省頭草。一劑