

心臟方 凡八類

心臟脈論第一 論一首

論曰心主神神者五臟專精之本也為帝王監領四方夏王七十二日位在南方離宮火也有生之來謂之精兩精相搏謂之神所以任物謂之心神者心之藏也舌者心之官故心氣通於舌舌和則能審五味矣心在竅為耳夫心者火也腎者水也水火相濟心氣通於舌舌非竅也其通於竅者寄見於耳左耳丙右耳丁循環炎宮上出脣口知味榮華於耳外主血內主五音心重十二兩中有三毛七孔盛精汁三合神名叅主藏神號五神居隨節應會故云心臟脈舍神在氣為吞在液為汗心氣虛則悲不已實則笑不休心氣虛則夢救火陽物得其時則夢燭灼心氣盛則夢喜笑及恐畏厥氣客於心則夢邱山烟火凡心臟象火與小腸合為腑其經手少陰與太陽為表裏其脈洪相於春王於夏夏時萬物茂盛垂枝布葉皆下垂如曲故名曰鈎心脈洪大而長洪則衛氣實實則氣無從出大則榮氣萌萌洪相薄可以發汗故名曰長長洪相得即引水漿灌溉經絡津液皮膚太陽洪大皆是母軀幸得戊己用牢根株陽氣上出汗見於頭五內乾枯胞中空虛醫反下之此為重虛脈浮有表無裏陽無所使不但危身并中其母夏脈如鈎夏脈心也南方火也萬物之所以盛長也故其氣來盛去衰故曰鈎反此者病何如而反其氣來盛去亦盛此謂太過病在外其來不盛去反盛此謂不及病在內太過則令人身熱而膚痛為浸淫不及則令人煩心上見咳唾下為氣泄心脈來累累如連珠如循琅玕曰平夏以胃氣為本心脈來喘喘連屬其中微曲曰心病心脈來前曲後居如操帶鈎曰必死真心脈至堅而搏如循薏苡子累累然色赤黑不澤毛折乃死夏胃微鈎曰平鈎多胃少曰心病但鈎無胃曰死胃而有石曰冬病石甚曰今病心臟脈脈舍神恍惚思慮則傷神神傷則恐懼自失破腠脫肉毛色悴天死於冬手少陰氣絕則脈不

通少陰者心脈也。心者脈之合也。脈不通則血不流，血不流則髮不澤，面黑如漆，紫者血先死，壬篤癸死，水勝火也。心死，臟浮之實如豆，麻擊手按之益躁疾者，死。夏心火王，其脈浮大而散。一作洪曰：平反得弦細而長者，是肝之乘心母之歸子為虛邪，雖病易治；反得大而緩者，是脾之乘心子之乘母為寔邪，雖病自愈。反得沉濡而滑者，是腎之乘心水之尅火為賊邪，大逆十死不治。反得微澀而短者，是肺之乘心金之陵火為微邪，雖病即瘥。腎乘心必癰，左手關前寸口陰絕者，無心脈也。若心下熱，痛掌中熱，時時善嘔，口中傷爛，刺手少陽治陽，左手關前寸口陰實者，心實也。是心下有水氣，憂恚發之，刺手心主治陰。心脈來累累如貫珠，滑利，再至曰平，三至曰離經，病四至脫精，五至死，六至命盡。手少陰脈也。心脈急甚為瘰癧，微急為心痛，引背食不下，緩甚為狂笑，微緩為伏梁，在心下上下行，有時吐血，大甚為喉痹，微大為心痺，引背善淚，出小甚為善噦，微小為消痺，滑甚為善渴，微滑為心疝，引臍小腹鳴瀉，甚為瘡微瀉，為血溢，維厥耳鳴顛疾。心脈搏堅而長，當病舌卷不能言，其濡而散者，當病痛渴，自己一作渴作環，赤脈之至也。喘而堅，註曰有積氣在中，時害於食，名心痺，得之外疾思慮，而心虛故邪從之。扁鵲曰：心有病則口生瘡腐爛。心在聲為笑，在變動為憂，在志為喜，喜傷心，精氣并於心，則喜心虛則悲，悲則憂，實則笑笑則喜。時主夏病者，時間時甚，知其源取其腧，觀其應審其害。病先發於心者，心痛一日之肺喘咳三日之肝脇痛，支滿五日之脾閉塞不通，身痛體重三日不已，死。冬夜半夏日中，病在心，日中慧，夜半甚，平旦靜。假令心病北行，若食豚魚得之，不者當以冬時發得病以壬癸日也。凡心病之狀，胸內痛脇支滿兩脇下痛，膺背肩甲間痛，兩臂內痛，虛則胸腹大，脇下與腰背相引而痛，取其經手少陰太陽舌下血者，其變病刺郄中血者。心脈沉之小而緊，浮之不喘，苦心下聚氣而痛，食不下，喜咽唾，時手足熱煩滿，時忘不樂，喜太息，得之憂思。心病其色赤，心痛短氣，手掌煩熱，或啼笑罵詈悲思愁慮，面赤身熱，其脈實大而數，此為可治。宜服關宜服者藥春當刺中衝，夏刺勞宮，季夏刺大陵，皆補之。秋刺間使，冬刺曲澤，皆寫之此是肝心當灸巨闕五十壯，背第五椎下即生心則心痛善驚時並小兒見有餘火而開

心中寒者其人病如噉絳蘆狀劇者心痛徹背背痛徹心如蠶注其脈注者自口入
頭面赤而下重心中痛徹背自煩發熱當臍跳手其脈弦此為心臟傷所致也 邪哭使魂魄不安者血
氣少也血氣少者屬於心心氣虛者其人即畏合目欲眠夢遠行而精神離散魂魄妄行陰氣衰者即為
癰陽氣衰者即為狂五臟者魂魄宅舍精神之所依托也魂魄飛揚者其五臟空虛也即邪神居之神靈
所使鬼而下之脈短而微其臟不足則魂魄不安魂屬於肝魄屬於肺肺主津液即為涕泣出肺氣衰者
即泣出肝氣衰者魂則不安肝主善怒其聲呼 心水者其人身體腫重一作而少氣不得卧煩而躁其陰
大腫 真心痛手足清至節心痛甚者旦發夕死夕發旦死 心腹痛懊懣發作腫聚往來上下行痛有
休作心腹中熱善渴涎出者是蛇咬也以手聚而堅持之無令得移以大針刺之久持之蟲不動乃出針
腸中有蟲蛇咬皆不可取以小鍼 心脹者煩心短氣卧不安 凡心脈急名曰心疝小腹當有形其以
心為牡藏小腸為之使故小腹當有形 診得心積沉而芤時上下無常處病胸滿悸腹中熱面赤咽乾
心煩掌中熱甚則唾血身癰癰主血厥夏差冬劇色赤也 心之積名曰伏梁起於臍上上至心大如臂
久久不愈病煩心心心痛以秋庚辛日得之何也腎病傳心心當傳肺肺適以秋王王者不受邪心復欲還
腎腎不肯受因留結為積故知伏梁以秋得之 心病煩悶少氣大熱熱上湯心嘔咳吐逆狂強語汗出
如珠身體厥冷其脈當浮今反沉濡而滑其色當赤而復黑者此是水之尅火為大逆十死不治 微音
人者主心聲也心聲笑其音等其志喜其經手少陰厥逆太陽則榮衛不通陽陰反錯陽氣外擊陰氣內
傷傷則寒寒則虛虛則驚悸心悸定心湯主之 方見第十四卷 語聲前寬後急後聲不續前混後濁口喎冒昧好
自笑此為厲風入心荊瀝湯主之 方見前 心虛風寒半身不遂骨節離解緩弱不收便利無度口面喎邪
姜附湯主之 第八卷 此病不盈旬日宜急治之又笑而呻呻而反憂此為水尅火陰擊陽陰起而陽伏伏
則實實則傷熱熱則狂悶亂冒昧言多謬誤不可採聽此心已傷若其人口唇正赤可療青黃白黑不可

瘡也

心病為瘡者令人心煩甚欲得清水反寒多不其熱

方見前第十卷

若其人本來心性和平而忽弊急反

於常白水酒主之

方見前第八卷

或言未竟便住以手剔脚爪此人必死禍雖未及名曰行尸此心病聲之候也

虛則補之實則瀉之不可治者明以察之

赤為心心合脈赤如雞冠者吉心主舌舌是心之餘其火

形相比於上徵赤色廣則兌面小頭好肩背脾腹小手足行安地疾行搖肩背肉滿有氣輕財少信多慮

見事明了好顧急心不壽暴死耐春夏不耐秋冬感而生病主手少陰寥寥然鶻肝長短傾正則心

應之正赤色小理者則小小則邪弗能傷易傷以憂粗理者則心大大則虛虛則寒寒則憂不能傷易

傷於邪無鶻肝者則心高高則實實則熱熱則滿於肺中悶而善忘難開以言鶻肝小短舉者則心下下

則藏外易傷於寒易恐以言鶻肝長者則心堅堅則藏安守固鶻肝弱以薄者則心脆脆則善病消瘴熱

中鶻肝直下不舉者則心端正端正則和利難傷鶻肝向一方者則心偏傾偏傾則操持不一無守司也

下云若鶻肝小短薄弱而下則心下下則虛虛則傷寒病憂患內損心暴痛而好唾清涎口臭蟲齒痛侵唇齒若鶻肝高起則心高高則實實則熱熱則滿於心悶而善忘恐悸喉燥口痛牙癰舌傷小兒則便秘

方見頭面方中

凡入部分陷起者必有病生小腸太陽為心之部其處陷起即病生矣藏舍內外部亦

內外沉濁屬內浮清居外若外病內入小腹滿起內病裏出所部陷沒外入內前治陽後補陰內出外前

補陰後瀉陽陽則實熱陰則虛寒在陽主外在陰主內凡人死生休咎則藏神前變形於外人心前病則

口為之開張若心前死則枯黑語聲不轉若天中等分墓色應之必死不治看應增損斟酌賒促賒則不

出四百日內促則不延旬月之間心病少愈而卒死何以知之曰赤黑色黯黯如博碁見顏度年上此必

卒死心絕一日死何以知之兩目回回直視肩息立死凡面赤目白憂患慮心氣內索面色反好急求

棺槨不過十日死又面黃目赤不死如衄血血死吉凶之色若在於分部臍臍而見赤黑入口此必死

不出其年名曰行尸若年上無應三年之中病必死矣夏火心脈色赤主手太陽也夏取盛經分腠夏

者火始治心氣始長脈瘦氣弱陽氣留溢熱熏分腠內至於經故取盛經分腠絕膚而病去者邪居淺也

下其支者後走腋後廉上繞肩甲循頸出足太陽之筋前結於耳後完骨其支者入耳中直出耳上下結於頸上屬目外眥其脈起於小指之端循手外側上腕出踝中直上循臂骨下廉出肘內側兩骨之間上循臑外後廉出肩解繞肩甲交肩入缺盆向腋絡心循咽下膈抵胃屬小腸其支者從缺盆循頸上頰至目銳眥却入耳中其支者別頰上頰抵鼻至目內眥斜絡於顴合手少陰為表裏少陽本在兌骨之端應在背後同會於手太陰其手太陽之別名曰支正上腕五寸內注少陰其別者上走肘絡肩髃主心生病病寔則小腸熱熱則節弛弛則陽病腸脈大反逆於寸口再倍病則嗑痛頰腫耳聾目黃卧不能言悶則急坐虛則小腸寒寒則生蛇蛇則陰病陰脈反小於寸口過於一倍病則短氣百節痛筋急頸痛不能轉顧此盡是手太陽小腸經筋脈支別為病今取心主胞絡少陰心經附於後手心主之別名曰內關去腕五寸甲乙作二寸出於兩筋間循經以上繫於心包絡心系氣寔則心痛虛則為煩心取之兩筋間手心主之脈起於胸中出屬心包下膈歷絡三焦其支者循胸出脇下腋三寸上抵腋下循臑內行太陰少陰之間入肘中下臂行兩筋之間入掌中循中指出其端其支者別掌中循小指次指出其端也是動則病手心熱肘臂攣急腋腫甚則胸脇支滿心中澹澹大動面赤目黃善笑不休是主脈所生病者煩心心痛掌中熱為此諸病甚則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者則寸口大一倍於人迎虛者則寸口反小於人迎手少陰之別名曰通理在腕後一寸別而上行循經入咽中系舌本屬目系其寔則大膈虛則不能言取之掌後一寸別走太陽手少陰之脈起於心中出屬心系下膈絡小腸其支者從心系上挾咽系目系系目系一作循胸出脇其直者復從心系却上肺出腋下下循臑內後廉行太陰心主之後下肘內廉循臂內後廉抵掌後兌骨之端入掌後內廉循小指之內出其端是動則病嗑乾心痛渴而欲飲是為臂厥是主心所生病者目黃脇滿痛臑臂內後廉痛厥掌中熱痛為此諸病盛則瀉之虛則補之盛者則寸口大再倍於人迎虛者則寸口反小於人迎手少陰之脈獨無輸何也曰少陰者心脈也心者五

臟六腑之大主為帝王精神之所舍其臟堅固邪不能容容之則傷心心傷則神去神去則身死故諸邪在於心者皆在心之包絡包絡者心主之脈故少陰無輸也少陰無輸心不病乎曰其外經腑病臟不病故獨取其經於掌後兌骨之端也 夏三月主心小腸赤脈攢病其源從少陰太陽之氣相搏而停則榮衛不通皮肉痛起太陽動發少陰淫邪之氣因而作則臟腑隨時受夏疫病也其病相若腑虛則為陰邪氣所傷身戰脈掉捉所不禁若臟實則為陽毒所侵肉熱口開舌破咽塞聲嘶故曰赤脈攢病方見傷寒卷中 扁鵲云灸腎肝心三腧主治丹一作毒病當依源為治表治陰陽調和臟腑疾不生矣

心虛實第二脈四首方十一首

心實熱 左手寸口人迎以前脈陰實者手少陰經也病苦閉大便秘不利腹滿四肢重身熱名曰心實熱也

石膏湯 治心熱實或欲吐吐而不出煩悶喘急頭痛方 石膏一斤 淡竹葉 香豉各一升 小麥 地骨皮

茯苓 三兩 梔子仁三十枚

取二升去滓分三服外台名瀉肺湯 右七味咬咀先以水一斗五升煮小麥竹葉取八升澄清次下諸藥煮

衍義 靈樞云手少陰之脈獨無腧少陰心脈也心者五臟六腑之大主也精神之所舍也其臟堅固

邪弗能容也容之則傷心心傷則神去神去則死矣故諸邪之在於心者皆在於心之包 包受邪

則欲吐不吐煩悶喘急故宜石膏清熱降火為主但知石膏解利陽明熱邪不知本經原有中風寒

熱心下逆氣諸治中藏梔子豉湯主心下懊憹為清膈熱之專藥竹葉解煩清心合地骨皮主五內邪

氣熱中消渴以本經與枸杞同列不分不知實為地骨皮主治也小麥雖為肝穀能助少火而通心包

與瀉心湯中用人參助長諸藥同意彼主乾嘔故用半夏此治心熱故用石膏淡竹同治心熱而所主

各有攸宜也

半夏瀉心湯 治老小下利水穀不消腸中雷鳴心下痞滿乾嘔不安方 人參 黃芩 甘草各一兩 乾

姜一兩 黃連一兩 半夏半升 大棗十二枚 右七味咬咀以水八升煮取二升半分三服并治霍亂治寒

加附一校渴加桂枝二兩啗加枳實一兩痛加黃連一兩
大黃黃連瀉心湯 治心氣不足吐血衄血方 大黃二兩 黃連二兩 黃芩各一 右三味咬咀以水三升

者取一升頓服亦治霍亂

衍義

半夏瀉心湯在傷寒治心下滿而不痛在金匱治嘔而腸鳴心下痞千金借以治下利腸鳴心

下痞滿乾嘔似與心臟無關然痞滿雖屬太陽其瑕正在心下駸駸上犯心包不得不以芩連祛熱半

夏滌痰乾姜導火人參甘棗補正祛邪為務也 大黃黃連瀉心湯在傷寒治心下痞按之濡關上脈

浮之證在金匱治心氣不足吐血衄血與千金主治相同總取芩連以清三焦之火大黃以蕩六腑之

滯乃救心包蘊熱之專藥餘說見十卷傷寒門甘草瀉心湯下

心小腸俱實

左手寸口人迎以前脈陰陽俱實者手少陰與巨陽經俱實也病苦頭痛身熱大便難心

腹煩滿不得臥以胃氣不轉水穀實也名曰心小腸俱實

竹瀝湯

治心實熱驚悸喜笑恐畏悸懼不安方

淡竹瀝 生地黃汁各二兩 石羔八兩 芍藥 白朮

人參

梔子仁各三兩

赤石脂

紫苑 知母

茯苓各二兩

右十一味咬咀以水九升煮十味至二升

七合去滓下竹瀝更煎取三升若須利入芒硝二兩去芍藥分三服

衍義

胃為五臟之本心為五臟之主胃氣不得轉運外則身熱內則便難包絡之火散漫無以主持

神識故用參朮茯神實其中土則火不致於乘虛內擾地黃芍藥石膏知母竹瀝梔子仁得以建清心

降火之功紫苑開結氣於上石脂固藥力於下也

茯神散

治心實熱口乾煩渴眠臥不安方

茯神

麥門冬各三十

通草

升麻各三

紫苑

桂心各

八兩

知母

赤石脂

大棗

淡竹茹

右十味治下

節為粗散以綿裹方寸匕井花水

二升半煮取七合時動裏子為一服日再

衍義

前竹瀝湯治胃氣不能轉運故用人參白朮杜心包火於內此以肺燥不能勝熱故用麥門冬

桂心蒸發津氣於上又以升麻通草上升下泄輔佐清熱導火之方紫苑赤石脂知母茯神與前竹瀝湯不殊也

安心散 治心熱滿煩悶驚恐方 白芍藥 遠志 宿姜 茯苓 赤石脂 麥門冬 知母 紫苑 石膏 石參 人參 桂心 麻黃 黃芩 甘草 右十五味治下篩為粗散

先以水五升淡竹葉一升煮取三升去滓煮散一方寸匕半以絹裏時動之前取八合為一服日再

行義 此兼竹瀝湯茯神散二方之製方中麻黃遠志酸棗即茯苓散中升麻桂心麥門冬之義人參甘草黃芩即竹瀝湯中人參白朮梔子之義三方合究其微則滋中寓清清中寓散散中寓清之法了然心目矣

然心目矣 治不能食胸中滿膈上逆氣悶熱方 炙心腧二七壯小兒減半

心虛寒 左手寸口人迎以前脈陰虛者手少陰經也病苦悸恐不樂心腹痛難以言心如寒恍惚名曰心虛寒也

茯苓補心湯 治心氣不足善悲愁恚怒衄血面黃煩悶五心熱或獨語不覺咽喉痛舌本強冷涎出作汗善忘恐走不定婦人崩中面色赤方 茯苓 桂心 甘草 紫石英 人參 麥門冬 大棗 赤小豆 右八味咬咀以水七升煮取二升分三服

行義 人參茯苓補心少陰氣分石英桂心補心少陰血分甘草大棗乃參苓之匡佐麥門冬赤小豆乃英桂之報使并開泄心包旺氣以療喉舌諸疾石英兼行足厥陰而主婦人崩中以其溫經散結也

半夏補心湯 治心虛寒心中脹滿悲憂或夢山邱平澤者方 半夏 宿姜 茯苓 桂心 枳實 橘皮 白朮 防風 遠志 右九味咬咀以水一斗煮取三升分三服

行義 茯苓補心湯兼調肝氣半夏補心湯兼調脾氣方中桂心宿姜溫補心脾枳實橘皮半溫理胃氣

茯苓佐桂心下導虛陽防風佐白朮上散濁濕遠志一味通心氣之專藥

牛髓丸 通治百病虛弱等方 牛髓 羊髓 棗膏 白蜜 酥 麥門冬 芫蕒 桂心

當歸

茯苓

一作神

甘草

各三

錢

乾地黄

乾姜

各三十

人參

五味子

防風

各一

白朮

各二

細

辛

右十九味

切搗

十四味

篩別

研棗膏

和散

次內諸髓

蜜和攪

令相得

內銅鉢中

於釜沸湯中

煎取

堪作丸

如梧子大

酒服三十丸

煎取

堪作丸

如梧子大

酒服三十丸

稍加至四十丸

日再

衍義

牛髓丸

治百病虛弱

調五臟

以心為君

主諸臟之氣

靡不稟之於君

方用桂心

茯苓

以補心

芫蕒

當歸

以調肝

乾姜

白朮

以溫脾

芫蕒

當歸

以調肝

乾姜

白朮

以溫脾

人參

麥冬

以益肺

地黃

五味

以滋腎

甘草

棗膏

以和胃

二髓

以充髓

羌防

細辛

以司督脈

而禦外邪

不但兼調

五臟

并以交濟

陰陽

則四維

奠安

而九重

盡謐

矣

心小腸俱虛

左手寸口人迎

以前脈陰陽俱虛者

手少陰與巨陽經俱病也

病苦洞泄苦寒少氣四肢

厥

腸澼

名曰心小腸俱虛

大補心湯

治虛損不足

心氣弱悸

或時妄語

四肢損

變氣力

顏色不榮

方

黃芩

附子

各一

甘草

二

錢

桂心

阿膠

茯苓

麥門冬

乾地黄

桂心

阿膠

各三

半夏

遠志

石膏

各四

生薑

六兩

飴糖

一斤

大棗

十二

右十四味

取十三味

咀以水一斗五升

煮取五升

湯成下糖

分四服

衍義

方下所主

虛損不足

心氣弱悸

而方所用

反屬足少陰

巨陽之藥

其義云何

夫君主之令

良由

相火所司

故專取桂附

收攝虛陽

則麥門冬

阿膠

茯苓

乾地黄

石膏

清肅心包

遠志

交通心腎

若腎志不虧

遠志似可不用

水臟無泄

附子儘可

勿施語言

無妄心包

原無火擾

石膏亦宜裁酌

四肢安和

脾陽猶能自強

姜棗飴糖量減未為不可師

古

人方須要得古人意

活法在心

奚必固守成則哉

補心丸

治臟虛善恐

怖如魘狀

及婦人產後餘疾

月經不調

方

當歸

防風

芫蕒

附子

芍藥

甘草

蜀椒

乾姜

細辛

桂心

半夏

厚朴

大黃

猪苓

各一

茯苓

一作神

遠志

各二

右十

六味

為末

蜜丸

如梧子大

酒服五丸

日三不知加至十九丸

冷加熱藥

補心丸

治臟虛善恐

怖如魘狀

及婦人產後餘疾

月經不調

方

當歸

防風

芫蕒

附子

芍藥

甘草

蜀椒

乾姜

細辛

桂心

半夏

厚朴

大黃

猪苓

各一

茯苓

一作神

遠志

各二

右十

六味

為末

蜜丸

如梧子大

酒服五丸

日三不知加至十九丸

冷加熱藥

補心丸

治臟虛善恐

怖如魘狀

及婦人產後餘疾

月經不調

方

當歸

防風

芫蕒

附子

芍藥

甘草

蜀椒

乾姜

細辛

桂心

行義 恐怖雖屬心腎之虛然如魘狀乃虛陽鼓激痰涎湧塞心包而成正虛邪實之象虛能受熱故用姜附實能受寒故用大黃獨倍用遠志引領諸藥歸就心包以建補虛逐實之功諸臟安和則君主泰然又何必專用補心之藥乎

心勞第三 論一首 方一首

論曰心勞病者補脾氣以益之脾王則感於心矣人逆夏氣則手太陽不長而心氣內洞順之則生逆之則死順之則治逆之則亂反順為逆是謂關格病則生矣

大黃洩熱湯 治心勞熱口為生瘡大便苦難閉澀不通心滿痛小腸熱方 大黃 澤瀉 黃芩 芒硝 梔子仁 各三兩 桂心 通草 石膏 各二兩 甘草 一兩 大棗 二十枚 右十味咬咀用水九升先以水一

升別浸大黃一宿餘八升煮諸藥取二升五合去滓下大黃煮兩沸去滓下芒硝令烱分三服

行義 心勞則火氣內燔勞之太過則心氣內洞固宜補脾以益之土實則火不妄發君主自寧若火氣方熾又須泄熱為務硝黃石膏群行泄熱惟取桂心為從治之導耳

脈極第四 論一首 方一首

論曰凡脈極者主心也心應脈脈與心合心有病從脈起又曰以夏遇病為脈痺脈痺不已復感於邪內舍於心則飲食不為肌膚咳脫血色白不澤其脈空虛口唇見赤色凡脈氣衰血焦髮墮以夏丙丁日得之於傷風損脈為心風心風之狀多汗惡風若脈氣衰則熱熱則傷心使人好怒口為赤赤甚則言語不快血脫色乾燥不澤飲食不為肌膚若脈氣虛則寒寒則咳咳則心痛喉中介介如哽甚則咽腫喉痺故曰心風虛實候也

生地黃煎 治脈熱極則血色脫色白乾燥不澤飲食不為肌膚消熱止極強胃氣方 生地黃汁 生麥門冬 赤蜜 各一兩 心 一作 遠志 各二 人參 白朮 茯苓 芍藥 乾地黃 各二 甘草 二兩 石膏

六兩 生薑 四兩

行義 血枯氣脫脈極而咳故用二地芍藥以滋血參苓朮甘以益氣門冬歲癭以潤肺萸心石膏以清胃遠志赤蜜以通心而行諸味膩滯之性也

灸法

胸中痛引腰背心下嘔逆面無滋潤灸上門隨年壯穴在俠巨闕兩邊相去各半寸一寸 顏色焦枯勞氣失精肩臂痛不得上頭灸肩髃百壯穴在肩外頭近後以手按之有解宛宛中

脈虛實第五 論一首 方三首 針灸法二首

論曰凡脈虛者好驚跳不定脈實者洪滿凡脈虛寒之應主於心小腸若其腑臟有病從熱生則應臟寒

則應腑也

防風圓 補虛調中治脈虛驚跳不定乍來乍去主小腸腑寒方 防風 桂心 通草 茯神 遠志

麥門冬 甘草 人參 白石英 各三兩 右九味為末白蜜和丸如梧子大酒服之十九日再加至四

十九

行義 脈虛而用桂心石英遠志當矣反用防風為主兼木通同入手足太陽引領人參茯神等味歸

就心與小腸千金真旨於此稍露一斑特為拈出以開學人心目

升麻湯 治脈實洪滿主心熱病方 升麻 子芩 澤瀉 梔子仁 淡竹葉 芒硝 各三兩 生地黃 切一升

右七味咬咀以水九升煮取三升去滓下芒硝分三服

行義 脈實洪滿心與包絡邪實之應心主血故用生地黃黃芩涼血為主然火逆上僭非芒硝梔子

竹葉澤瀉并通二陰不能旋折其威又需升麻開發於上分解壅隆之勢也

麻黃湯 調心洩熱治心脈厥大寸口小腸熱齒齲噬痛方 麻黃 生姜 各四兩 細辛 子芩 茯苓

芍藥 各三兩 白朮 二兩 桂心 一兩 生地黃 切一升 右九味咬咀以水九升煮取三升去滓分三服須利加

芒硝三兩

衍義 心脈厥大言左寸沉伏而按之益大應指厥厥動搖故宜生地黃黃芩清利伏熱即以麻桂姜

辛辛溫散結茯苓白朮填其空以杜火氣之復入芍藥為地黃之佐使勢甚則加芒硝與前升麻湯法

不殊

鍼灸法

脈不出鍼不容穴在幽門兩旁各一寸五分是 心悶痛上氣牽引小腸灸巨闕二七壯

心腹痛第六

論一首 方二十六首 針灸法二十五首

論曰寒氣卒客於五臟六腑則發卒心痛胸痺感於寒微者為咳甚者為痛為泄厥心痛與背相引善噦如物從後觸其心身偃僵者腎心痛也厥心痛腹脹滿心痛甚者胃心痛也厥心痛如以鍼錐刺其心心痛甚者脾心痛也厥心痛色蒼蒼如死灰狀終日不得太息者肝心痛也厥心痛臥若從心間痛動作痛益甚色不變者肺心痛也真心痛手足清至節心痛甚旦發夕死夕發旦死心腹中痛發作腫聚往來上下行痛有休止腹中熱善涎出是蛇咬也以手按而堅持之勿令得移以大針刺之復久特之蟲不動乃出鍼心下不可刺中有成聚不可取於脬腸中有蟲蛇咬皆不可取以小鍼

治寒氣卒客於五臟六腑中則發心痛方

大黃 芍藥 柴胡各四兩 升麻 黃芩 桔梗 硃砂各三兩

鬼臼 鬼箭羽 桂心 朴硝各二兩

右十一味咬咀以水九升煮取二升七合分三服先分硃砂作

三服每服內一分攪勻服之得快利如痛不止宜服後方

赤芍六兩 桔梗 杏仁各五兩 右三味咬

咀以水六升煮取三升分三服

衍義

邪有寒熱之辨痛有臟腑之分而此統言寒熱臟腑者以寒邪伏久而蘊熱熱毒煥發於臟腑

故用升柴開發於上硝黃蕩滌於下桂芍破寒熱而固結衛茅散賊風惡血鬼臼辟惡氣不祥丹砂攝

擊也

九痛丸

治九種心痛并瘕冷衝上氣落馬隨車血疾等方一蟲心痛二症心痛三風心痛四悸心痛五

去心痛此

附子

乾姜各二兩

吳茱萸人參

巴豆各一兩

生狼毒四兩

右六味為末蜜和丸如梧

子大空腹酒服三丸卒中惡腹脹痛口不能言者服五丸日一服連年積冷流注心胸者亦服之好好

將息神驗

金匱方用附子三兩

衍義

金匱九痛丸本隸胸痹門後治九種心痛原方用附子三兩乾姜二兩意在辟除腎氣凌心也

千金改用姜附各二兩意在兼理胃中陳積也又原方用生狼牙一兩千金以其難覓改用狼毒四兩

以狼毒性緩不若狼牙之力銳且千金首言蟲心痛故專殺蟲為務濟以巴豆吳茱萸之迅烈助以人

參之振胃驅邪而方仍列心臟門者以諸痛靡不本於血病血則心之所主也喻嘉言曰九種心痛乃

客邪之劇証即腎氣凌心脚氣衝心之別名也痛久血瘀陰邪搏結溫散藥中加生狼牙巴豆吳茱萸

驅之從陰竅而出以其邪據胸中結成堅壘非搗其巢邪終不出耳

治九種心痛方 取當太歲上新生槐枝一握去兩頭咬咀以水三升煮取一升頓服

衍義

槐本虛宿之精益腎清心凡心痛屬血熱者宜之

桂心三物湯

治心中痞諸逆懸痛方

桂心

生薑

各二兩

膠飴

半斤

右三味取二味咬咀以水六升

煮取三升去滓內飴分三服

仲景用枳實五枚不用枳實五枚白朮二兩為五味

衍義

桂心通心氣散血結生薑去穢氣通神明膠飴和脾氣緩急痛凡心痛之屬虛冷者宜之

崔氏烏頭丸

治心痛徹背背痛徹心方

烏頭

六銖

附子

蜀椒

各半

乾姜

赤石脂

各半

為末蜜丸如梧子大先食服三九日三不知少增之

范汪不用附子服如梧子二

衍義

胸中陽氣不布陰邪襲據所以心痛徹背背痛徹心故金匱取崔氏烏頭赤丸更其名曰赤石

脂丸以烏附椒姜之辛烈破陰復陽石脂之重瀉填塞陰邪往來之路也

治心痛方 桃白皮煮汁空腹以意服之

霍氏用療
症心痛

治暴心痛或如中惡口中涎出不可禁止回欲吐方 苦參一斤 右一味咬咀以水一石煮取二斗

去滓下苦酒二斗更煮取五升加大黃末熬和煮汁中煎令可丸并手丸之如梧子大每服以酒一升

浸三四十日一當倒腹吐不吐下利更酒浸苦參二斤浸久彌佳非正暴痛如骯骨斷等痛凡是腹

中之疾悉主之又宿冷血結陰痺頻用有效大良

治卒中惡心痛方 苦參三兩 右一味咬咀以好醋一升半煮取八合強者頓服老少分二服○又方

桂心一兩 右一味咬咀以水四升煮取一升半分三服

治蟲心痛方 鶴虱為末蜜丸如梧子大服四十九丸蜜湯下日一服可加至五十九丸慎酒肉○又方 鶴

虱一兩為末溫醋一盞和空腹服之蟲當吐出○又方 服漆一合方見後養生服餌篇中凡蟲心

痛皆用漆主之

衍義 桃白皮活血通膈膜滯血 苦參汁入苦酒下大黃末治腹中熱血去宿冷血結陰痺者始由

冷積終變鬱熱也 卒中惡心痛輕者只用苦參苦酒煮服以湧泄之 桂心治痼冷結血 鶴虱治

蟲症心痛取蜜凡誘入蟲口也 鶴虱溫酒和服者取其上涌也 漆能殺蟲然須煨灰用之

五辛湯 治心腹疼痛方 細辛 蜀椒 桂心 乾姜 吳茱萸 芍藥 防風 苦參 甘草 當

歸 乾地黃 各二枚 右十四味咬咀以水九升煮取三升分四服

衍義 細辛椒姜茱萸桂以散心腹結痛苦參梔子兼歸芍地黃以和營血蘊熱甘草大棗以和五辛二

苦之性并和胃氣行藥力也其妙用尤在防風開發衛氣以通蘊結於外烏梅宣播胃氣以收津液於內

犀角丸 治心腹久痛積年不定不過一時間還發甚則數日不能食又便出乾血窮天下方不能瘥甄

附子 光明砂各六員齒五枚巴豆二十枚赤足蜈蚣二枚右十四味為末蜜丸如梧子飲服一丸日二漸加至三丸以微利為度古今集驗無雄黃

衍義 心腹久痛積年不定而至便血不食此必毒邪伏匿於幽隱之處故立言專以犀麝雄黃等味辟除惡毒為主明砂鎮心安神貝齒磨堅破血桂附鼓激諸藥之性也

高良姜湯 治心腹絞痛如刺兩脇支滿煩悶不可忍方 高良姜五兩厚朴二兩當歸各三兩桂心各三兩右四味咬咀以水八升煮取一升八合分二服日三若一服痛止便停不須更服強者作二服弱者分三服

衍義 心腹絞痛而見脇滿如刺明係木邪凌上之寔症故用良姜厚朴溫散滯氣當歸桂心溫散結血兼行心肝肺三經以破寒積也

當歸湯 治心腹絞痛諸虛冷氣滿痛方 當歸各二兩芍藥四兩厚朴一兩半夏二兩桂心二兩甘草二兩黃芪二兩人參各二兩乾姜四兩蜀椒一兩右十味咬咀以水一斗煮取三升二合分四服羸弱人分六服小品云冷加

衍義 高良姜湯專主寒結暴痛當歸湯專主虛滿久痛故於前方裁去良姜之壯火易入乾姜以溫中兼芍藥佐當歸半夏佐厚朴蜀椒佐桂心以除旺氣參芪甘草保元氣也

又方 治虛冷腹痛不下飲食食復不消膨脹者方 當歸各五兩茯苓各五兩黃芪各四兩紫苑各四兩高良姜各四兩乾姜各六兩鹿茸桂心肉苁蓉昆布橘皮各三兩甘草二兩烏頭二兩大棗四十枚桃仁一百枚地骨皮法麴大麥各一升右十八味咬咀以水一斗五升煮取四升二合分為五服下利加赤石脂

龍骨各三升渴加麥門冬一升

衍義 方中良姜乾姜合上二方之義麴蘗橘皮昆布即上方厚朴半夏之義鹿茸苁蓉即上方人參保元之義桃仁即上方芍藥佐當歸之義烏頭即上方蜀椒佐桂心之義其他茯苓紫苑大棗地骨皮

附子 光明砂各六員齒五枚巴豆二十枚赤足蜈蚣二枚右十四味為末蜜丸如梧子飲服一丸日二漸加至三丸以微利為度古今集驗無雄黃

專解二姜之辛燥也

又方 治寒冷腹中痛方 小品云吳茱萸湯 當歸二兩 桂心 甘草 人參各一 生姜五兩 半夏 小麥各一 吳

茱萸二升 右八味呔咀以水一斗五升煮取三升分三服日三亦治產後虛冷

衍義 千金以南陽陽明例中吳茱萸湯去大棗之戀膈易甘草以緩痛當歸桂心助吳茱萸以溫血

小麥助人參以益氣半夏助生薑以滌痰疫清氣溫而痛自除乃南陽法中之旨故小品仍以吳茱萸湯名之

又方 治冷氣脇下往來衝胸脇痛引脇背悶者方 當歸 桂心 人參 甘草 吳茱萸 芍藥

大黃兩各二 茯苓 枳實兩各一 乾姜三兩 右十味呔咀以水八升煮取二升半分三服日三並治尸症

亦佳 外臺仲景方無茯苓枳實

衍義 前方意在祛痰故用半夏佐生薑以散結此方意在蕩寔故用乾姜佐茱萸以泄滿茯苓佐人

參以助氣芍藥佐桂心以和血枳寔佐大黃以導滯當歸和血甘草和中心腹諸痛之所必需以其人本虛邪寔非人參姜桂不能助枳實大黃開結導滯之力也

又方 治久寒痼胸腹中痛時下利方 當歸三兩 附子一兩 乾姜 甘草 相皮各二 右五味呔

咀以水八升煮取二升分三服日三

衍義 胸腹久痛而至時下利陰邪浸淫已極非通脈四逆無以恢復元陽兼當歸之辛溫以和營血

相皮之辛涼以清旺氣相取粵東高涼化州者為勝附以蜀川成都者為優

又方 治久寒痼疾胸腹中痛短氣時滯下利方 當歸 桂心各三 乾姜 附子一兩 右四味呔

咀以水八升煮取二升分三服日三 范汪無附子有甘草二兩云虛冷

衍義 此以前方除去甘草之甘緩相皮之辛散特進桂心配當歸姜附以峻溫營血也

溫中當歸湯 治心腹中痛發作腫聚往來上下痛有休止多熱喜誕出是就蟲聚也二三劑後若不效