

矣陽經膀胱內背空額空顴者從

醫方全責卷之六

顴耳角直者從顱絡腦間還出下項循

休窪注

昂訥菴著輯

男汪

端其兩

肩胛

肩後之夾脊

去脊各一寸五分

下爲脾

行十二俞等穴

督脈

督傍

爲督

合督正屬膀胱

府相爲

抵腰循

督脈

督傍

爲督

合督正屬膀胱

府表裏

一資

督

督脈

督脈

督脈

督脈

人腦傳

從腰脊下中行

行上中下

髓等

從腰脊

穴入腦

委中穴

膝外曲處爲

人腦

從腰脊

爲脾

夾脊

去脊各三寸

行附

循

循

循

循

循

循

循

循

循

循

循

循

循

少此經少氣而多頭瘡脣痛腰如折似脫今項似拔肉如繫脣如裂痔

刺太陽經者鼻血不能循經

瘡狂癲疾並生

癲狂篇亦有此

太陽經氣別清濁

利小水

所以實

下行上冲于
腦而爲頭血
國脈病若重時皆病散
足腎經脉屬少陰從小指起足心

苦高也

目黃而淚出頤項

腰尻切

大腸 赤石脂 禹餘糧 等分杵碎煎

月脈病若重時皆病散
以上病皆經脉所過

苦高

此手陽明藥也滴可去脫重可達下石脂餘糧之滴

止脫重以固下甘以益氣

李先知曰下焦有病入難會須用餘糧赤石脂

天然骨一作谷足內踝骨陷中循內踝入跟足後上歸

腎內兼尋上股表裏後脊實脊會于腎脈長強穴屬

不利下利不止便膿血者

成氏曰陽明下利便膿血者協熱也少陰下利腹痛便膿血者下焦不約而裏寒也○凡下利便膿血身涼脈小者易治身熱脉大者難治

桃花湯仲景

治少陰病三日至四五日腹痛小便

腎下絡膀胱相爲經此經多氣而少血是動病飢
夾舌木循喉嚨支者從肺絡心上注于胸中此經多氣而少血是動病飢

不利下利不止便膿血者

成氏曰陽明下利便膿血者協熱也少陰下利腹痛便膿血者下焦不約而裏寒也○凡下利便膿血身涼脈小者易治身熱脉大者難治

赤石脂一乾薑二粳米一升

此足少陰藥也季時珍曰赤石脂之重滑入下焦益分

而固脫乾薑之辛溫緩下焦氣分而補虛粳米之甘溫
佐石脂乾薑而潤腸胃也

朱丹溪曰桃花湯主下焦血重濇不能止血用粳米之甘以引入腸胃準繩曰便膿血熟勢下流也成氏釋爲裏寒非也桃花湯雖用乾薑

起坐而欲起嘔心惕如人將捕之恐腎志

上奔渴心惕此經多氣而少血是動病飢

不欲食腹內飢而咳唾不嗜食此經多氣而少血是動病飢

重濇不能止血用粳米之甘以引入腸胃準繩曰便膿

血熟勢下流也成氏釋爲裏寒非也桃花湯雖用乾薑

咽腫舌乾兼口瘡少陰火

上氣腎水益而爲腫

心痛

薑

然分兩最微石脂練米居多以調止氣濇滑脫佐以乾薑用辛以散之之義謂便膿血皆傳經之熱邪也吳鶴

心煩

脉絡

黃疸

脅水乘脾

或易辛腎移熱于

臯

日少陰腎水主禁固二便爲火所灼

冠伐大腸

庚金

故下利膿血石脂寒能勝熱濇可收脫用乾薑者假其

辛熱以從治用粳米者恐石脂性寒損胃也

聊擇之明

而猶昧此况其下乎程郊倩曰此症終是火衰不能生

土未可指爲傳經之熱邪也不知此而慢云滲泄腎弱

一徹前後泄利而陽神唱矣昂按成氏生于千載之後

而能昌明仲景之書使後學有所循入其功非小奈何

非乎如此症成氏以爲寒而王肯堂吳鶴皋皆以爲熱

竊謂便膿血者固多屬熱然豈無下焦虛寒腸胃不固

而亦便膿血者乎若以此爲傳經熱邪仲景當用寒劑

以徹其熱而反用石脂固濱之藥使熱閉于內而不得

泄豈非關門養盜自貽伊戚也耶觀仲景之治協熱利

如甘草湯心生薑湯心白頭翁等湯皆用芩連黃柏而

治下焦虛寒下利者用赤石脂禹餘糧湯比類以觀斯

可見矣此症乃因虛以見寒非大寒者故不必用熟藥

惟用甘辛溫之劑以鎮固之耳本草言石脂性溫能益

氣調中固下未聞寒能損胃也若準繩則執凡傳經者

皆屬熱邪一語遂以爲熟耳程郊倩每以直中爲寒邪

傳經爲熱邪古今相傳二語覺未盡然不爲無見若學

黃笑不歇

動面赤目

小指次指交

小指內之次

是經少陰原多

血

掌後兩筋行掌心穴

從中指出

中冲

支

從

橫紋中

行掌心穴

從

是

是主肺所生病者

心主

掌熱心煩心痛

皆經脉

所過

無名指

訶子散

東垣

治虛寒泄瀉米穀不化腸鳴腹痛

手少陽經三焦牽掣手小指次指

關冲穴

循脫表手背之兩骨天井貫肝循臑外

御米殼去蒂蜜炒五分

訶子炮六分

乾薑七分

橘紅一分

石斛

上賓麥出足少陽胆之後入缺盆希臘申傳

空心服

兩乳中間散絡心包而下膈循屬三焦裏聯三
與心包爲表裏支從膻中缺盆出上項出耳前
以屈下頰而至頸支從耳後入耳中緣是

此手足陽明藥也御米殼酸澀微寒固腎潛腸訶子酸
澀苦溫收脫生瀉炮薑辛熟能逐冷補陽陳皮辛溫能
升陽調氣以固氣脫亦可收形脫也

泄瀉爲氣脫
脫肛爲形脫

耳前過胆經交足少陽

訶子散

一兩半生半煨

木香五錢

甘草二錢

黃連三錢

爲末

是經少血還多氣甚壅腫及喉癰少

河間訶子散

一兩半生半煨

木香五錢

甘草二錢

黃連三錢

爲末

入氣所生病氣分三焦心汗出多火蒸頭暉

相包皆主相火汗出多爲汗火蒸頭暉

漸少以此止之如不止加厚朴一錢

竭其餘邪木香黃連

丸

少陽

爲汗火蒸頭暉

未深造而輕議古人
多見其不知量也矣

癩及貞鉗皆耳後脣膚外眞瘡發

次指小指次
指不用

足少陽膽之經起于兩目銳管邊上抵頭

魚下耳後循頸行手少陽前三焦至肩却步

陽後入缺盆夾脊耳後入耳中耳前走

支少陽金匱下大迎胃經穴在領前一寸三分動脈咽中

陽舉頸項加頰車下頸運復合盤下胸

胃膈絡肝屬胆表裏榮相爲表裏循腸裏空氣街

出俠下四環毛際入髀厭橫橫入髀厭

門穴下合脾樞即脾卑樞脾陽外循脾外行太陽陽明之間出膝脛骨下爲季

從缺盆下腋循胸腹過鬲鬲骨下爲季

下合脾樞即脾卑樞脾陽外循脾外行太陽陽明之間出膝脛骨下爲季

行氣清火止痢厚腸甘草芍藥甘芍湯也甘緩酸收利中止痛加調子瀉以收脫加白朮補以強脾厚朮除濕散滿平胃謂胸中故更

藉之以去餘邪也

真人養藏湯謙

治瘍瘍日久赤白盡虛寒脫肛

肛門爲大腸之使大腸受熱受寒皆能脫肛○太陽者傳導之官醫者強作之官酒色過度則腎虛而泄母氣

肺因以虛大腸氣無所主故脫肛小兒血氣未壯老人血氣已衰皆易脫肛

脅腹疼痛日夜無度

瞿麥殼去蒂蜜炙可

調子麪裏煨一兩

肉豆蔻麪裏煨一兩

木香炒五錢

桂枝炒一兩

生甘

二兩內桂八錢人參

白朮炒六錢

當歸六錢

白芍六錢

桂枝六錢

生甘

每服四錢藏寒甚加附子一方無當歸

此手足陽明藥也脫肛由于虛寒故用參朮甘草以補其虛肉桂肉蔻以祛其寒木香溫以調氣當歸潤以和

之穴任由會陰而行以上至腰循腹裏行中
腹督出會陰而行背上至腰循腹裏極穴
上三關元 膻下三寸穴名至咽喉上頭循面入是
絡于一衝脉起氣街並少陰脈依脣上行胸
中至任脉當膚中而上衝脉俠膚旁行而上以上並出素問骨空論
藏六府海血海五藏六府所裏氣上滲諸陽
經溝諸精上出從下衝上取茲義故名亦有
津諸頑穎從下衝上取茲義故名亦有
督下衝者注少陰氣街出喉股內廉入
臍中 滯後曲處伏行行骨內踝際下滲三陰肝脾
脈順逆督脉起少腹骨中央入聚廷孔女
肥滿篇 咽廷溺孔之絡陰氣之二陰之至後別繞
端即窈漏穴名纂至後別繞

合邪汗出不休以風藥勝其濕苦藥渴其熱羌活勝濕
湯有痰症冷汗自出宜理氣降痰淡去則汗自止有用
固澁藥汗愈不收止可理心血汗乃心之液心失所養
不能攝血故澁而爲汗宜大補黃耆湯加酸棗仁有微
熟者更加石斛下靈砂丹王海藏曰晉郎中婁子益汗
七年諸藥不效子與涼膈散三黃丸三日病已益督主
五液化爲五濕腎水上行乘心之虛心火上炎而入肺
欺其不勝皮毛以是而開爲汗出也先以涼膈散渴崩
中相火次以三黃丸瀉心火以助陰則腎水還本藏玄府閉而汗自止矣

附撲汗法白朮藁本川芎各二錢半米粉半兩爲末絹袋盛週
身撲之治汗出不止又方龍骨牡蠣糯米等分爲末撲

牡蠣散 治陽虛自汗

牡蠣研末黃耆 麻黃根一錢半浮小麦百粒

前服

此手太陰少陰藥也陳來草白汗爲心之液心有火則

督與陽絡太陽與膀胱腎

中絡少陰此二脉相合上段

汗不止牡蠣小麥之鹹涼去煩熱而止汗陽爲陰之

廉賁督行上同太陽起目內背上額交

衛陽氣虛則衛不固黃芩麻根之甘溫走肌表而固衛

真絡胸間下項循肩內仍依脊抵腰絡腎

此腎督並行於內

柏子仁丸 治陰虛盜汗

脈並太陽循督男子陰莖

下纂與女子頬爻柏子仁炒研去油人參

梔子半夏五味子牡蠣

從少腹貫帶火憲入喉頸及脣

環唇上齶兩麥芽一錢大棗九枚飲下五十九日三服

早下中央際此爲垂

此督脈並在肺而行者亦同衝此手足太陰少陰藥也陳李章曰心血虛則睡而汗出

脈大抵二脉同本陰之下一原而三岐異

柏子仁之甘辛平養心寧神爲君牡蠣麥芽之鹹涼

名而靈渠又每錯宗脉任脉皆起于胸中

靈樞五音五味篇衝上循背裏是又言衝任行背故經亦有謂衝

脈爲督脈者古圖經有以任脉循背者謂之上體

督自少腹直上者謂之任亦謂之督今人大

率以行身背者爲督行身前者爲任從中起

地生之道心神傷則火動火動不已則腎水受傷腎王

者爲衝然者在督二經所行穴道一在身前

在身後而衝脉居中則無穴道似當以此

藏精所受五藏六府輪至之精皆不得藏而時下矣故

麻黃根帶走肌表引人參梔子以固衛氣爲使

茯苓丹方

治遺精白濁及強中消渴

心腎爲水火之藏法天施

說爲

督病少腹

上衝心痛不得前後

二便衝

不通衝

正海任主

督脉爲病

其在女子爲不孕

衝爲血

此督脉爲病

同于衝脈者

其氣色慾不遂

致失精者

有思色慾不遂

致精失位

輪泄而出者

有色

慾太過滑泄不禁者

亦有年壯氣盛久無色慾精滿而

泄者赤濁屬血由心小腸屬火也

白濁屬氣由肺大陽

屬金也又日赤濁爲心虛有熱因思慮而得白濁因腎

虛有寒由嗜慾而得渴症下消者名強中腎水虧心火

也

疝

此督脈爲病

同于衝脈者

其氣色慾不遂

致失精者

有思色慾不遂

致精失位

輪泄而出者

有色

慾太過滑泄不禁者

亦有年壯氣盛久無色慾精滿而

泄者赤濁屬血由心小腸屬火也

白濁屬氣由肺大陽

屬金也又日赤濁爲心虛有熱因思慮而得白濁因腎

虛有寒由嗜慾而得渴症下消者名強中腎水虧心火

也

胎

此督脈爲病

同于衝脈者

其氣色慾不遂

致失精者

有思色慾不遂

致精失位

輪泄而出者

有色

慾太過滑泄不禁者

亦有年壯氣盛久無色慾精滿而

泄者赤濁屬血由心小腸屬火也

白濁屬氣由肺大陽

屬金也又日赤濁爲心虛有熱因思慮而得白濁因腎

虛有寒由嗜慾而得渴症下消者名強中腎水虧心火

也

在任病

內結

七疝

女瘕帶

婦人之病

帶下瘕聚卽

衝

蠶氣逆沖

血不足故息氣有餘故逆此段

出素問骨空論○

督者督領諸

經之脉也衝者其氣上衝也

任者女子得之以任養也

足內踝大骨

直上

喚入

瘡間

上循胸入缺盆過

迎

此手足少陰

心火

喚脣

之前脉

起于然骨

足內踝大骨

前

胃經頸旁動脈

入頸

觀

目內眞

睛明穴

合

任脉

始於膀胱經之中

脉穴足

外踝下陷中

此段出靈樞脉度篇

此

督

脈

至在脉衝

脈督

帶脈陽蹻

陰維謂之奇

經八脉

帶及

氣取其瘀滯子補正申能泄腎邪也

素說奇

至在脉衝

脈督

帶脈陽蹻

陰維謂之奇

經八脉

帶及

氣取其瘀滯子補正申能泄腎邪也

和陽蹻

蹻脉始於

膀胱經之中

脉穴足

外踝下陷中

此段出靈樞脉度篇

此

督

脈

至在脉衝

脈督

帶脈陽蹻

陰維謂之奇

經八脉

帶及

氣取其瘀滯子補正申能泄腎邪也

素說奇

至在脉衝

脈督

帶脈陽蹻

陰維謂之奇

經八脉

帶及

氣取其瘀滯子補正申能泄腎邪也

石豆
一名
寒豆

味甘平無毒調榮衛益中平

氣又養之動氣消渴益食之食治寒
熱除吐逆止瀉利小便腹脹滿下乳壯殺

鬼毒解乳石毒其性主散脾胃中用之

蠶豆
一名
胡豆

味甘溫氣微辛走胃利五

臟多則發脹可食炒食

豆味甘鹹平無毒理中藥補腎健

胃和五臟調榮衛生骨髓止消渴吐逆瀉

小便數急蟲蛇毒有白紅紫赤斑駁數色長
豆可菜可果可穀借

用最多豆中上品

屬味甘鹹寒有小毒中藥和脾

金穀膏

取半

黃者熬膏一斤

火也精獨乃精氣滑出不便亦然此

水不足淫火薰蒸故精離其位也

和丸鹽湯

陰在泉客勝溲便變少陽在泉客勝則溲白又言思想無窮入房太甚發爲白溼與脾移熱于腎出白二者皆隨溲而下夫非白濁之源乎原病式因舉內經謂諸病水液滌濁皆屬於熱言天氣熱則水滌濁寒則清潔可謂發聖人之旨以正于載之誤矣予嘗聞先聖論亦白濁多因濕熱下流膀胱而成即靈樞所謂中氣不足溲便爲之變是也必先補中氣使升舉之而後分其藏府氣血赤白虛實以治與夫其他邪熱所傷者固在濕熱補虛設腎氣虛甚或火熱亢極者則不宜過用寒涼之劑必以反佐治之要在權衡輕重而已葉氏曰遺滑多作腎虛補益之而罔効不知此因脾胃濕熱所乘飲酒厚味痰火之人多有此疾腎雖藏精其精本于脾胃飲食生化而輸于腎若脾胃受傷濕熱內鬱使中氣滑而不清則所輸皆濁氣邪火擾動心不得而安靜故令遺

胃脹滿下大腸濁氣清熱散血豆蔻

角
下

九能除妊娠之病
并充蔬果防發瘡重

甘正音威宣醫由清之由

醬
豆
醬
甜
醬
豆
油

味鹹冷無毒

金鎖固精丸

治精滑不休 精滑者火炎上而外走下心腎不交也

除熱止煩滿殺百蟲及熱湯火毒殺一切魚

沙苑

火燒
蒸
二國

酉土履盈水齋

肉茶
萬毒又治它
蟲蜂萬
毒汗灌入

蓮子粉爲糊在鹽漬

下部治大便不通，上部治飛蛾蠅入

此定少陰藥也

蒺藜補腎益精丸 交通心腎牡蠣精

塗瘡大咬瘍火傷燐未成瘡者有效名方

熟補水火實固腎

腎補脾合之蓮鬚育腎皆清精秘氣之
治遺精大法兩五小匙半或半錢炒熟

石毒 諸水服卽解。附方半指瘡，匀溫膏。

品以止憮脫也

治遺精大法有五心神浮起者辰砂砂石龍骨之類鎮之痰飲迷心者猪苓丹陽晉晉右珍珠粉生黃柏治勞等分

浸之愈
乃止

之類導之思想後
滋陰降火思想後
陽真虛者乃癸水

**傷陽者潔古珍珠丸黃柏蠟米無分
傷陽者謙甫鹿茸芙蓉絲等補陽陰陽
非小治用珍珠粉生地黃柏**

豆醬二升去汁取豆炒
**研酒服方寸七日三
次**瘀血
益敷乾生

陽俱虛者丹溪

王玉珍方定志方補之附
癸未二雨先將一半爛半夏令黃取生
金匱同清

地黃三兩爲末
服一錢米飲下

凌遲瘡

羊醬辦和入瓦塗
未間空心酒鹽湯任下

釋曰牛夏有利性

猪苓導水益腎閉導氣使通之意

也定志丸見目門

水三分之○當以豆醬陳久者作小麥鹽殺藥

力不加

豆醬

力不加

胡蘿蔔味甘無毒竄中下氣散腸胃

者謂挾各熱及飲酒煎炙

之熱也久痢不止氣虛也

赤黃二種苗葉似蒿不可食子似茱萸

可和

食料

菘菜吐甘溫無毒利腸胃除胃中煩解

其濕寒以解其熱清以收其脫使虛者補而陷者升亦

酒燙去魚腥消食下氣治癆止熱散胸膈悶

刀劑也勿用

或食之覺冷甚能制之二夏至前食發皮

初起

膚風瘡動氣發病菘菜行風氣毒熟其

別者小腸也小腸虛則便短

便數小腸熱則便短

人參

治小便數而欠

數便頻也欠短短也

溺雖出于膀胱然秘

申鬼甫云不心氣療健忘

花頭糟食養服甘草多食甚作油傅頭髮

人參

葵蒂

一用

遠志

鹽炒

石菖蒲

鹽炒

桑螵蛸

鹽水

龍骨

人參

樗皮散

治藏毒挾熱

下血久痢

膿血不正

熟

人參

樗根白皮

東引者去

分未

米飲或酒調下

粗皮醋炙

分未

米飲或酒調下

粗皮醋炙

分未

米飲或酒調下



髮方不宿秀北人居南方不勝地土宜
遂適慈菜一牛肚慈菜最厚味甘一慈

蓼湯下

龜板酥炙一方用當歸等分爲末臨卧服二錢人

葉薄纖味少苦一白慈蓼蕷猶一類也其
地無節傳到被形色俱變

芥菜味辛氣溫無毒歸根除腎邪利九

竅耳鼻中除邪氣止咳嗽冷氣去頭面

風多食動風氣生食發丹石不可同瓦肉食

心清則小腸不熱矣

殺蟲之劑

幽尹子曰人之一身內包蟻外蒸蟻風

萬物有依人身以爲生者是吾身一小天地也蟻爲人所常有之蟲倘乘侵火迫則不安其位亦能爲病若飲食不慎氣血虛衰又能變生諸蟲不可名狀如髮癰瘍瘍勞瘵傳尸之類至于殺身滅門蟲之爲患若斯其酷也是以先賢以法殺之苟人

撲捉療腰痛腎冷和生蠶研微煖貼心

不能殺蟲則蟲必且殺人矣

痛酒釀丹溪疾在皮裏膜外非此不能

烏梅丸

仲景

治傷寒厥陰症寒厥吐衄

傷寒藏厥者

死藏厥者脉

微而厥至七八日膚冷發躁無暫時安也

衄厥者附土

入脈則煩須臾復止得食則嘔而又煩

衄聞食臭復出

也此爲藏寒當自吐衄

與烏梅丸溫藏安衄

亦治胃府發咳而嘔

中風

亦治

善走馬鳴食下胎臨產食易產又有

烏梅丸程郊倩曰烏梅丸于辛酸入肝藥中微加苦寒
而上逆之陽邪而順之使下也名曰安蛇實是安胃以

野生一種灰條蔓亦可食亦入藥治蛇蟲

併主久利見陰陽不相順接而下利之症皆可以此方
拈之也○經曰凡陰陽不相順接便爲厥方時行日經

射工蟄以紫莧菜搗汁傾一升敷傷處即

曰手之三陰從腹走手手之三陽從手走頭足之三陽
從頭走足足之三陰從足走腹是三陰三陽俱相挨于
手足者也陽氣內陷不與陰氣相順接故手足逆冷也

愈茱子治肝經風熱上攻眼目赤痛翳

瘡寒不明晝赤暗黑服之爲未每夜茶
從頭走足足之三陰從足走腹是三陰三陽俱相挨于

遮障不明晝赤暗黑服之爲未每夜茶

因集効丸三治蟲噉腹痛作止時或耕起往來腹痛

服方七寸

藜菜味冷微毒利五臟通腸胃解熱毒

大黃炒兩半鶴虱炒七錢附子五分

酒毒人多食肉與藜食此則平南人多食薑

炒兩半鶴虱炒七錢附子五分

魚鱉米食此則冷故多食冷大小腸發硬

此手足陽明藥也蟲毒溫惡酸而畏苦故用薑附之熟
痛令人脚弱不能行云服丹石人食之僅以溫之烏梅訶皮之酸以伏之大黃檳榔蕪荑鶴虱之

劉禹錫集錄此菜來自西域頗移國誤

苦以殺之木香辛溫以順其氣也

劉禹錫集錄此菜來自西域頗移國誤

苦以殺之木香辛溫以順其氣也