

種痘新書

卷拾一



書部

卷十

女子出痘

卷十一

麻原賦

概論治法

麻家四忌

麻後餘症

孕婦出麻

麻疹

麻症與傷寒辨

麻症辨論

麻症輕重

麻症初起治法

麻症忌出調治法

孕婦出麻

種痘新書

卷十

種痘

種痘新書卷之十

寧邑張 琰遜王氏編輯

受業曾衡波全叅

女子出痘

痘瘡以氣爲主。以血爲附。氣血充足。乃可灌汁成膿。女子若至十四天癸已動。倘遇出痘。而經水忽行。則陰血已虧。將何以運毒而成漿乎。然發熱之初。經期適至。則毒隨血解。可以無虞。若至三日之後。而血猶不止者。則熱入血室。血至妄行。此內動中虛之痘。治之不容緩也。否則血虛不能送毒。狂亂忽生。須臾而告變矣。故經行二日急。以四灰散調酒與服止之。若至五日血

猶不止急以涼血地黃湯治之

灰散

舊棕

老杉樹皮

胎髮

臍帶

俱燒灰存性調酒服

涼血地黃湯

當歸

川芎

白芍

生地

白朮

升麻

川連

甘草

人參

枝子

玄參

阿膠

右方加棗二枚水煎服以痘出血止為度

一女子非經行之期於發熱時而經水忽至者乃火毒內熾觸血妄行也其毒必盛其血必多急用涼血解毒湯倍加連翹牛旁或用柳花散治之若因循隱忍則血愈虛而毒愈熾不

旋踵而伏陷內攻雖有良醫亦難治其後矣

涼血解毒湯

當歸

二錢五分

白芷

七分

升麻

五分

紅花

二錢

紫草

一錢七分

赤芍

二錢

桔梗

八分

連翹

牛子

各二錢

燈心

五節

柳花散

柳花

七錢

紫草

一兩

升麻

七錢

當歸

八錢

赤芍

六錢

共爲末

每服七錢。葡萄煎湯下。

二女子發虛。又值行經。經水方止。身發壯熱。狂言譫語。如見鬼神。尋衣摸床。顛狂百出。日上直。視煩渴不寧。此陰虛似實。切不可以實熱治之。蓋行經之後。血室空虛。心以生血。血竭則

心神不寧。肝以藏血。亦且藏魂。血盡肝虛。而神魂自不能定。此狂譫之所由來也。痘未出。宜以道遙散。加丹皮王之痘已出。宜以加味歸脾湯主之。又有邪熱乘虛而入血室。以致于狂譫者。古人以瀉肝散治之。愚謂仍以加味道遙散加防風。斯可矣。

一女子正值崩漏。適逢出痘。則氣血俱虛。必不能送毒出外。急宜大補血氣。否則痘不能出。雖出亦易倒陷矣。遇此之症。速以十全大補湯。或參歸鹿茸湯三之。

一女子一向閉經。血海已涸。適逢出痘。毒氣鬱於衝衛之間。二陽并發。其熱必甚。其症最危。切莫用攻擊之藥。使血安行。須

養心補血調理脾胃為主仍用歸脾湯畧加解毒藥或用逍
遙散主之

瀉托散

姜活

六分

當歸

一錢

枝子

胆草

酒洗各六分

川芎

防風

各入分

炒芩

六分

柴胡

木通

各六分

淡竹葉

引

歸脾湯

人參

黃芪

白朮

茯神

各一錢二分

甘草

三分

木香

五分

遠志一錢

全地

麥仁

各二錢

加柴胡

山枝

名加味

歸脾湯

逍遙散

白朮

茯苓

當歸

白芍

生地

甘草

柴胡

加枝仁丹皮名加味逍遙散

十全大補湯

人參 黃芪 白朮 茯苓 地黃 官桂 川芎 當歸

白芍 甘草

女子起脹灌漿

一女人出痘當起脹灌膿之時忽然行經恐血虧裏虛痘易倒
陷急宜大補血氣用十全大補湯或參歸鹿茸湯主之

參歸鹿茸湯

鹿茸 二錢

人參 二錢

炙芪 一錢

歸身 二錢

炙草 七分

薑 一片

龍眼

三個八好酒一盃全煎

女子瘡當起發之時其經忽來而不能言語者此乃血虛之甚而少陰之脉不能上榮于舌也宜以當歸養心湯主之爲其能言復用十全大補湯主之

當歸養心湯

人參 麥冬 生地 炙草 加燈心引

一女子痘當灌漿之際經水大來血虛不能化毒以致其痘應起不起應灌不灌頂陷灰白皆由血去過多陰氣耗散故也急用調元內托散主之外用胡荽酒噴之使痘起漿行或於空處又出一層則爲吉也若服此不效寒戰咬牙喘急腹脹反增他痘則內氣已脫必不治矣

調元內托散

人參 黃芪 肉桂 木香 當歸 川芎 白芍 附片

孕婦出痘

夫妊婦出痘。痘家最忌。蓋痘毒出於五臟。痘毒發越。則風火相搏。必致動胎。胎動則氣血耗散。勢必不能送毒。行漿。況痘家用藥。多主溫補。如半夏、肉桂之類。皆爲妊婦所忌。而黃芩、烏藥諸品。又非痘家所宜。此妊婦出痘。所以最難調治也。遇此痘。總以清熱安胎爲主。故初熱血動者。以四物湯加不連主之。或用單胎散主之。必使胎元莫動。而後可無虞也。

四物湯

當歸 川芎 熟地 白芍

單胎散

當歸 川芎 白芍 人參 白朮 茯苓 柴胡 甘草

條芩 防風 荆芥 白芷 乾葛 砂仁 紫草 阿膠

桔梗

一妊婦出痘身熱腹脹手足冷者用八物湯加木香主之

人參 黃芪 白朮 當歸 川芎 白芍 熟地 甘草

一妊婦出痘而胎將動者急用安胎散主之恐胎落則痘陷也

川芎 當歸 白芍 人參 白朮 茯苓 黃芪 甘草

砂仁 陳皮 阿膠 香附 艾葉 各等分

一胎落而痘稠密者用人參黃芪川芎當歸防風

白芷白芍桔梗厚朴木香肉桂紫草牛子

一產後寒戰咬牙者裏虛甚也宜大補湯加桂附

一產後小腹急痛者瘡血未盡也宜用黑神散畧與行之

黑神散

當歸川芎熟地炭薑桂心蒲黃炒木香陳皮

黑豆炒香附炒水酒各半煎服

一生產之後然後出痘者總宜大補血氣為主須照常一體用藥不必妄為多疑而反致變亂也

訣曰 妊婦出痘治應難 表裏熱盛胎不安 清熱安胎為

妙法 胎元若動病終難

又曰 產後天行出痘瘡 此時平順不須惶 只將大補加

功效 謾向諸書更檢方

總之妊婦出痘要以安胎為主若胎已落法以補血爲先但收
靨時胎落者多無事發熱初出時胎落者猶或可救若當起
脹灌膿時胎落者多致不救治者須宜知之

天
地
人
三
才
圖
說

天

種痘新書卷之十一

寧邑張 琰遜玉氏編輯

受業曾衡波仝叅

痲原賦

痲雖胎毒却因疫時而敷。暄熱非令大寒逆時傳染而行。遍平
州里其毒發也。與痘相似其變症也。比痘非輕。愚夫視爲泛常。
頃刻殞人性命。藥論其原此其所以然者。蓋毒起於脾。熱流於肺。心始終
之惟腎無症。故非髓內之歿。而臟腑之傷。肺則尤甚。閉門問途。
不若路中尋徑。楊湯止沸。不如去火。抽筋吾試言其始末。而與
天下詳呈。初熱亦似傷寒。目出淚而不止。鼻流涕而不乾。咳嗽

太急煩燥難言以火照之隱隱在皮膚之下以手摸之磊磊於
肌肉之間其形如芥其色如丹隨出隨沒乍隱乍現根窠若腫
兮癢而兼隱皮膚如赤兮癢而夾癢似錦而明兮十有九活如
燥而黑兮百無一生症雖變異治法不同微汗常出毒勢越而
不留清便自調邪氣行而無壅腠理弗開兮恐毒鬱而不洩即
當發表為貴腸胃秘結兮慮熱滯而不通急以疏利為先苟不
慮終而慎始正恐變吉以為凶其衄不必憂邪從衄解利不必
止毒以利鬆所害者身上清涼所畏者喉中腫痛飲水不休法
在生津養血飲食若咸方須救胃和中且出之太遲或為風寒
所束法在急於發表出之大甚臟腑積熱恒多治之力宜解毒

雉醫貴因時。母性天和。當視歲氣。若寒風凜凜。毒氣鬱而不行。火目炎炎。邪氣乘而作癘。或施溫補。勿助其邪。若用清涼。伏傷其胃。制其過。但取其平。驅其邪。勿傷其正。或寒或熱。藥性之陰陽。自異。爲虛爲實。人生之強弱。不齊。欲與溫涼。必觀虛實。人品固宜詳觀。藥味亦當深究。防風荆芥散。腠理之留邪。升麻葛根。開榮衛之蘊熱。點子未現之初。乃先行之要藥。人參養氣地黃。涼血氣。虛血熱。非此難安。黃連入心而瀉火。黃芩入肺以清金。熱留心肺。非此莫除。玄參石羔治邪火之浮游。枝子連翹開惡毒之鬱結。此疹家之要藥。解毒方中。必用瓜薤潤肺止渴。須合麥冬。知母降火生津。必同黃栢當煩渴在所。必加芍藥住平腹。