

明醫指掌卷七



訂補本草綱目卷之七

仁和雲洲皇甫中編輯

長洲念山邵從臯訂補

字繩山邵達校閱

癰症一

歌牛馬猪羊雞五癰治須尋火與尋痰更將痰火分
多少識得樞機總不難

論夫癰有五馬癰則張口搖頭馬鳴牛癰則目正直
視腹脹猪癰則喜吐沫羊癰則揚目吐舌雞癰則
搖頭反折善驚蓋以其形之類而名之也古者既

有五癰之名治無分別槩用香竄鎮墜之藥殊爲未當丹溪云癰病蓋因痰涎壅盛迷瞶孔竅發則頭旋顛倒手足搐搦口眼相引胸背強直叫吼吐沫食頃乃甦大率屬痰與火法當尋火尋痰分多分少治之亦有因驚而得者驚則神不守舍舍空而痰聚也宜以行痰爲主佐以定悸寧心安神可也彼香竄燥劑寧不助火耗氣乎

痰

痰者動則有聲脉滑涎沫出必得吐後用安神太

痰爲主二陳湯加南星瓜蒌黃連

方見痰症

安神

黃連

錢一兩五錢酒製

硃砂水飛

生地黃

當歸

酒洗一兩

甘草

蜜丸每五

九

火

火者有熱面赤脉散大抵肥人痰多瘦人火多宜

吐後用平肝青黛黃連川芎柴胡或寧神丹

寧神丹

治火盛

人參

陳皮

五錢

白朮

五錢

當歸身

白茯苓

五錢

獨活

五錢

遠志

犀角

麥門冬

棗仁

炒五錢

辰砂

半夏

南星

一兩

石膏

甘草

白附子

三錢

川芎 三錢 牛黃 三錢 珍珠 三錢 生地黃 五錢

黃連 五錢 金箔 三十片 酒丸空心白湯下五十丸

驚

因驚而得者則神不守舍舍空痰聚必先行痰亦

用吐痰吐後與神丸 方見前 或三癰丸

三癰丸 治一切驚風 荊芥穗 白礬 一兩半 硃砂為衣

顛狂症二

歌謠言歌走忽踰牆妄目稱尊號曰狂顛者身殫心

不樂須知二症有陰陽

論七

症其狀少臥而不飢妄言歌笑踰垣上

風衣奔走自高賢也自貴倨也自辨智也顛者
陰症其狀僵仆直視意不樂是也丹溪云大率多
因痰結于心胸間治當鎮心神開結痰有中邪而
得者以治邪法治之蓋陽虛陰實則顛陰虛陽實
則狂扁鵲云重陰者顛重陽者狂故顛狂二症陰
陽之不同也

脉顛癰之症陽浮陰沉數熱滑痰狂發于心驚風肝
癰弦急可尋浮病腑淺沉病臟深○顛脉搏大滑
者生沉小緊急者不治狂脉實大者生沉小者死
顛脉虛可治實則死

顛症

顛者神不守舍顛狂如有所見經年不愈心經有損是爲真病若悲哭呻吟爲邪所憑者非狂也用贊故帑一味燒於好酒調服二錢顛風麻仁湯顛疾失心者宜助心氣用靈苑方

顛風麻仁湯

麻仁 四升

水六升猛火煮七合服

靈苑方

助心氣

硃砂 一兩

棗仁

半兩

乳香

半兩

右作一服溫酒下以醉爲度勿令吐服後便令睡待其自醒則神魂安矣萬一驚觸不可復治

狂症

狂者發作無時披頭大叫踰垣上屋不避水火
棄衣奔走欲殺人苦參丸卒狂妄言者針大拇指
甲上去一韭葉許大抵狂病宜大吐下則可愈大
黃一物湯

苦參丸

治狂邪

苦參

不拘多少

蜜丸薄苛湯下五十丸

大黃一物湯

大黃

四兩酒浸一宿

水三升煎之分三服必

數日後方可與食但得寧靜方爲吉兆不可見其
瘦弱減食便以溫藥補之及以飲食飽之病必再
作戒之戒之緩與之食方爲得體故曰損其穀氣
則病易愈所以然者食入于陰長氣于陽故也

○按前二症必有所因或因大怒動其肝風或因大驚動其心火或素有痰卒爲火升升而不降壅塞心竅神明不得出入主宰失其號令心反爲痰所役一時發越若踰垣上屋持刃殺人裸體罵詈不避親疎飛奔疾走涉水如陸者此肝氣大旺本來乘心名之曰狂又謂之太顛法當抑肝鎮心降龍丹主之若撫掌大笑語言不倫左顧右盼如見鬼神片時正性復明深爲赧悔少頃而狀態如故者此爲上隔頑痰泛濫洋溢塞其道路心爲之矐矐少降則正性復明痰復升則又發名之曰顛去當

利肺安心安神懷疾丸主之

隆龍丹

抑肝鎮心

黑鉛

一兩鎔開投水銀一兩不仕事炒至成粉爲度名曰銀鈔

硃砂

五錢

蛇含石

五錢火內煅過

金箔

五百片

銀箔

五百片

研細丸如芡實大每服三丸扶神湯

磨化下

安神滾痰丸

礞石

一兩煅

風化硝

一兩

硃砂

一兩

沉香

五錢

珍珠

五錢

其末煎大麻膏丸如芡實

大每服三丸薑汁竹瀝調下

瘥症一

歌瘥本非風溼上求有無汗症見剛柔角弓口噤如

風狀燥劑教君勿妄投

論仲景云太陽病發熱脉沉而遲曰瘧傷寒發汗過多因致瘧大發瘧家汗亦成瘧瘡家發汗亦成瘧瘧後去血過多亦成瘧其瘧身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤目脉赤獨頭搖卒口噤背反張者是也有汗曰柔瘧無汗曰剛瘧剛瘧屬陽柔瘧屬陰丹溪云瘧屬太陰瘧土故經云諸瘧強直皆屬于濕蓋瘧土過極反兼風化制之然兼化者虛象而實非風也切不可槩作風治而用燥藥大率瘧氣虛亦有火兼熱者宜辨之若身涼手足冷脉

沉細者爲陰瘧若口眼牽扯手足戰搖脣縮者爲
風痰若發熱喘嗽生痰爲痰火宜隨症治之若日
瞪口開昏冒不知人者不治並用如聖飲加減治
之

如聖飲 治剛柔二瘧與瘕瘕同治法

羌活

土

防風

中

川芎

中

白芷

中

柴胡

中

芍藥

中

人參

中

當歸

中

甘草

中

半夏

下

黃芩

中

烏藥

中

右用水二盞薑三片煎一盞入薑汁竹瀝溫服○
有汗曰柔瘧加白朮杜枝○無汗曰剛瘧加蒼朮

麻黃或加葛根亦可。○痰多加貝母瓜蒌枳實紫
蘇子。○火盛加山梔仁麥門冬花粉去川芎柴胡
烏藥半夏羌活防風白芷。○如口噤咬牙大便實
者加大黃利之。○產後去血過多成痙者加黃芪
熟地黃。

厥症四

歌厥形有六要消詳痰氣尸虺陰其陽故使四肢成
厥逆陰陽虛實各分張

論夫陰厥者始因泄利身寒厥冷足踈臥唇口青自
利漉白不渴脉遲陽厥者身熱四肢厥逆大小便

門澀。脉數熱極反厥也。痰厥者。寒痰迷悶心。胸墜
道不行。四肢厥冷。僵仆卒倒。不知人事。厥者氣暴
逆也。故卒然厥逆。不知人。僵仆身冷。虺厥者。胃寒
虺蟲攻胃。手足厥冷。吐虺尸厥者。胃犯不正之氣。
忽然手足厥冷。肌膚起粟。頭面青黑。或妄言或口
禁。昏瞶不知人。或因吊喪問病。入廟登塚而得。并
溪云。有因氣而厥者。身冷脉伏。有血虛而厥者。因
血大損故也。脉必芤澀。有因痰滯而厥者。口中流
涎。昏不知人。脉沉滑。有氣虛而厥者。有所勞傷。氣
弱不能運行故也。凡此之類。在乎細辨之。

陰陽厥

陰厥理中湯重者四逆湯

二方俱見中寒

外灸門元穴五

十壯陽厥四逆散大便閉熱極反厥大承氣湯下

之

方見傷食

四逆散

治陽厥輕者

甘草

炙一錢

枳殼

炒一錢

柴胡

一錢

芍藥

炒一錢

剉一貼

水二鍾

煎八分

不拘時服

氣血厥

氣厥四七湯調氣散八味順氣散

方見氣虛

蘇合香丸

方見類中風

婦人血厥倉公散白薇湯

倉公散

治血厥

瓜蒂

一錢

藜蘆

一錢

礬石

飛一錢

雄黃 一錢 末之每用少許吹鼻中取嚏

白薇湯 治血厥 白薇 三錢 當歸 三錢 人參 一錢

甘艸 分七 剉一貼水二盞煎一盞溫服

虻厥

虻厥理中湯加檳榔川椒煎吞烏梅丸 一方一見

心痛不止用烏梅川椒黃蘗煎服蓋虻聞酸苦則安

尸厥

尸厥蘇合香丸 方見類 調氣散 方見 或追蠅湯

追蠅湯 治卒厥 麻黃 去節 杏仁 二十粒 生甘艸 一錢 煎服

痰厥

痰厥昏門不醒稀涎散

方見中風

導痰湯

方見痰症

痿症五

歌諸痿多因肺熱生故云痿獨取陽明分明自是膏

梁疾勿認爲風浪立名

論夫痿有五脉筋骨肉痿歷是也古方多以治風之

藥通治痿何其謬也至丹溪始辨之以風痿二症

另立篇目源流不同治法迥別此開千古之弊也

丹溪云內經謂諸痿起于肺熱又謂治痿獨取陽

明蓋肺金體燥居上而主氣畏火者也脾土主溼

居中央主四肢畏木者也火性炎上若嗜欲無節