

內科理法

午2

941

共2册



內科理法三編卷一

英國

虎伯譯
哈來 叅訂

慈谿 舒高第 口譯
新陽 趙元益 筆述

腦髓之病

分類

頭痛 腦生炎 腦胞膜生炎 腦上有水 中

風 腦髓久延病

頭痛

頭痛幾爲腦體各種輕重病之據亦爲特有一種功用病之據分爲表如甲裏如乙

甲表 一頭內筋條痛 二骨衣頭痛 三腦筋頭痛

乙裏 一血聚頭痛 二胃不消化兼發頭痛 三器具

頭痛

表 一 頭內筋條痛卽爲護頭內筋條痛累及枕骨額

骨內筋條並耳門骨肉筋條 病勢痛無界限肩毛下疤

動則有痛壓之擊之亦然尋常與頸骨肩胛及他處肉筋

條之痛同發 根原受冷 治法與新傷風之治法及肉

筋條久延風濕治法相等

二 骨衣頭痛在頭頂 病勢其痛尋常祇在一處重按

之則加其痛肉筋條行動不累及之間有累及面部骨衣

至於不可膜鼻有時通至身之別處最易者腳骨與胸骨

如限於一處常有浮腫 根原尋常之根原爲疔毒亦在

皮面顯出且其面貌另有一種疔毒病色 治法卽用第

二層疔毒之治法鉀碘五釐合於補藥水爲 服如累及

於骨並成膿須用刀開至其處並用外科中骨病之治法

三 腦筋頭痛或依時而作其痛在眼眶內角並鼻旁間

有在一小處之痛覺如敲釘入內或在半面尋常在面之

左半其時之間整齊如癰有時隔十日之久亦有隔一箇

月或一年者有時其往來之痛變爲久痛並有其病非確

有往來但其病去之時間實有參差有病無病之兩端確

有中線分開發痛之時或有一小時至二日之久婦女患

此病者多於男子少年患此病者多於老年然在各年紀

之人俱能有此病有痛至極甚者食物語言風陣俱爲累

事也 病勢頭頂上肉筋條收束加痛因此與第一第二

兩種可分別之 根原受冷濕草田毒氣 治法與瘧疾

之治法相同卽用大服之雞哪然用砒霜酒謹慎服之更

佳見方二百九十一

裏 一 血聚頭痛此在三種情形內有之一充足二軟

弱易激動三乏力白血輪病 病勢呆痛關係於全頭最

關係者額與枕骨充足者有浮滿之面貌凸出之紅目迴

血管漲足脉滿神呆等在軟弱易激動者眼前有散光與

浮動之點耳鳴四肢冷脉小而數滑血虛者皮膚呆白色

口唇舌牙齦之色亦然四肢冷心悸頭發血管大跳動脉

小數而滑此兩等人在後發病之法從忽然聞聲心思激

動或為大力而得之治法在充足者照充足之治法前見

軟弱易激動者安慰之留意其胃與大便卧時用平火安

心藥見方七十在血虛者照血虛之治法前見

安神藥與安神藥味毒藥服之過限能有第一種血厥頭

痛即充足發熱病時亦有之其時背與四肢亦有痛中風

之初亦有之癆病初層亦有之其時尋常祇聚及於額

二胃不消化或兼發頭痛即極不安之頭痛病勢與

別種頭痛之分別在其胃與養生路有病證據其痛常

有一定之處即如在左太陽及右眼之上即肩或在額上

尋常朝晨起身時有痛輕者延至於早飯後更重者初起

有呆痛並無界限後漸歸於一處其時欲嘔發氣溢出酸

水並吐心思昏亂眼視不明耳中有聲有時胃中之物吐

盡則愈或吐出有沫之內皮汁或膽汁或接有泄瀉其期

從數小時至三四日重者隔一時復發人甚苦楚根原

胃與大便之功用不準足多用輕瀉藥使養生路軟弱所

致極不安之頭痛在經行之前後有之在其期之半亦有

養或鎂養食物須準足運動如其根原輕者則用吐藥頭

痛極不安而入延者用吃嘔略作吐藥每日早起用之甚

妙如吐出多膽汁則逐膽汁之藥可用之見方二百如太

便不準足大黃與鉍可用之如多發氣則松節油與苦里

亞蘇脫可用之以冷水淋頭亦可減輕之在病初起時用

淡輕養炭養五釐可止之

三身內器具頭痛病勢此病與前病之分別在關係

於全腦或病處深其輕重不定且無盡減去之時其痛又

似充足之血聚頭痛如與胃不消化同來即嘔吐亦不能

減其痛其病之根原至久在腦髓功用病證據顯出即如癱

瘓抽搐病証是也治法此頭痛為病之證據故須治其

本病腦中運行血法須留意察之有界限之放血與全身

之放血瀉藥與引病外出藥須用之全身情形亦須留意

如腦有久延生炎病須用汞藥至於牙齦紅腫為度

必須詳問頭痛之根原而分別其類治法必照其類即如

其人間有額痛實已患肺癆病是也補註

腦並腦胞膜生炎

分別一總生炎即關係於全腦髓並腦胞膜或為其大

分二有界限之生炎或關係於腦髓之一分或腦髓與

一腦與腦胞膜總生炎

證據 有一種病發極大之頭痛並有重昏暈又有一種欲嘔吐出膽汁大便久秘結又有一種全身有癩証又一種不能開口此種甚少

病成時頭內大痛太陽與頸骨之發血管跳動面色紅眼紅有光彩瞳人收小面貌特有一種異形不能耐聲與光知覺極靈常醒少睡重昏暈並有癩証皮膚熱而乾脉實而數時而滿時而短縮舌紅而乾或有白苔口渴甚有欲嘔之勢並吐膽汁大便秘結此證據俱屬於激動之一層延至一二三日其證漸退後即有昏暈耳聾目視不明瞳人不靈至眼肉筋條跳動冷汗各竅之肉筋條寬鬆溺積而不出或有重暈睡

在中喝時此病極速自一小時至四十八小時將死瞳人收小不靈呼吸急促促有腦生炎之據速變暈睡有時從初起即有癩証然大半至死不顯此証也

結末 傷命者結於暈睡或結於大乏力無神昏之證據其愈者間有能完好或結於癩狂或癰瘕其期自一二日至半月或更多

根原 受極大之熱或寒暑有大分別太陽之直光運動太過激動之欲念讀書過於辛苦胃中有惹動之物身體

受傷飲酒過度痛風移動風濕皮膚生炎痘疹類病出牙肺本體生炎內腎之病並各種發熱病最易得者血中有膿發熱以上各種病俱能累及腦生炎

病勢 與發狂之分別在其確有發熱之據且顯出極速與發熱神昏之分別在其昏狂為第一層而非第二層與失血徵驗之分別在其全生炎之據並面有紅色能知之與酒狂之分別在其情形皮膚熱而乾兼大發熱且無顫動而知之大概酒狂之時面色呆白皮膚滋潤四肢顫動病人尚能問答

成病之體 腦胞膜變厚發出細倫清汁或兩物相併或為膿在腦胞膜之間或在腦內空處而其邊變軟腦體剖開之面有許多血點本體有淡桃紅色邊有灰紅色不能洗去之腦本體成膿變軟或變硬因中喝而死者肺與心之右房有充足之血

決病 易愈者睡與知覺復來汗熱而均勻泄瀉鼻中出血脉至數減少漸漸漸虛如已用汞藥則多口津不易愈者暈睡難咽食物極無知覺顫動癩証便溺自出溺不生面色呆白在中喝者死者之數略居百分之五十

治法 一 在其激動之時指明滅其頭中運行血法之勢力

甲先將頭髮薙盡以冷水常洗之或用冰水或用常流下之水此爲更妙最宜於重昏暈時

乙放血在立直或坐直之時臂上大放血一次依年紀男女及病之輕重定放血之多少與次數後在頸骨上弔血在太陽處用蟬吮法或開太陽之發血管更妙

丙初起時即用瀉藥草麻油或巴豆油或大服之汞綠與嗎囉嘶或用汞綠半釐爲一服每隔二三四小時服一次

丁用壓血氣藥不令其致吐打打伊密的爲最妙者每一小時服六分釐之一至四分釐之一至於脉有效驗爲度

戊在下肢用引病外出法卽如芥末外敷法或用一大弔炎膏貼於大腿之陰面或浸足於極熱之水中

己用睡藥鴉片克羅路勒獨用之或併用之如昏狂極重並呼吸爽快則止

庚極清靜安息房間宜暗而寂靜頭與肩宜高於其身

二 在僵臥之時用重瀉藥服之有益頭皮上敷弔炎膏甚多

極乏力之時須飲淡輕酒葡萄酒牛肉清湯與長肉之食物鴉片或鴉片酒謹慎服之如不能咽食物則將食物與藥從肛門噴進膀胱之情形須查驗明確其溺須每日二次引出之

三 在全愈之時病者食物須時刻留心以均勻爲要用輕瀉藥使大便秘易尋常事業須待身體全愈方能修之如病還復頭上卽用冷法並引病外出法尚須用更速之瀉藥如性靈不復原善於遺忘病人有久延之病病與微動須用冷水搯身或每日早起用噴淋浴頭上隨時用弔炎膏或在頸骨與臂用針線弔炎法

中喝之治法以淋水法爲最佳

二腦髓有界眼生炎或累及腦胞膜

證據 常不顯明與生炎之廣狹輕重相等與腦之處有關係大概第一證據有痛全不痛者甚少與運行血法有相關頭眩耳鳴眼光不清或不準指與手臂之知覺加靈或全麻木身之各處亦然四肢略有痛証之動法隨時嘔吐昏暈或不安息或失望臥不安靜其性靈亦累及若干分運行血法不平均脉來有時緩而合度面色呆白有時脉數面色紅此相反之情形在頃刻間遞更有之常有嘔吐之勢病有加重或減輕此證據亦隨之而加減且有數種肉筋條強硬致有至眼與醜態口語有幾字不清有時難於咽物如四肢之肉筋條如此累及則向內彎動之必有大痛瞳人常放大或大小不等一眼或兩眼之光俱不正極重者四肢之收束更失其知此各症之內筋



此方

俱放鬆病人沈重極乏力間有全身有痼証尋常在半身加重

病之久暫不等重者在數日內即死久延者數日或數月或數年或有輕之一種忽然變重腦胞衣之處生炎累及甚廣闊

成病之體 腦髓受累之處有血積聚變硬色白或紅亦有發軟者血從微絲血管溢出膿汁流至近於生炎或爛之骨上有胞之膿瘡發肥膩質變骨或血管上成跳血囊死肉有胞小蟲周圍之腦體俱生炎癰癰之瘤亦累及腦胞膜之病或全或祇為幾分並有細倫汁溢出有數種根原因頭內之血管有非布里尼之塊塞住此非布里尼塊從脉管跳血囊或心內門扇病而來

根原 痘疹類病即發紅發熱病血有膿發熱病頭骨有癰癰或疔毒病或腦胞膜受傷即為擊動或生小蟲病勢 與全腦生炎之分別在其抽搐痼証或癰癰有界限即如身之一半或一肢或一箇器具具有累及之事瞳人眼大小至眼視物有雙形舌伸時略偏於一邊一肢麻木或振動俱為此病之兆

論病勢者觀下所載之數端更能詳知

一 腦體一邊有病使其身之對邊有癰癰或別病然而

臉面不在其內醫士波爾答云腦體一半有病在二十八人中其面上對邊之內筋條俱患癰癰在十人中面上對邊之內筋條患癰癰在八人中眼之同邊肉筋患癰癰有四人其在對邊舌伸出時幾常在面部癰癰之對邊舌尖常向面部癰癰之一邊

二 如其病祇歸於腦髓白色之一分內且不使其相近

處有壓住則其病情不從腦筋不準足之功用顯出

三 如病害及腦內絢紋體即有對面半身癰癰

四 如病累及於腦內之光根即有身體對面一半失知

覺並眼光有差

五 如病累及於大腦際西名萬羅里之橋即有對面半身癰癰

並失知覺

六 萬羅里橋之中如有一塊或一癰即在身上兩邊失

去幾分動作與知覺眼睛與眼皮肉筋條行動之知覺亦

累及耳之肉筋條亦然

七 如病累及於小腦即使對面半身之動作不準足並

使輟轉或向上或向下之動作不準足

八 大小腦蓋有一塊或受壓即阻當咽物並呼吸之功

用

從背脊髓有病而來之癰癰與此病有分別開列於下此

事能相助表明腦筋之病情屬於何種

一 如耳內有久延發膿之病即可知耳門骨之石分已爛引出發膿生炎在其近處之腦體或腦胞膜上

二 如小兒之軟弱患瘰癧者時欲臥覺身重不安息漸不省人事手略有振動並握拳磨牙至眼上視即可知腦體內有瘰癧之瘤或在腦胞膜上

三 頭眩忽然頭痛有界限後屢發重痼証即可知腦中

生有胞衣之小蟲

四 腦體有久延膿瘡為最不明顯之病曾有一小童左額受傷昏暈數小時然痊癒甚速八日以後仍照常作工

如是以後作事如平常至於死之前三日而止其傷處在第三十二日上結疤毫無受傷之據亦無痛其身體靈性甚好但稍易動氣在第三十九日上面色呆白不安靜覺

上胃所有痛並極不安在前一夜中遺溺至醫院時有一次幾跌倒猶夫暫時失去足力情形夜間又遺溺明日其身右半之功用已失又明日早晨不能咽食物午後四點

鐘即暈睡呼吸深脉瀉去來難且亂如此情形延至下一日

晚間三點半鐘即死一箇厚胞衣膿瘡有青色厚膿其重六兩在腦左枕之前葉上因此而脹大其腦胞膜腦因

外傷而生膿瘡即有醫士常察之亦不知其暗長所以其

根原從內而來更難知病之有無必待至累及知覺或動作之中處或至於累及腦筋之根方能知之

腦中風並有幾分變軟在中年人因血管有病而來決病不論病之為何層俱不易愈最難愈者已有抽筋癱瘓之徵

治法 依其根原可用腦全體生炎之治法但須略輕如

頭有大熱則取血或用蟬吮法輕者在耳後貼耳膏或貼於枕骨下頸上如久延者在枕骨下用針線穿灸法用

鹽類輕瀉藥令其大便易行食物宜少性靈身體須安息如累及腦胞膜用汞藥至於全身有驗為度

腦胞膜生炎

證據 腦之朕膜內膜生炎之初俱不相同有初起忽然頭中有痛大聲呼喊後有痼証者有忽然全身有久延痼証者又有一種在痼証二三日之前覺不爽適略有頭痛

欲嘔與吐脉比尋常更流利間有比尋常減其數者如病已完全則其重證據有大痛反側動作哭聲尖利不耐光

與聲磨牙不欲睡重昏狂面紅眼似有淚常有抽筋痼証隨時至眼嘔吐亦為尋常之證據大便秘結如傷命者即結於暈睡

外胞膜生炎初起頭痛發熱抽搐其發時整齊如瘧初起

不甚累及性靈然病已深則人欲暈睡如生炎通於則胞膜或通至腦體即將有該處生炎之證據此病自發者少大概隨頭皮或頭受傷而來或耳中生炎而來

根原 腦胞膜生炎常為傳染發熱病之據尋常因中喝而得在嬰孩時因都比迦力停留腦胞膜上為常有之證據

觀都比迦力腦胞膜生炎節

治法 依其根原在中喝者須以冷水淋其頭多用行血氣藥物發熱病之腦胞膜生炎須用發熱神昏之治法在都比迦力腦胞膜生炎壓血氣之藥物不準用其餘之治法與腦上有水重病之治法相同

腦上有水

分別 一重者 二久延者

一重腦上有水

證據 此病之初起亦屬不等有時先有軟弱不活動失飯量嘔吐舌焦皮膚熱乾面紅並發熱病之別據或有嬰孩虛發熱之據

見本節

又有一種其初發之證據與腦及腦胞膜生炎之證據相同又有一種不甚明顯從發熱病或

痘疹類病引出之

病之初層頭中有重尖痛頭頂上熱不耐光眼似有淚而紅面亦紅皮膚熱乾瞳人收小而眉皺病人極不安靜常

有吼聲無歇息時頭常調動卧時短常有惡夢驚醒或自喊驚覺行路不準足手常舉起而捧其頭脉加數實吸吸急有歎息聲舌有苔欲嘔或吐大便常秘結或分多糞臭小便少昏狂與癇証此層內常有之在嬰孩額門動甚速後變癲緊而高凸

若干時後證據能減輕痛亦減少有低吼聲本常應直至此時有不爽適之卧代之瞳人放大常有歪眼臂上肉筋條常癰緊而硬有振動握拳則大指在內脉分外瀉間有歇止然換其身容脉忽加數呼吸間有深歎息至眼裏甚瞳人放極大至於見光不再收小視物有變形或眼光盡失此時即有暈睡從之

在傷命者瀉脉變為極小而急呼吸更深四肢有癰証或癰瘰皮膚有冷汗便溺自遺在癰証暈睡或乏力間而死壯年者之腦上有水重病不多有之腦上有水為嬰孩之病然醫士希伯定之記錄有云一壯年者頭中有大痛有時食飯無限有時竟不能食變為昏狂癰証愚笨而死腦中小房有水脹足至於刺一小孔水即射出甚遠此病大約有一水疱之瘡

結末 全愈甚遲或死或變為久延之一種成病之體 有時頭脹大骨縫放開胞膜凸出腦小房內

胞膜中有細倫汁或清或濁相近之腦髓變軟腦之縐紋因受壓而失去腦體上有都比迦力定質內胞膜分外紅腭膜暗色內胞膜上有半透光或暗色之體或散開或成羣或胞膜上有都比迦力定質其大小自胡麻子形至豆形觀後第七十一圖

根原 向病之根原嬰孩與少年乏力瘰癧病性激發之根原大小腸惹動出牙耳內生炎延及發熱病與痘疹類病小兒讀書太早引出之根原即內腦膜中大有都比迦力定質嬰孩虛發熱亦能引出之

病勢 頭熱顙門脹大抽筋痼証歪眼從之瞳人放大暈睡俱為著名之兆都比迦力從其傳代病性而知之肺內確有都比迦力頸核脹大或有別種瘰癧病性之兆與假腦上有水之分別假者有呆白色之面貌皮膚冷大乏力無發熱病之據或其面容暫時現紅色且其顙門凹下非凸起者此因嬰孩失血入泄瀉或為別種乏力之放棄津液

決病 極難愈如有歪眼者最難愈脉軟弱歇止頭脹大呼吸深而難大小便自遺

治法 與腦體生炎之治法相同須留意病人之力量或有意動之弊或否如為重生炎則每三小時用小服之銀

灰散一次如牙肉熱而腫割破令寬適口上或耳下用蟬吮法如痼証極重並因出牙而不能臥黑暮拉克草之精質為相合之藥如病久延且有瘰癧病性則久用汞藥必將受累故須用有界限之治法並輕瀉藥與平火安心藥有界限之治法用布醺冷水或醋與水或冰水或酒水敷於頭上冷水可淋其頭頭須略抬高其時身與四肢浸於熱水內用引病外出法即如芥末外敷法或中炎膏貼於太陽或耳後或頸骨上此皆有益可同時用之

二入延腦上有水 證據 嬰孩有從胎即得此病者壯年者不易有之然傳教士蘇以傳德因此病而死從初生至八歲常有患此病者以後不多有之其來法或不明顯或從重之一種而來發時疲倦乏力歪眼嘔吐大便秘結暈睡並痼証頭骨開張顙門脹大頭有腫至極大者然此病延至數月或數年者有之

根原 向病之根原瘰癧病性激發之根原在生時腦受傷腦中有瘤出牙大小腸惹動重腦上有水

病勢 言其情形頭大於常見顙門凸起為父母者常因小兒頭大疑其頭中有水行醫者見此情形如不見他證據不可即以為此病



決病 此病尋常能傷命結於癰証如骨能分開讓之則病可入延

治法 指明第一法令其溢出之流質收去第二法令其身體復原

第一法 頭上貼弔炎膏再用斑蝥或沙填膏藥令其入弔炎用打打伊密的膏搽之或在顙門上穿線曾有人將前顙門沿中之縫刺破取出多細倫但其效驗不多故未通行用像皮膏之條繩緊常用冷水庶幾阻其流質之溢出待至於骨縫再并合爲度

第二法 藥敷於皮外又服之至於牙肉發痛如身內有疔毒並癰癰則紅汞或鐵劑宜之

食物宜少且宜長肉可略飲酒如居住於低溼之處須更換水土或至海邊或至乾爽之內地

補藥中以鐵葡萄酒爲最宜

中風

發明 忽然失去動作功用其知覺有幾分不準足因腦髓受壓力之故腦髓有受傷者有無傷者

分別 一單中風即腦內血管血積聚並無裂碎 二中風有細倫汁溢出或兼血積聚 三腦內溢血中風或血積聚而管裂

證據 此病發出之法有三 一病人忽然跌倒毫無預知之兆猶夫一擊即斃也 二有一短時預戒之預即重頭痛極不安眩暈 三忽然半身癱瘓

第一種者病人跌倒於地口發沫頸骨腫面赤舌青瞳人放大口略歪向一邊大小便自遺四肢冷色青皮膚有冷汗數分時之後即死

第二種者發時有昏睡呼吸遲而有聞聲噴氣藥物難面貌充足有烏青色眼飽滿而停兩瞳人之大小不同四肢或不動而強硬或有癰証尋常在一邊更甚大便或久秘結或不能禁小便或自遺或膀胱內既滿而滴出脉滿足有力而滑間有滴者

此病之稍輕者不失其知覺仍能言語但略不便耳間有得癱瘓之一箇證據祇在言語之不清耳

中風間有預報之證據即如頭眩而痛頭內覺受壓力意思不清楚不聯絡善遺忘言語聲不清面貌充足鼻內流血耳鳴眼有閃光見虛形變形暫時眼睛或耳聾倦四肢麻木面色呆白欲嘔或吐並發暈

結末 卒死或隔若干時而死或竟全愈尋常先有嘔吐大汗或愈幾分性靈累及若干分並有癱瘓

成病之體 在單中風即血積聚中風腦之血管脹大腦

小房內或腦底上溢出流汁或竟無之在細倫汁溢出之中風小房內或胞膜內有細倫汁在腦內溢血之中風腦與小房內腦底或腦面俱有血

腦體多血管之處最易溢血醫士阿欽之記錄中風者四百四十四人其中縐紋體有溢血者二百六十八人光根溢血者三十九人大腦葉有溢血者八十一人萬羅里橋有溢血者二十二入腦體別處有溢血者三十四人即每中風百人內腦體內各件有溢血者如六十八二十五七我等常遇前時曾有此病之證據因腦體上有新結成之凍血塊其旁邊有界限生炎變軟如其前層已久有之則其凍血塊老而收小無色且其中有血精塊或有一結成之小胞其中略有細倫俱為前時有此病之據

病勢與飲酒太過情形之分別在其口氣之臭而知之與尋常中毒之分別由其情事之來歷而知之與飲酒中毒合成之分別如為中風則其身體兩邊動作之力不同假如一箇瞳人收小不能與光相應一箇瞳人放大而停一邊之肢盡失其舉動之力至於臂或足下垂似一死物然其對面一邊之肢則僵硬不軟如其四肢有癆証則兩邊之動法仍不相等後必顯出腦體損傷有界限之據如欲知此病之確實須留意腦體數分生炎之證據

觀腦體有界限

生炎或累及胞膜一節

決病 易愈者少年性靈知覺累及者少鼻內或肛門內血管流血泄瀉大出汗脉至數適中並有尋常情形呼吸如常不易愈者累及知覺太多則為難治脉滿實急然身動呼吸有大聲兩頤豐滿常有冷層身發熱從之時有嘔吐癆証強硬大小便自遺或溺秘不通四肢冷汗冷而黏

賦

根原 向病之根原年紀自五十歲至八十歲年愈老則愈多有之二十歲以內略有幾人至於嬰孩時雖為極壯之體但此情形之相反者亦有之然而極少傳代之性常坐之事業飲食過多尋常棄津液不通充足因心門扇之各種病阻當從頭迴轉之血最常有之根原為頭內血管病證即如變肥賦阿得路瑪

即血管內小珠

血管變骨因此令其失去凹凸力血管將脹大其胞衣變薄設運行血法受小

震動則能裂之

觀總尿管跳血囊一節

激發之根原運動太過大聲呼喚假如唱曲或吹樂器大便時用脹力咳嗽忽有重憂慮極冷極熱常蹲坐或從蹲坐而忽然立起頸骨受壓力情慾極重時飲酒過度毒藥即如鴉片悶死溺死縊死絞死或受毒氣最易者為炭養

氣與痰養氣

治法

當病發時速解鬆其衣領舉高其頭或坐高椅內

如面貌充足眼紅或面色已呆白脉滿實曳動則在其頸

骨或臂上開一迴血管或稍割破太陽發血管令其流血

至近乎暈絕須留意不令其暈然其面如有呆白色脉軟

弱並有歇止須依暈絕法治之不可放血待其血迴轉並

上所言之證據已顯以後之治法須減心之行動法並減

腦內運行血法之勢力

一 隨時在臂上放血從臂凹迴血管開小口而放之病

人坐直此時須診其脉如血脉滿足之情形略退即當止

之

二 蟬吮法與抽氣放血法用於頭與頸骨上

三 重瀉藥用巴豆油一二滴最易而有效用瀉藥之外

導法

四 如身之熱度加多加冷物於頭上

五 枕骨下用甲炎膏頭頂上亦暫用之

六 食物須用小粉類留意漸加至長肉之物

七 如用大餐以後發此病即將雞毛探喉或用吐藥令

吐盡其胃中之物
如月經或痔瘡之棄津液停止則用蟬吮法於陰戶或肛

門邊如有深暈睡或暈絕則用弔炎藥水搽於枕骨下濃

阿摩尼阿置於鼻下並用松節油外導法熱汽浴行血氣

藥曾用之而使人復甦有此情形即復用減輕法

如痛風或重風濕病透入之後中風即起速用輕瀉藥

如嘔物甚難則供給食物與藥須極留意藥物不當有惹

動之性亦不可多用體積食物須用小勺與之天便以含

瀉藥之外導藥治之溺秘不通必設法引出

如病還復即用初起之治法治之然須略輕全愈時頭骨

上可用針線弔炎法如不欲睡有大激動情形鴉片為合

宜之藥然在中風早層不可用鴉片

治中風法無論何時用減輕法不可太過因過於減輕將

有傷生之事最忌者在年老軟弱之人此等人祇令其大

便得尋常之便利已足收少其食物依其脉之情形定用

酒與行血氣藥物之數

預防法 有此病性之人須戒酒類葷物用之均勻留心

免去易消化之物有須單用素物或牛乳者如重證據還

復食物宜更少並用瀉藥如慮不足則在頸骨上打火確

或用抽氣放血法熱房間與夜深晚飯須免之清氣中均

勻運動度日須省儉大便令易衣服寬鬆身體軟弱者須
用稍長肉之食物相配之輕行血氣藥物即如含鐵收欬

藥或含酸之補藥各種事業生意均須停止戒除各種動心之事欲防中風引出之癱瘓觀癱瘓筋

腦髓久延病

大概腦髓久延病爲其本體軟而枯或變硬脹大此病之證據與病勢極暗而不明確雖其證據相同而其病不同有數種其病之有無不能照證據指出即如醫士羅埃云腦之外胞膜上生微細菌者有二十人其中三人有腦病之證據論及膿瘡潰水疱有胞衣疱並骨脹大俱無證據

一腦髓變軟

證據 此證據性靈與身之勢力由漸衰敗竟至於呆弱其行步不爽舉不準足手力軟弱言語重滯字音不清有人以爲累及腦面縐紋之故最易者爲額內之腦紋記性不全身內器具功用不靈手足木有尖刺之知覺肘脉管

太陽脉管之曲硬可視而知之亦可按而知之明角罩之

上下邊有老人環

此即老人明角罩所有之白彎線

病人易得中風尋常

自覺無望不安息不平和並易哭此等人易生妄想似有

大富貴之事如無人禁阻即入邪僻

結末 早晚將有中風或爲細倫汁溢出中風或爲溢血

中風

成病之體 腦體較尋常呆白甚軟用水輕沖之即散極

重者竟似半流質有蜜糖之形此腦體之軟因肥膩物過多或成大珠或粉碎極細血管俱有病腦內之大血管與肘脉管之情形相同粗發血管有時脹大變薄且有虛生阿得路瑪留料令其硬有時竟變成骨管如軟腦髓既已沖去將顯阿得路瑪或成骨之網形血管根原 缺少養腦髓之物因其血管有病大發血管或其一支以血塊塞住此血塊或從心門扇生炎而來或從脉管跳血囊而來

決病 難治

治法 在溫和之乾清氣中徐徐運動易消化之長肉食物多用酒淡硝強水與燐養與苦味藥水相和鐵綠與銻之鹽類服七日或十四日此酸與鹽類更換用之隨時將其頭與肩舉高戒絕各種動心動身之事

二腦髓變枯

腦髓收小周圍有細倫汁圍之或鋪於腦紋此係癡人頭內尋常之情形

三腦髓變硬

此病大約爲久延生炎之徵驗腦質比尋常更硬更少血管似珠白並硬如煮熟之蛋白其變硬或爲數分或爲全分癰証爲此病尋常之證據

四腦髓脹大

此病在嬰孩時有之與腦上有水同發患瘰癧病之嬰孩有之腦軟於尋常腦之縐紋壓扁腦內小房縮小呆白色不欲食不安息隨時頭痛頭眩爲其證據隨有癰証屢發卽死

背脊髓與其胞膜之病

分類 背脊髓生炎 背脊髓胞膜生炎 背脊髓別病

總論 左右半截癰瘰屬於腦髓之病上下半截癰瘰屬於背脊髓之病腦有病則性靈與特有之知覺大半累及背脊髓有病此等不累及惟動作之器具必能累及

茲將論背脊髓病之數端開列於後習醫者須留意焉

一 設背脊髓之後股盡行割斷其割斷以下各處盡失其管束此處動作之權如不全割斷祇不能全管束之但此兩種損傷處之下其知覺分外靈

二 背脊髓前邊之股如割斷之則身內此半邊割斷以下有癱瘓

下有癱瘓

三 若盡行割斷其中灰色背脊髓物則以下盡失知覺

如割斷灰色背脊髓之半則其對面下分失去知覺

四 若背脊髓半分盡行割斷則令其以下同半邊失其動作卽癱瘓而知覺加靈並令其對面半分失其知覺

五 背脊髓病處有生炎激動則使其癱瘓之肢強硬收束其時無生炎之病或生炎已過其肉筋條放寬

背脊髓本體生炎

證據 累及之處有呆木之痛不可觸動失知覺或自主之動作或麻木而知覺不全上肢或下肢或弱或爲兩肢或爲一肢或一肢失知覺一肢失自主之動作癱瘓之肢漸枯然其迴轉行法之功用仍不累及累及之肢之內筋條或放鬆或收緊或有癰証將有溺秘不通或遺溺大便亦不禁胯骨與背有隱瘡至末病人乏力而沉重或因病通至腦暈睡而死

病之證據與情形依病之所在如頸骨一段背脊髓累及臂將癱瘓咽物呼吸俱難胸前與上胃所覺壓緊脉有甚瀉者陽物久舉爲惹動之證據

如背上一分背脊髓累及身常有久延之癰証心多跳動

呼吸難腹上覺收緊

腰間之背脊髓累及臂與呼吸如常足患癱瘓溺秘不通

後自遺大便秘結後亦不禁此外背脊髓有病男子常缺

精

有時此病發出極不明顯無痛行法甚遲至入膀胱直腸

小腿俱癱瘓

成病之體 生炎結於背脊髓變硬或變軟或成膿瘡或為數分或為全分

根原 向病之根原中年與男子激發之根原跌打損傷用力太過過濕與冷背脊骨爛瘰癧病色慾過度

病勢 與背脊髓別病之分別在失去知覺更全其灰色質即通知覺者最多微絲血管故最易生炎

決病 全愈者不易有之但其病能久延至數年

治法 在早層時蟬吮法或抽氣放血法可用於患處在

其近處以引炎外出法從之如弔炎膏割皮入豆弔炎法或針線弔炎法等瀉藥安息常察其膀胱情形須潔淨病人須臥於像皮水褥上全身之治法依病者之情形與力量

背脊髓胞膜生炎

分別 一背脊髓胞膜重生炎 二背脊髓胞膜輕生炎

或背脊髓激動 三背脊髓胞膜風濕生炎

一背脊髓胞膜重生炎

證據 累及之處有痛震動敲擊受壓或熱則加其痛痛

如風濕沿於背而至四肢有時其四肢觸之亦痛其痛有

時圍住胸膛或腹背與頸骨縮短四肢亦然依其病之所

在則身體變式假如楔形或角弓形或全身振動有時有

癰証或臟燥之振動頸骨腹胸膛似覺切緊並覺昏悶間有溺秘不通大便秘結

在十日至十四日之間大概病將不治其時則有昏狂暈睡或神昏之據

成病之體 腦膜並腦胞膜生炎其腦膜下有溢出之細倫汁或在腠膜與內胞膜之間又有背脊髓本體生炎

與其徵驗

根原 即與背脊髓本體生炎之根原相同

病勢 在其強硬振動或癰証間有在其累及膀胱之病而知之

決病 較之背脊髓本體生炎則易愈然其危險亦甚大治法 蟬吮法與抽氣放血法用於累及之處以重瀉藥從之確能減熱之食物不可坐直極安息放血之後可用冰袋相近之處則用引病外出法膀胱之情形須查明如有溺須令其放出須服承藥至於全身有效驗在暈絕時須以易化散之行血氣藥助其力並用外導法

久延之一種並有癰瘕與四肢之振動或強硬須用引病外出法即如用移病法針線弔炎法艾絨灸法

二背脊髓胞膜輕生炎或背脊髓激動

證據 背脊上累及處有痛若重按之或擊之或熱之則



加其痛痛在身之左半或在假脇骨下胸膛一切肉筋條
與其全腹或至於患病以下各處難呼吸心多跳妄言笑
失望激動大便祕結或不準足腹中發氣昏暈之後或在
哺乳時或孕時此病更重

病勢 從頸骨至腰若用指重按則能查得有痛之處在
此處敲擊身之邊胸膛或腹能有痛或有痛則更甚有
時此種浮面之痛與身段痼証之動法同有之

根原 向病之根原婦女在年輕之婦女此病與背脊髓
病同有之激發之根原常坐之事業束腰太緊不運動大
便秘結月經行時有痛白帶初起時其根原與其徵驗互
相加重氣喘與臟燥時背脊痛亦多有之

病理 不可觸動之背脊因是中段一端關係於子宮或
大腸有惹動又一端關係於胸膛或腹肉筋條之痛此種
激動從累及之處之腦線通至背脊在此處顯出不可觸
動之據後通至一有痛之處肉筋條有痛與背脊不可觸
動相連敲擊背脊即能知之因此時能加肉筋條之痛

如背脊惹動已甚似乎背脊髓胞膜重生炎如壓背脊則
有大痛大痼証之動法略壓痛處亦能有痼証敲擊他處
皮膚或敲擊背脊累及處之上下分則不能引出痛或痼
証之動法

決病 易愈此病用治法尋常能全愈若耽延則病能加
重且致傷生

治法 一有界限之治法蜈蚣法或抽氣放血法可用於
背脊不可觸動處引炎外出法用弔炎膏行血氣之藥水
或打打伊密的膏肉筋條痛處用啤啦咭或鴉片膏
二全身之治法須令大便準足補藥與平火安眠藥羊躑
躑為最佳須用之如病在月經須用相合之治法

三背脊髓胞膜風濕生炎

證據 痛無界限有時甚重近背脊不可觸動臂或腿
有大痛依其病之累及背脊上中分或下分有時痛至不
可觸動祇歸於身之一處近於背脊此處有紅色不可觸
動亦能發出紅水蟻癩四肢之痛久延手指麻木失力或
全癱瘓

病論 背脊髓胞膜之絲條有風濕症凡處肌肉之筋亦
然兼有界限之皮膚生炎

根原 向病之根原即風濕與痛風之根原濕熱之根原
遇冷與濕乏力

病勢 與肉筋條風濕之分別在乎有界限之不可觸動
並失勢力

決病 易愈然須極謹慎

治法 蜈蚣法置於不可觸動之處以熱敷法從之並用

風濕之治法 觀風濕節

背脊髓別病

背脊管內亦有細倫汁溢出與頭內同在外胞膜之外或在胞膜之內或在腓膜內

在上所言之處亦能有血溢出或從跌打而來或因大力所致然有時自能溢出

並無危險不測之事其證據腰痛肉筋條跳動膀胱直腸或下肢癱瘓癰疽或暈睡以致於死

背脊髓之胞膜變厚與硬與腦體之胞膜相同從一箇根原而來微細菌類生於外胞膜上即有壓力而得癱瘓背脊髓亦能變枯或脹大或有都比迦力留料癰疽水疱脉

血囊並別種瘡

論此各病之勢極難而不確決病不易愈治法大概能減輕如有生炎則屬於背脊髓生炎之病

背脊髓亦能受擊力即如跌仆或夾緊如為重擊力則令四肢失其迴轉之動作其治法與腦病之治法相同

有一胎生背脊不準足之病謂之背脊鏽開是為流質之瘡在腰瘡骨背脊骨或頸脊骨上與背脊管相通其大小

不等有時透光紅色或紫紅色如按之則有壓力之證據

總說四肢不全直腸膀胱常癱瘓間有此處無皮膚其痛但以背脊髓之胞膜包之背脊內胞膜有血積聚脊脊跌刺支在其中線處分開腓膜處有流質或為細倫汁或為血或為膿

此種瘡曾有多人用法治之但總不能成其治法用針放其流質然後紮緊如其皮膚不全或薄必須用不易壞之蓋護之

知覺腦筋之病

分類 腦筋痛 面部腦筋痛 妄言笑腦筋痛 頭痛 腦節 大腦筋通及處之腦筋痛 失知覺

腦筋痛

痛幾為各種重病與多輕病之據如特為腦筋之病則謂之腦筋痛痛之處在尋常知覺之腦筋然又能關係於器具之腦筋

腦筋痛之根原甚多從哺乳過久而來之乏力為其尋常之根原失去棄津液或失血過久過多者亦有此病如祇歸於頭或面之一邊並有往來其尋常之根原為瘧疾常時從遠處惹動而來即謂之相連之腦筋痛即如肩之痛與肝之病相連上臂之痛與心之病相連因其痛處並其根原處為聯絡者然亦有不如是之相連者即如面部腦

