

保壽經卷貳
名醫必讀

李繼文題簽



可	瘰	伏	合	太
不	濕	氣	併	陰
可	暍			
		平	復	少
		脉	病	陰
	辨	霍	壞	厥
	脉	亂	病	陰

訂正醫聖全集

中

保身壽世真經

家藏一分
所費幾文
有暇讀之
永保長生



南京中医药大学图书馆版权所有

辨太陰病脈證并治全篇

吳子曰自漢迄今醫書皆謂三陰邪不傳豈知如論中下利腹脹滿身體疼痛者先溫裏乃攻表陽邪傳太陰之寒證也少陰下利白通湯主之此太陰寒邪傳少陰也下利清穀汗出而厥通脈四逆湯主之少陰寒邪傳厥陰也○文按非但陰邪三陰互相傳變并陰轉陽還入表府也故聖人三陰篇亦有汗下諸法非汗下三陰也汗下三陰之邪重複傳還表府實證陽傳陰陰轉陽邪陽傳陰多死陰傳陽立解文所最怕者陰邪還府表之際其人必煩市醫復以犀羚羊

麝珠石苓連遏之使仍入於陰有不死者鮮矣。
數語切中時弊誠心濟世保身者宜熟讀之也。

太陰之為病。腹滿而吐。食不下。時腹自痛。若下之必
胸下結鞭。自利益甚。○傷寒四五日。腹中痛。若轉氣
下趨少腹者。此欲自利也。○自利不渴者。屬太陰。以
其藏有寒故也。當溫之。宜服四逆輩。理中圓方。人參
白朮甘草炙乾薑各一兩。右四味。搗篩。蜜和為丸。如

雞子黃許大。以沸湯數合。和一丸。研碎。溫服之。日三

四夜二服。腹中未熱。益至三四丸。然不及湯。滌寒氣湯勝丸

湯法。以四物依兩數。切。用水八升。煮取三升。去渣。溫

服一升。日三服。○加減法。若臍上築者。腎氣動也。去

朮。加桂四兩。○吐多者。去朮。加生薑三兩。○下多者。

還用朮。悸者。加茯苓二兩。○渴欲得水者。加朮。足前

成四兩半。○腹中痛者。加人參。足前成四兩半。

腹痛加參

蓋痛有虛實。霍亂腹絞痛。無脉。四逆。加參補元氣。復脉。市醫那得知其故。

寒者。加乾薑。足。

前成四兩半。○腹滿者。去朮。加附子一枚。服湯後。如

食頃。飲熱粥一升許。微自溫。

余用余葱熨法。

勿發。揭衣被。

服法。

溫裏寓和表法。治自下利神效。

傷寒。本自寒格。醫復吐下之。寒格更

逆。吐下。若食入口即吐。乾薑黃連黃芩人參湯主之。

乾薑黃連黃芩人參湯方。乾薑黃連黃芩人參各三

兩。右四味以水六升。煮取二升。去渣。分溫再服。治隔氣病

緩勻多次服亦極驗傷寒醫下之。續得下利。清穀不止。身疼痛

者。急當救裏。後身疼痛。清便自調者。急當救表。救裏

宜四逆湯。救表宜桂枝湯。治雜病久利。清谷亦神效。下利清穀。不

可攻表。汗出必脹滿。更虛其陽故也。法當先溫其裏。下利腹脹滿。身

體疼痛者。先溫其裏。乃攻其表。溫裏宜四逆湯。攻表

宜桂枝湯。

治實熱。當先解表。後攻裏。虛寒。先溫裏。後攻表。定法。

發汗後。腹脹滿。

者。厚朴生薑半夏甘草人參湯主之。厚朴生薑半夏

甘草人參湯方。厚朴去皮炙。生薑切。各半斤。人參一

兩。半夏半升。洗。甘草二兩。炙。右五味。以水一斗。煮取

三升。去渣。溫服一升。日三服。

治凡百氣虛。中滿者。神效。

發汗不解。

腹滿痛者。急下之。宜大承氣湯。腹滿不減。減不足言。

形容實滿。

婉如自病。

當下之。宜大承氣湯。○太陰病。脉浮者。可

發汗。宜桂枝湯。

陰病見陽脉。邪還太陽也。

本太陽病。醫反下之。因

而腹滿時痛者。屬太陰也。桂枝加芍藥湯主之。

桂芍和肝

脾腹痛

主藥

大實痛者。桂枝加大黃湯主之。桂枝加芍藥

湯方。於桂枝湯方內。更加芍藥三兩。隨前共六兩。餘



依桂枝湯法。桂枝加大黃湯方。桂枝生薑切各三兩。

大黃甘草炙各二兩。芍藥六兩。大棗十二枚。擘。右六

味。以水七升。煮取三升。去渣。溫服一升。日三服。太陰反有

攻下法。猶之陽明反有溫補法。太陰為病。脈弱其人

學者於此深求之。醫思過半矣。

續自便利。設當行大黃芍藥者。宜減之。以其人胃氣

弱。易動故也。○傷寒。脈浮而緩。手足自溫者。繫在太陰。

太陰當發身黃。若小便自利者。不能發黃。

故黃病利。小便為君。

至七八日。雖暴煩下利。日十餘行。必自止。以脾家實。

腐穢當去故也。

余故簪人服薑棗湯。

太陰中風。四肢煩痛。陽微。

陰濡而長者。為欲愈。○太陰病。欲解時。從亥至丑上。

大黃甘草炙各二兩

劉翥曰身苦無餘命○大創無效則難外移至下

劉翥嘗去姑也湘蓮藥影
余如雀入

大創中風四姐歐歐則然

至十八日朝暴厥不語日十猶言或自山以報家實

大創嘗為良黃苦小則自除意不道發黃少則為苦
為黃清熱



北京中医药大学图书馆版权所有

辨少陰病脈證并治全篇

此篇吳子以腎為水火藏專論從化然聖人未嘗言之究似臆度故未錄

少陰之為病。脈微細。但欲寐也。○少陰病始得之。反

發熱。脈沈者。麻黃附子細辛湯主之。表證仍在麻黃附子

細辛湯方。麻黃去節。細辛各二兩。辛不過錢古二兩今二錢也分三服

故無礙也附子一枚。炮去皮。破八片。右三味。以水一斗。先

煮麻黃減二升。去上沫。內諸藥。煮取三升。去渣。溫服

一升。日三服。○少陰病。得之二三日。麻黃附子甘草

不吐利。

湯。微發汗。以二三日無裏證。故微發汗也。麻黃附子

甘草湯方。麻黃去節。甘草炙各二兩。附子一枚。炮。去

皮。破八片。

發陰家汗必用附子。恐亡陽也。

右三味。以水七升。先煮麻

黃一兩。沸。去上沫。內諸藥。煮取三升。去渣。溫服一升。

日三服。○少陰病。脈微不可發汗。亡陽故也。陽已虛。

尺脈弱。瀋者。復不可下之。余專用李氏回春丹。病人。脈陰陽俱

緊。浮沈弦兼見。緊為病脈。若尺寸俱緊。虛故也。反汗出者。亡陽也。此屬少

陰。法當咽痛。而復吐利。○少陰病。脈緊至七八日。自

轉入陽。

下利。脈暴微。手足反溫。脈緊反去者。為欲解也。雖煩

下利。必自愈。可與李氏回春丹。市醫因煩。以涼藥遏之。必死不救。少陰病。得之

一二日口中和。其背惡寒者。陽明燥渴當灸之。附子湯主

之。灸鬲關二穴。在背七椎下兩傍相去各三寸。腦中正坐取之。灸五壯。關元一穴。在腹臍下三寸。灸百

壯。少陰病。身體痛。手足寒。骨節痛。脈沈者。附子湯主

之。附子湯方。附子二枚。去皮。生破八片。茯苓芍藥各

三兩。人參二兩。白朮四兩。右五味。以水八升。煮取三

升。去渣。溫服一升。日三服。此方扶正達邪。為寒濕風濕。身痛百病仙丹。市醫戀

診金，但云
切不可服

少陰病。脈沈者。急溫之。宜四逆湯。

四手和足逆冷

也。

四逆湯方。甘草炙二兩。乾薑一兩半。附子一枚。生

用。去皮。破八片。右三味。以水三升。煮取一升。去渣。分

溫再服。強人可大附子一枚。乾薑三兩。

強人，年精力壯之人，反宜

加倍服熱藥。市醫獨用之。衰老弱人。何居。少陰病。下利。白通湯主之。白通

湯方。葱白四莖。乾薑一兩。附子一枚。生去皮。破八片。