

三

溫病條辨

善伯



問心堂溫病條辨中焦篇

汪瑟菴先生參訂

吳塘鞠通氏著

徵以園先生同參

受業姪嘉會校字

朱武曹先生點評

男廷蓮同校

風溫 溫熱 溫疫 溫毒 冬溫

①面目俱赤。語聲重濁。呼吸俱粗。大便閉。小便濇。舌苔老黃。甚則黑有芒刺。但惡熱。不惡寒。日晡益甚者。傳至中焦陽明溫病也。脈浮洪躁甚者。白虎湯主之。脈沈數有力。甚則脈體反小而實者。大承



氣湯主之暑溫溼溫溫瘧不在此例。

陽明之脈榮於面。傷寒論謂陽明病。面緣緣正赤。火盛必克金。故目白睛亦赤也。語聲重濁。金受火刑而音不清也。呼吸俱粗。謂鼻息來去俱粗。其粗也平等。方是實證。若來粗去不粗。去粗來不粗。或竟不粗。則非陽明實證。當細辨之。粗則喘之漸也。大便閉。陽明實也。小便濇。火腑不通而陰氣不化也。口燥渴。火燥津也。舌苔老黃。肺受胃濁氣不化津也。

按靈樞論諸臟溫病獨肺溫病有舌苔之明文

餘則無有可見。舌苔乃胃中濁氣薰蒸肺臟，肺氣不化而然。甚則黑者，黑水

色也。火極而似水也。又水勝火，大凡五行之極

盛，必兼勝己之形。芒刺苔久不化，熱極而起堅

硬之刺也。倘刺軟者，非實證也不惡寒，但惡熱

者，傳至中焦已無肺證。陽明者，兩陽合明也。溫

邪之熱，與陽明之熱相搏，故但惡熱也。或用白

虎或用承氣者，證同而脈異也。浮洪躁甚，邪氣

近表，脈浮者不可下。凡逐邪者，隨其所在就近

而逐之。脈浮則出表為順，故以白虎之金飈以

退煩熱。若沈小有力。病純在裏。則非下奪不可矣。故主以大承氣。按吳又可溫疫論中云。舌苔邊白。但見中微黃者。卽加大黃甚不可從。雖云傷寒重在誤下。溫病重在誤汗。卽誤下不似傷寒之逆之甚。究竟承氣非可輕嘗之品。故云舌苔老黃。甚則黑有芒刺。脈體沈實的係燥結痞滿。方可用之。

或問子言溫病以手經主治。力闢用足經藥之非。今亦云陽明證者何陽明特非足經乎。曰陽

明如市。胃爲十二經之海。土者萬物之所歸也。諸病未有不遇此者。前人云傷寒傳足不傳手。誤也。一人不能分爲兩截。總之傷寒由毛竅而谿谿肉之分理之小者。由谿而谷。谷肉之分理之大者。由谷而孫絡。孫絡絡之至細者。由孫絡而大絡。由大絡而經。此經卽太陽經也。始太陽終厥陰。傷寒以足經爲主。未始不關手經也。溫病由口鼻而入。鼻氣通於肺。口氣通於胃。肺病逆傳則爲心包。上焦病不治。則傳中焦。胃與脾

也中焦病不治。卽傳下焦。肝與腎也。始上焦。終下焦。溫病以手經爲主。未始不關足經也。但初受之時。斷不可以辛溫發其陽耳。蓋傷寒傷人身之陽。故喜辛溫甘溫。苦熱以救其陽。溫病傷人身之陰。故喜辛涼甘寒甘鹹以救其陰。彼此對勘。自可瞭然於心目中矣。

白虎湯 方見上焦篇

大承氣湯方

大黃 六錢

芒硝 三錢

厚朴 三錢

枳實 三錢

水八杯。先煮枳朴。後納大黃芒硝。煮取三杯。先服一杯。約二時許得利止。後服。不知再服一杯。再不

知再服。

方論此苦辛通降。鹹以入陰。法承氣者。承胃氣也。蓋胃之爲腑。體陽而用陰。若在無病時。本係自然下降。今爲邪氣蟠踞於中。阻其下降之氣。胃雖自欲下降。而不能。非藥力助之不可。故承氣湯通胃結。救胃陰。仍係承胃腑本來下降之

氣非有一毫私智穿鑿於其間也。故湯名承氣。學者若真能透徹此義。則施用承氣。自無弊竇。大黃蕩滌熱結。芒硝入陰軟堅。枳實開幽門之不通。厚朴瀉中宮之實滿。厚朴分量不似傷寒論中重用者。治溫與治寒不同。曰大承氣者。合四藥而觀之。可謂無畏其燥也。堅不破。無微不入。故曰大也。非真正實熱蔽痼。氣血俱結者。不可用也。若去入陰之芒硝。則云小矣。去枳朴之攻氣結。加甘草以和中。則云調胃矣。

②陽明溫病脈浮而促者。減味竹葉石膏湯主之。
脈促。謂數而時止。如趨者過急。忽一蹶然。其勢
甚急。故以辛涼透表重劑逐邪外出則愈。

減味竹葉石膏湯方

辛涼合甘寒法

竹葉

五錢

石膏

八錢

麥冬

六錢

甘草

三錢

水八杯。煮取三杯。一時服一杯。約三時令盡。

③陽明溫病諸證悉有而微脈不浮者。小承氣湯
微和之。



以陽明溫病發端者指首條所列陽明證而言也。後凡言陽明溫病者倣此。諸證悉有。以非不可。微則未至十分亢害。但以小承氣通和胃氣則愈。無庸芒硝之軟堅也。

④陽明溫病。汗多譫語。舌苔老黃而乾者宜小承氣湯。

汗多。津液散而大便結。苔見乾黃。譫語因結糞而然。故宜承氣。

⑤陽明溫病無汗小便不利。譫語者。先與牛黃丸。

不大便再與調胃承氣湯。

無汗而小便不利。則大便未定成鞭。譏語之。不
因燥屎可知。不因燥屎而譏語者。猶係心包絡
證也。故先與牛黃丸。以開內竅。服牛黃丸。內竅
開。大便當下。蓋牛黃丸亦有下大便之功能。其
仍然不下者。無汗則外不通。大小便俱閉則內
不通。邪之深結於陰可知。故取芒硝之鹹寒。大
黃甘草之甘苦寒。不取枳朴之辛燥也。傷寒之
譏語。舍燥屎無他證。一則寒邪不兼穢濁。二則

由太陽而陽明溫病讖語有因燥屎有因邪陷
心包一則溫多兼穢二則自上焦心肺而來學
者常須察識不可歧路亡羊也

⑥陽明溫病面目俱赤肢厥甚則通體皆厥不瘧
癰但神昏不大便七八日以外小便赤脈沈伏或
並脈亦厥胸腹滿堅甚則拒按喜涼飲者大承氣
湯主之

此一條須細辨其的是火極似水熱極而厥之
證方可用之全在目赤小便赤腹滿堅喜涼飲



定之。

大承氣湯

方法並見前

⑦陽明溫病。純利稀水無糞者。謂之熱結旁流。調胃承氣湯主之。

熱結旁流。非氣之不通。不用枳朴。獨取芒硝入陰以解熱結。反以甘草緩芒硝急趨之性。使之留中解結。不然結不下而水獨行。徒使藥性傷人也。吳又可用大承氣湯者非是。

⑧陽明溫病。實熱壅塞為噤者下之。連聲噤者中

此亦作者獨得處



焦聲斷續時微時甚者屬下焦

金匱謂噦而腹滿。視其前後。知何部不利。利之即愈。陽明實熱之噦。下之裏氣得通則止。但其兼證之輕重。難以預料。故但云下之而不定方。以俟臨證者自爲採取耳。再按中焦實證之噦。噦必連聲緊促者。胃氣大實。逼迫肺氣。不得下降。兩相攻擊而然。若或斷或續。乃下焦衝虛之噦。其噦之來也遠。故其聲斷續也。治屬下焦。

⑨陽明溫病。下利譌語。陽明脈實。或滑疾者。小承

溫邪惡燥
朴減原方分
數極見斟酌

氣湯主之。脈不實者。牛黃丸主之。紫雪丹亦主之。

下利。讖語。柯氏謂腸虛胃實。故取大黃之濡胃。

無庸芒硝之潤腸。本論有脈實。脈滑疾。脈不實。

之辨。恐心包絡之讖語。而誤以承氣下之也。仍

主芳香開竅法。

小承氣湯方
苦辛通法重劑

大黃 五錢
厚朴 三錢
枳實 一錢

水八杯。煮取三杯。先服一杯。得宿糞止。後服。不知

再服。

調胃承氣湯

熱淫於內治以鹹寒佐以甘苦法

大黃

三錢

芒硝

五錢

生甘草

二錢

牛黃丸

方論並見上焦篇

紫雪丹

方論並見上焦篇

⑩溫病三焦俱急大熱大渴舌燥脈不浮而躁甚。舌色金黃。痰涎壅甚。不可單行承氣者。承氣合小陷胸湯主之。

三焦俱急謂上焦未清。已入中焦陽明。大熱大渴。脈躁苔焦。陽土燥烈。煎熬腎水。不下則陰液



中國醫藥大學圖書館藏