

金匱懸解卷十五

內傷雜病

昌邑黃元御坤載著

肺痿肺癰咳嗽上逆

肺痿肺癰者咳嗽上氣之標咳嗽上氣者肺痿肺癰之本。肺痿之病內亡津液而傷火燥肺癰之病外感風邪而傷熱濕溯其源委卽咳嗽上氣之積漸而成者也而咳嗽上氣之由來則因於胃氣之逆也仲景諸方溫涼補泄立法非一而總以中氣爲主蓋未有土死而金生者卽未有土生而金死者見子而顧母仲景諸方未嘗有泄金而敗土



金匱懸解卷十五

內傷雜病

昌邑黃元御坤載著

肺痿肺癰咳嗽上逆

肺痿肺癰者咳嗽上氣之標咳嗽上氣者肺痿肺癰之本。肺痿之病內亡津液而傷火燥肺癰之病外感風邪而傷熱濕溯其源委卽咳嗽上氣之積漸而成者也而咳嗽上氣之由來則因於胃氣之逆也仲景諸方溫涼補泄立法非一而總以中氣爲主蓋未有土死而金生者卽未有土生而金死者見子而顧母仲景諸方未嘗有泄金而敗土



也。蓋咳嗽痰喘。悉緣中氣之敗。後世庸工。但知清金泄火。不知照顧中氣。其下復加以滋陰補水之藥。中氣淪亡。未有不死者。虛勞咳嗽。未必卽死。而最難逃者。庸工之毒。曠覽天枉。惕目驚心。天乎人乎。不可解也。

肺痿一

問曰。熱在上焦者。因咳爲肺痿。肺痿之病。從何得之。師曰。或從汗出。或從嘔吐。或從消渴。小便利數。或從便難。又被快藥下利。重亡津液。故得之。曰。寸口脈數。其人欬。口中反有濁唾涎沫者何。師曰。爲肺痿之病。若口中辟辟燥欬。卽胸中隱隱

痛脈爲滑數。此謂肺癰。咳唾膿血。脈數虛者爲肺痿。數實者爲肺癰。

熱在上焦者。因咳嗽而爲肺痿。肺痿病由於津亡而金燥也。溯其由來。或從汗出而津亡於表。或從嘔吐而津亡於裏。或從消渴便數而津亡於前。或從胃燥便難。津液原虧。又被快藥下利。重亡津液。而津亡於後。故得之也。寸脈虛數。欬而口中反有濁唾涎沫者。此爲肺痿。若口中辟辟然乾燥。欬卽隱隱胸中作痛。脈又滑數。此爲肺癰。脈數而虛者。爲肺痿。脈數而實者。爲肺癰。肺痿因於燥熱。故脈數而無

體肺癰。因於濕熱。故脈實而有膿也。蓋痿者。痿痺而不振也。人之所以精神爽健者。肺氣清也。肺熱而金燠。則氣耗而體倦。是以痿靡而廢弛也。素問痿論。肺主身之皮毛。肺熱葉焦。則皮毛虛弱。急薄者。則生痿痺也。肺者。藏之長也。心之蓋也。有所失亡。所求不得。則發肺鳴。鳴則肺熱。葉焦。故曰。五藏因肺熱。葉焦。發爲肺痿。此之謂也。五藏各有痿。而五藏之痿。則以肺爲根。緣肺主氣。而化生津液。所以浸灌五藏。五藏之氣。皆受於肺。氣耗而津枯。五藏失滋。是以痿也。五藏之痿。因於肺熱。而肺熱之由。則又原於陽明之

燥故治痿獨取陽明。陽明雖化氣於燥金而燥金實受於陽明以金生於土故也。

肺癰二

問曰病欬逆脈之何以知此爲肺癰。當有膿血吐之則死。其脈何類。師曰寸口脈微而數微則爲風數則爲熱微則汗出數則惡寒風中於衛呼氣不入熱過於營吸而不出風傷皮毛熱傷血脈風舍於肺其人則欬口乾喘滿咽燥不渴多唾濁沫時時振寒熱之所過血爲之凝滯畜結癰膿吐如米粥始萌可救膿成則死。

寸口脈微而數。微則爲風泄於表。數則爲熱鬱於裡。微爲風泄。則竅開而汗出。數爲熱鬱。則陰束而惡寒。風則傷衛。風愈泄而衛愈閉。呼氣不能入。熱則傷營。衛愈閉而營莫泄。吸氣不能出也。出氣爲呼。風泄於外。譬猶呼氣泄而不閉。是呼氣不入。入氣爲吸。氣閉於內。譬猶吸氣閉而不泄。是吸氣不出。風邪外傷其皮毛。熱邪內傷其血脈。風傷皮毛。故風舍於肺。皮毛閉塞。肺氣壅阻。則生咳嗽。口乾喘滿。咽燥不渴。多唾濁沫。時時振寒。熱傷血脈。故熱過於營。血脈凝滯。瘀蒸腐敗。化爲癰膿。癰膿畜結。吐如米粥。始萌可救。膿成則死。蓋肺癰之病。因胸膈濕盛。外感風邪。肺氣壅



遏鬱而爲熱。表則寒熱交作。裏則痰濁淫蒸。營血腐爛。化而爲膿。久而肺藏潰敗。是以死也。

肺痿三

肺痿吐涎沫而不欬者。其人不渴。必遺尿。小便數。所以然者。以上虛不能制下。故也。此爲肺中冷。必眩。多涎唾。甘草乾薑湯以溫之。若服湯已。渴者。屬消渴。

肺痿之病。金被火刑。必欬而渴。若但吐涎沫而不欬者。則其人不渴。必當遺尿。而小便數。所以然者。以上虛不能制下。氣不攝水。故也。此爲肺中寒冷。必頭眩暈。多唾涎。以其

肺胃寒滯陽不歸根。是以發眩氣不四達。是以多涎。甘草
乾薑湯。甘草補中而培土。乾薑溫肺而降逆也。

此肺痿之寒者。

甘草乾薑湯 百一

甘草 四兩 乾薑 二兩
炙 炮

右二味以水三升煮取一升五合去滓分溫再服。原方

缺載取傷寒補之

肺癰四

欬而胸滿振寒脈數咽乾不渴時出濁唾腥臭久久吐膿如



米粥者爲肺癰。桔梗湯主之。

欬而胸滿振寒者肺氣鬱阻陽爲陰閉也。脈數者肺氣不降。金被火刑也。咽乾不渴者咽燥而肺濕也。時出濁唾腥臭者肺金味辛而氣腥。涎痰濁鬱蒸而腐敗。久而癰膿上吐。形如米粥。此爲肺癰。桔梗湯。桔梗。行痰而破膿。甘草泄熱而保中也。

桔梗湯

桔梗 一兩
甘草 二兩

右二味以水三升煮取一升分溫再服則吐膿血也。

肺癰五

肺癰喘不得臥葶藶大棗泄肺湯主之。

肺癰喘不得臥肺鬱而氣逆也此緣土虛濕旺濁氣痞塞腐敗痰蒸肺無降路葶藶大棗泄肺湯大棗補脾精而保中氣葶藶破肺癰而排膿穢也。

葶藶大棗泄肺湯

葶藶

熬令黃色搗丸如梧子大

大棗

十二枚

右先以水三升煮取二升去棗內葶藶煮取一升頓服。

咳嗽上氣六

上氣喘而躁者屬肺脹欲作風水發汗則愈。

咳嗽上氣喘而躁者此爲肺脹而氣阻也氣爲水母此欲作風水以風中皮毛遏閉肺氣不能調水道而輸膀胱也素問五藏生成篇咳嗽上氣厥在胸中逆在手陽明太陰手陽明升則化氣手太陰降則化水咳嗽上氣辛金不降無以行水欲作風水之兆也發汗以泄其皮毛而消肺脹則愈矣。

咳嗽上氣七

上氣面浮腫肩息其脈浮大不治又加利尤甚。

全圖景角 卷十五 六
咳嗽氣壅。是以頭面浮腫。喘息肩搖。是謂肩息。其脈浮大者。陽根下絕。此爲不治。又加下利。中氣敗泄。尤爲甚也。

咳嗽上氣八

咳而上氣。此爲肺脹。其人喘。目如脫狀。脈浮大者。越婢加半夏湯主之。

咳而上氣。此爲肺氣脹滿。其人喘阻。肺氣上衝。目如脫狀。脈浮大者。是表邪外束而裏氣上逆也。越婢加半夏湯。薑甘大棗。培土而和中。石膏麻黃。清金而發表。半夏降逆而下衝也。



越婢加半夏湯

麻黃

兩六

石膏

斤半

甘草

兩二

大棗

枚十二

生薑

兩五

半夏

斤半

右六味以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三升

分溫三服

咳嗽上氣九

肺脹咳而上氣煩躁而喘脈浮者心下有水小青龍加石膏

湯主之

肺脹咳而上氣煩躁而喘脈浮者此心下有水阻隔金火

降路氣阻而發喘咳肺熱而生煩躁也小青龍加石膏湯



甘草麻黃桂枝補中氣而泄營衛芍藥半夏清膽火而降胃逆姜辛五味下衝氣而止喘咳石膏涼肺蒸而除煩躁也積水化汗而外泄諸證自愈矣

小青龍加石膏湯

麻黃

二兩

桂枝

三兩

甘草

三兩

芍藥

三兩

半夏

半升

細辛

三兩

乾薑

三兩

五味子

半斤

石膏

二兩

右九味以水一斗先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三升強人服一升羸者減之日三服小兒服四合

咳嗽上氣十

欬而脈浮者。厚樸麻黃湯主之。脈沈者。澤漆湯主之。

欬而脈浮者。其病在上。是表邪外束。裏邪上逆。肺金鬱格而不降也。厚樸麻黃湯。麻黃發表而散寒。石膏小麥清金而潤燥。樸杏半夏姜辛五味。破壅而降逆。欬而脈沈者。其病在下。是水邪上泛。相火壅阻。肺金傷尅而不歸也。澤漆湯。人參甘草補中而培土。生薑半夏降逆而驅濁。紫參白前。清金而破壅。桂枝黃芩。疏木而泄火。澤漆決痰而泄水也。

脈法云。浮爲在表。表有寒邪。故用麻黃。

厚樸麻黃湯

厚樸 五兩

杏仁 半升

半夏 半升

乾薑 二兩

細辛 二兩

五味子 半升

小麥 一升

麻黃 四兩

石膏 雞子大一塊

右九味以水一斗二升先煮小麥熟去滓內諸藥煮取

二升溫服一升日三服。

澤漆湯

澤漆

三升以東流水五斗煮取一斗五升

人參 三兩

甘草 三兩

生薑 五兩

半夏

半升 白前 五兩

紫參 五兩

桂枝 三兩

黃芩 三兩

右九味咬咀內澤漆汁中煮取五斗溫服五合至夜盡

咳嗽上氣十一

