

素問病機宜保命集卷下

欬嗽論第二十一

河間處士 劉完素守真述 明 新安 吳勉學師古校

論曰。欬謂無痰而有聲。肺氣傷而不清也。嗽是無聲而有痰。脾濕動而為痰也。欬嗽謂有痰而有聲。蓋因傷於肺氣動於脾濕。欬而為嗽也。脾濕者。秋傷於濕。積於脾也。故內經曰。秋傷於濕。冬必欬嗽。大抵素秋之氣。宜清。須反動之。氣必上衝而為欬。甚則動於脾濕。發而為痰焉。是知脾無留濕。雖傷肺氣而不為痰也。有痰寒少而嗽多。故欬嗽者。非專主於肺而為病。以肺主皮毛而司於外。故風寒先能傷之也。內經曰。五臟六腑皆能令人欬。非獨肺也。各以其時主之。而受病焉。非其時。各傳而與之也。所病不等。寒暑燥濕風火六氣。皆令人欬嗽。唯濕病痰飲入胃。留之而不行。上入於肺。則為欬嗽。假令濕在於心經。謂之熱痰。濕在肺經。謂之風痰。濕在脾經。謂之氣痰。濕在腎經。謂之寒痰。所治不同。宜隨證而治之。若欬而無痰者。以辛甘潤其肺。故欬嗽者。治痰為先。治痰者。下氣為上。是以南星半夏勝其痰。而欬嗽自愈。枳殼陳皮利其氣。而痰自下。痰而能食者。大承氣湯微下之。少利為度。痰而不能食者。厚朴湯治之。夏月嗽而發熱者。謂之熱痰。嗽小柴胡四兩加石膏一兩。知母半兩用之。冬月嗽而發寒熱。謂之寒嗽。小青龍加杏仁服之。然此為大例。更當隨証隨時加減之。量其虛實。此治法之大體也。

蜜煎生薑湯

蜜煎橘皮湯

燒生薑糊粥

此者。皆治無痰而嗽者。當以辛甘潤其肺故也。如但用青陳皮藥。皆當去白。本草云。陳皮味辛。理上氣。去痰氣滯塞。青皮味苦。理下氣。二味俱用。散三焦之氣也。故聖濟云。陳皮去痰。穰不除。即生痰。麻黃發汗。節不去而止汗。治風痰熱咳。嗽其脉弦面青。四肢滿悶。便溺秘澀。心多燥怒。水煮金花丸。

南星

半夏各一兩
生用

天麻五錢

雄黃三錢

白麵三兩

寒水石一兩
存性

右為細末。滴水為丸。每服五七十丸。至百丸。煎漿水沸下藥。煮令沸浮為度。漉出。淡漿水浸。另用生薑湯下。或通

聖加半夏。及局方中川芎丸。防風丸。皆可用也。

小黃丸。治熱痰欬嗽。脉洪面赤。煩熱。心痛。唇口乾燥。多喜笑。宜小黃丸。

素問病機宜保命集卷下

欬嗽論第二十一

河間處士 劉完素守真述 明 新安 吳勉學師古校

論曰。欬謂無痰而有聲。肺氣傷而不清也。嗽是無聲而有痰。脾濕動而為痰也。欬嗽謂有痰而有聲。蓋因傷於肺氣動於脾濕。欬而為嗽也。脾濕者。秋傷於濕。積於脾也。故內經曰。秋傷於濕。冬必欬嗽。大抵素秋之氣。宜清。須反動之。氣必上衝而為欬。甚則動於脾濕。發而為痰焉。是知脾無留濕。雖傷肺氣而不為痰也。有痰寒少而欬多。故欬嗽者。非專主於肺而為病。以肺主皮毛。而司於外。故風寒先能傷之也。內經曰。五臟六腑皆能令人欬。非獨肺也。各以其時主之。而受病焉。非其時。各傳而與之也。所病不等。寒暑燥濕風火六氣。皆令人欬嗽。唯濕病痰飲入胃。留之而不行。上入於肺。則為欬嗽。假令濕在於心經。謂之熱痰。濕在肺經。謂之風痰。濕在肺經。謂之氣痰。濕在腎經。謂之寒痰。所治不同。宜隨證而治之。若欬而無痰者。以辛甘潤其肺。故欬嗽者。治痰為先。治痰者。下氣為上。是以南星半夏。勝其痰而欬嗽自愈。枳殼陳皮。利其氣而痰自下。痰而能食者。大承氣湯。微下之。少利為度。痰而不能食者。厚朴湯。治之。夏月嗽而發熱者。謂之熱痰。嗽小柴胡四兩。加石膏一兩。知母半兩。用之。冬月嗽而發寒熱。謂之寒嗽。小青龍加杏仁服之。然此為大例。更當隨証隨時加減之。量其虛實。此治法之大體也。

蜜煎生薑湯

蜜煎橘皮湯

燒生薑糊枕

此者。皆治無痰而嗽者。當以辛甘潤其肺。故也。如但用青陳皮藥。皆當去白。本草云。陳皮味辛。理上氣。去痰氣。滯塞。青皮味苦。理下氣。二味俱用。散三焦之氣也。故聖濟云。陳皮去痰。穰不除。即生痰。麻黃發汗。節不去而止汗。治風痰熱咳。嗽其脉弦面青。四肢滿悶。便溺秘澀。心多燥怒。水煮金花丸。

南星

半夏各一兩
生用

天麻五錢

雄黃三錢

白麵三兩

寒水石一兩
燒

右為細末。滴水為丸。每服五七十丸。至百丸。煎漿水。沸下藥。煮令沸。浮為度。漉出。淡漿水浸。另用生薑湯下。或通聖加半夏。及局方中川芎丸。防風丸。皆可用也。

小黃丸。治熱痰。欬嗽。脉洪面赤。煩熱。心痛。唇口乾燥。多喜笑。宜小黃丸。

南星洗湯

半夏洗各一兩

黃芩半兩

右為細末生薑汁浸蒸餅為桐子大每服五十九至七十九食後薑湯下及小柴胡湯中加半夏亦可
白朮丸治痰濕欬嗽脉緩面黃肢體沉重嗜卧不收腹脹而食不消宜白朮丸

南星

半夏俱湯洗各一兩

白朮半兩

右為細末糊為丸桐子大每服五十九生薑湯下及局方中防已丸亦可用

玉粉丸治氣痰欬嗽脉溢面白上喘氣促洒淅惡寒愁不樂宜服之

南星

半夏俱湯洗各一兩

官桂去皮一兩

右為細末薄糊為丸如桐子大每服五十九生薑湯下食後及局方中防已丸亦可玉粉丸加減在後
者加枳實伍錢身熱甚者加黃連五錢體重者加茯苓一兩氣上逆者加苦亭藤五錢喘促者加人參桔梗各五錢浮腫者加郁李仁杏仁各五錢大便秘者加黃連五錢

雙玉散治痰熱而喘痰湧如泉

寒水石

石膏各等分

右為細末煎人參湯調下三錢食後服

治痰干緒湯

半夏

生味二兩

大皂角

去皮半兩剉

右同於絹袋中盛之用水三升生薑七大片同煎至一半以手操洗之取清汁分作二服食後併服二服効
防風丸治痰嗽胸中氣不清利者枳朮丸亦妙

防風

半兩

枳殼

半兩去穢炒

白朮

一兩

右細末燒餅為丸每服五十九生薑湯下

天麻丸

天麻

一兩

半夏

南星

各一兩

雄黃少



右以白麵二兩滴水為丸如桐子大每服五十丸至百丸煎淡水令沸下藥煮十餘沸澆出食前生薑湯服
利隔丸主胸中不利痰嗽喘促利脾胃壅滯調秘瀉藏推陳致新消進飲食治利隔氣之勝藥也

木香一錢半

檳榔一錢半

人參三錢

當歸二錢

藿香一錢半

大黃酒浸焙一兩

厚朴薑制三兩

枳實一兩

甘草三錢

右為細末滴水和丸如桐子大每服三五十丸食後諸飲皆下

欬氣丸治久嗽痰喘肺氣浮腫

青皮白去

陳皮白去

檳榔

大香

杏仁去皮

郁李仁去皮

茯苓

澤瀉

當歸

茂炮

馬兜鈴

苦葶應三兩

各

人參

防己各五錢

桑牛一兩

右為細末生薑汁麵糊為丸如梧子大每服一二十丸加至五七十丸生薑湯下食後服

玉粉丸治痰結咽喉不利語音不出

半夏洗五錢

草烏一字

桂一字

右同為末生薑汁浸蒸餅為丸如雞頭大每服一丸至夜含化多歲不愈者亦効

枳殼湯治久痰胸膈不利者多上焦發熱

枳殼炮炒去穢三兩

桔梗三兩

黃芩一兩半

右同剉每日早用二兩半水三盞煎至二盞勻作三服早時一服中時一服臨卧時一服三日七兩半藥盡服生

半夏湯

半夏

不以多少洗七遍切作片子

右每服秤三錢水一盞半入生薑五大片同煎至一盞和滓食後服一日三二服服三日畢再服枳木丸盡其痰

為度論曰先消胸中氣後去膈上痰再服枳木丸謂首尾合盡消其氣謂令痰不復作也

清鎮丸治熱嗽

小柴胡湯內加人參一倍青黛半兩

右為細末麵糊丸如桐子大每服五十丸生薑湯下

半夏丸治因傷風而痰作喘逆凡凡欲吐惡心欲倒已吐加檳榔三錢

半夏洗切

雄黃研三錢

右同為末生薑汁浸蒸餅為丸桐子大每服三十丸生薑湯下

白朮散治夏暑大熱或醉飲冷痰濕不止膈不利

白朮

茯苓

半夏洗

黃芩各等分

右為釐末每服五錢至七錢水二盞入生薑十片煎至一盞去滓調陳皮末一錢神麴末一錢食後服

法曰大熱大飲蓋酒味熱而引飲冷冷與熱凝於胸中不散而成濕故痰作矣甚者宜吐之吐後服五苓散甘露勝濕

去痰之劑

白朮湯治痰潮上如湧泉久不可治者

白朮

白茯苓

半夏分等

右為末每服半兩病大者一兩水二盞生薑七片煎至一盞取清調神麴末二錢頓服之病甚者下玉壺丸一百

丸大効永除根

天門冬丸治婦人喘手足煩熱骨蒸寢汗口乾引飲面目浮腫

天門冬汁兩去

麥門冬去心

生地黃三片取汁

右二味為末膏子和丸如梧子大每服五十丸煎道遙散送道遙散中去甘草加人參或服王氏博濟方中人參

荊芥散亦可如面腫不已經曰面腫曰風故宜汗麻黃桂枝可發其汗後服柴胡飲子去大黃故論曰治藏者治

其俞治府者治其舍浮腫者治其經治俞者治其土也治舍者亦治其土也如兵家圍魏救趙之法也

虛損論第二十二

論曰虛損之疾寒熱因虛而感也感寒則損陽陽虛則陰盛自上而下治之宜以辛甘淡過於胃則不可治也感熱

則損陰陰虛則陽盛故損自下而上治之宜以苦酸鹹過於脾則不可治也自上而損者一損於肺皮聚而毛落二

損損於心血脈虛少不能榮養藏府婦人月水不通三損損於胃飲食不為肌肉自下而損者一損於腎骨癯不能

起于床。二損損于肝。筋緩不能自收持。三損損于脾。飲食不能消。尅論曰。心肺損而色蔽。腎肝損而形痿。穀不能化。而脾損感此病者。皆損之病也。漸漬之深。皆虛勞之疾也。故四君子湯治肺損而皮聚毛落。益氣可也。

白朮

人參

黃耆

茯苓

右為。饈末。每服五六錢。水一盞。煎至七分。去滓。食後溫服。

八物湯。治心肺虛損。皮聚而毛落。血脈虛損。婦人月水愆期。宜益氣和血。

白朮

人參

黃耆

茯苓

川芎

熟地黃

當歸

芍藥

甘草

右。饈末。服五七錢。水一盞。煎至七分。去滓。食後溫服。

十全散。治心肺損及胃。飲食不為。肥膚。宜益氣和血。調飲食。

白朮

人參

黃耆

伏神

桂枝

熟地黃

當歸

芍藥

川芎

甘草

右為。末。加生薑棗同煎。水一大盞。藥五錢。煎至七分。食前日三服。

金剛丸。治腎損骨痿不能起于床。宜益精。

草薢

杜仲

茯苓

兔絲子

等分

右為。細末。酒煮猪腰子為丸。每服五七十九。空心酒下。

牛膝丸。治腎肝損。骨痿不能起于床。筋緩不能收持。宜益精緩中。

牛膝

草薢

杜仲

茯苓

防風

兔絲子

酒

白茯苓

桂枝

右。細末。酒煮猪腰子。搗丸。桐子大。空心酒下五七十九。

煨腎丸。治腎肝損及脾。損穀不化。宜益精緩中消穀。

牛膝

草薢

杜仲

茯苓

兔絲子

防風

白茯苓

胡蘆巴

破故紙

桂

右和劑服。餌如金剛丸法。腰痛不起者甚効。

黑地黃丸。加五味子。名腎氣丸。治陽盛陰虛。脾腎不足。房室虛損。形瘦無力。面多青黃。而無常色。宜此藥養血益腎。



蒼朮一片末

熟地黄片一

川薑冬一兩夏五錢春七錢

五味子片半

右為細末。棗肉為丸。如梧子大。每服一百丸至二百丸。食前米飲下。或酒。治血虛又痔甚効。經曰腎苦燥。食辛以潤之。開腠理。致津液。通氣五味子味酸。故酸以收之。此雖陽盛不燥熱。乃是五藏虛損於內。故可辛以收氣也。此藥類象神品藥也。

治陽虛陰盛。心肺不足。宜八味丸。若形體瘦弱無力多困。未知陰陽先損。夏月地黃丸。春秋宜腎氣丸。冬月宜八味丸。

消渴論第二十三

論曰。消渴之疾。三焦受病也。有上消中消腎消。上消者上焦受病。又謂之鬲消病也。多飲水而少食。大便如常。或小便清利。知其燥在上焦也。治宜流濕潤燥。中消者胃也。渴而飲食多。小便黃。經曰熱能消穀。知熱在中。法云宜下之。至不欲飲食則愈。腎消者病在下焦。初發為膏淋。下如膏油之狀。至病成而面色顰黑。形瘦而耳焦。小便濁而膏脂。治法宜養血以肅清。分其清濁而自愈也。法曰燥上而渴。辛甘而祛。用潤肺故可用蜜煎生薑湯。大器頤之時。時呷之。法云心肺之病。莫厭頻而少飲。內經云補上治宜以緩。又曰辛以潤之。開腠致津液通。則肺氣下流。故氣下火降而燥衰矣。其渴乃止。又經曰二陽結為消。王注曰二陽結於胃。及大腸俱熱也。腸胃藏熱則善消水穀。甘辛降火之劑。黃連末一片。生地黃白然汁。白蓮花藕自然汁。牛乳汁各一斤。熬成膏子。黃連末為丸如梧子。每服三十丸。少呷溫水送下。日進十服。渴病立止。

石膏 黃芩 桔梗之類是也。 人參石膏湯。治鬲消上焦煩渴不欲多食。 芍藥 黃耆

人參兩半 石膏一錢 知母七錢 甘草四錢

右為麤末。每服五錢至七錢。水煎。食後溫服。

順氣散。治消中熱在胃而能食。小便赤黃。微利之為効。不可多利。服此藥漸漸利之。不欲多食則愈。

厚朴薑制 大黃兩四 枳實炒

右判每服二錢水煎食遠服

茴香散治腎消病下焦初證小便如膏油

茴香

炒 苦練炒

右細末酒調二錢食前服

八味丸治腎消大病加減法

本方內倍加山藥外桂附從四時加減假令方內桂附一兩春各用三錢夏用一錢秋用五錢冬全用一兩

珍珠粉丸治白淫夢泄遺精及滑出而不收

黃柏一斤

於新瓦上燒令通赤為度

真蛤粉一斤

右為細末滴水丸如桐子大每服一百丸空心酒下法曰盛陽乘陽故精泄也黃柏降火蛤粉鹹而補腎陰也入

治思想無窮所願不得之證

竹籠散治消渴

五靈脂

黑豆 去皮

右等為細末每服三錢冬瓜湯調下無冬瓜苗葉皆可日二服小渴二三服効渴定不可服熱藥唯服八味丸去

附子加五味子

腫脹論第二十四

小兒

靈樞經論云帝問岐伯脹形何如岐伯曰夫心脹者煩心氣短卧不安肺脹者虛滿而喘欬肝脹者脇下滿而痛引少腹脾脹者善噦四肢煩惋體重不能勝衣卧不安腎脹者引背央央然腰髀痛六府脹胃脹者腹滿胃脘痛鼻聞焦臭妨于食大便難大腸脹者腸鳴痛而濯濯冬日重子寒則飧泄食不化小腸脹者小腹腹滿引腰而痛膀胱脹者少腹氣滿而氣癰三焦脹者氣滿于皮膚中硃硃然而不堅臍脹者脇下痛脹口苦善太息又水脹篇云帝問岐伯水脹何如答曰水始起也目窠上微腫如新卧起之狀其頸脉動欬陰股間寒足脛脹腹乃大其水已成矣以手按其腹隨手而起如裏水之狀此其候也帝曰膚脹何如岐伯曰膚者寒氣客于皮中鼓空空然不堅腹身大盡腫

皮厚。按其腹窅而不起。腹色不變。此其候也。鼓脹何如。答曰。鼓脹身皆大。大與膚脹等也。色蒼黃。腹筋起。此其候也。腸軍何如。答曰。寒氣客于腸外。與衛相搏。氣不得榮。因有所繫。癖而內着。惡氣乃起。瘕肉生。其始大也。大如雞子。稍以益大。至其成。如懷子狀。久者離歲。按之則堅。推之則移。月事不以時下。此其候也。石瘕何如。答曰。石瘕生于胞中。寒氣客于子門。閉塞氣不通。惡血當瀉不瀉。因以留止。日以益大。壯如懷子。月事不時。皆生于女子。可導而下。帶下。膚脹鼓脹。可刺耶。曰。先瀉其脹之血絡。復調其經。刺去其血絡也。

經云。平治權衡。去菀陳劉。開鬼門。潔淨府。平治權衡者。察脈之浮沉也。去菀陳劉者。疎滌腸胃也。開鬼門。潔淨府者。發汗利小便也。又鼓脹之病。治以雞屎醴。名醫云。其腫有短氣。不得卧。為心水。兩脇痛。為肝水。大便鴨瀉。為脾水。四肢皆腫。為脾水。腰痛足冷。為腎水。口苦咽乾。為胆水。乍虛乍實。為大腸水。各隨其經絡。分其內外。審其脈證。而別之。大有風水。皮水。石水。黃汗。歸各藏以論之。風合歸肝。皮合歸肺。黃汗歸脾。石合歸腎。風水。脈浮。必惡風。皮水。脈亦浮。按下沒指。石水。脈沉。腹滿不喘。黃汗。脈沉遲。發熱而多涎。久而不愈。必致癰膿。水腫。脈浮。帶數。即是虛寒。潛止其間。久必沉伏。沉伏則陽虛陰實。為水必矣。要知水脈必沉是也。論者。脈出者死。與病不相應也。諸唇黑。則傷肝。缺盆盈。平則傷心。臍出則傷脾。足平則傷腎。背平則傷肺。此五者。必不可療也。治法云。腰以上宜發汗。腰以下利小便。錢氏論虛實。腹脹實。則不因吐瀉。又病之後。亦不因下利。脹而喘急。悶亂。更有痰有熱。及有宿食不化。而脹者。宜服大黃丸。白餅子。紫霜丸下之。更詳認大小便。如俱不通。先利小便。後利大便。虛則久病吐瀉。後其脈微細。肺主目胞。腮虛腫。手足冷。當先服竭氣丸。後服異功散。及和中丸。並黃散溫其氣。因于氣腫者。橘皮煎丸。因于濕為腫。煎防已黃耆湯。調五苓散。因于熱為腫者。服八正散。

五脉論五水灸法

又一法。燥熱于肺。為腫者。乃純水之源也。當清肺除燥。水自生矣。于鼓梳湯中加黃芩。如熱在下焦。陰消。使氣不得化者。當益陰。則陽氣自化也。黃蘗黃連是也。

青水灸肝井。赤水灸心榮。黃水灸脾俞。白水灸肺經。黑水灸腎入。
婦人蠱脹。無脉。燒青丸。五皮散亦是。

論諸蠱脹者有二。脹若徒胃則旦食而不能夜食。旦則不脹夜則脹是也。若水腫証瀉泄者是也。內經曰蠱脹之病治以雞屎醴酒調服。水脹之病當開鬼門。潔淨府也。

白茯苓湯。各變水。

白茯苓

澤瀉各二兩

郁李仁錢

右咬咀作一服。水一椀煎至一半。常服無時。從少至多服。或煎得澄入生薑自然汁在內。和麵或飯粥作常食。五七日後覺脹下再中。以白朮散。

白朮

澤瀉各半兩

右為細末。每服三錢。煎茯苓湯調下。或丸亦可。服三十丸。

末治之藥。服黃耆芍藥建中之類。以調養之。平復後忌房室。猪魚。鹽麵等物。

治水氣蠱脹。潔淨府。楮實子丸。

楮實子

一斗水二斗

白丁香半兩

茯苓三兩

右三味為細末。用楮實膏為丸。如桐子大。不計丸數。從少至多。服至小便清利。及腹脹減為度。後服中治藥末治藥。調養藥。疎啓其中。忌甘苦酸補。其下五補七宣。

取穴法

治腫治其經。治金火也。井榮俞經陰經金也。金木水火陽經火也。

治腫米香散

木香

大戟

白牽牛各等分

右為細末。每用三錢。楮腰子一對批開。摻藥在內。燒熟。空心服之。如左則塌左。右則塌右。如水腫不能全去。於腹上塗甘遂末在臍滿腹。少飲甘草水。其腫便去也。

治水腫

蜈蚣去頭尾與葡萄心同研。露七日。曝乾為細末。淡酒調下。暑月濕用尤佳。



又方

棗一斗。鍋內入水。上有四指。用大戟并根苗。益之。遍盆合之。煮熟為度。去大戟不用。旋旋喫。無時。盡棗決愈。神効。

眼目論第二十五

論曰。眼之為病。在府則為表。當除風散熱。在藏則為裏。宜養血安神。暴發者為表而易治。久病者在裏而難愈。陰風散熱者。濕青丸主之。養血安神者。定志丸。婦人熟乾地黄丸是也。或有體肥氣盛。風熱上行。目昏澁者。槐子散主之。此由胸中氣濁上行也。重則為痰厥。亦能損目。常使胸中氣清。無此病也。又有因目疾服藥多而損氣者。久之眼漸昏弱。乍明乍暗。不欲視物。此目少血之驗也。熟乾地黄丸消風散。定志丸相須而養之。或有視物不明。見黑花者。此謂之腎氣弱也。宜補腎水。駐景丸是也。或有暴失明者。謂眼居諸陽交之會也。而陰及開之。此風邪內滿。當有不測之疾也。翳膜者。風熱重而有之。或癰入眼。此肝氣盛而發在表也。翳膜已生在表明矣。當發散而去之。反疎利則邪氣內擋。為翳則深也。邪氣未定。謂之熱翳而浮。邪氣已定。謂之冰翳而沉。邪氣牢而深者。謂之陷翳。當以煖發之物。使其邪氣再動。翳膜乃浮。輔之退翳之藥。則能自去也。病久者不能速効。當以歲月除之。

治眼亦暴發腫散熱飲子。

防風

羌活

黃芩

黃連各一兩

右剉每服半兩。水二盞。煎至一盞。食後溫服。如大便秘澁。加大黃一兩。如痛甚者。加當歸。地黃。如煩燥不能眠睡。

加梔子一兩。

川芎散治風熱上衝。頭目眩熱。腫及胸中不利。

川芎

槐子各兩

右細末三錢。如胸中氣滯不利。生薑湯調。目疾茶調。風熱上攻。吹咀一兩水煎。食後服。

治眼久病昏澁。因發而久不愈。地黃湯。

防風

羌活

黃芩

黃連

地黃

當歸

人參

茯神各等

右為觔末。每服五錢。水一盞半。煎至一盞。去滓溫服。食後。

槐子散

槐子

黃芩

木賊

蒼朮各等分

右細末茶清調下食後

治眼生翳膜反瞳入眼焮赤已過者瀉青丸主之當半減大黃如大便秘焮氣未定依方服之

治水翳久不去者羚羊角散主之

羚羊角

升麻

細辛各等分

甘草半之

右為細末一半為散一半蜜為丸如桐子大每服五七十丸以羚羊角散下之食後卧米泔水煎服

治太陽經衛虛血實腫人臉重頭中濕淫膚脉睛痛肝風盛眼黑腎虛桔梗丸

桔梗斤

牽牛頭末三兩

右二味為末煉蜜為丸如桐子大每服四五十丸加至百丸食前溫水下日二服

金絲膏 點眼藥

生薑取汁四兩

白沙蜜一斤煉

棕猪胆汁三錢

黃連四兩槌用水一斗浸煎取五升

右先煎黃連水後入薑汁次入蜜同煎去沫淨次入下項藥末

腦子四錢

麝香三錢

硃砂四錢

鵬砂三錢

輕粉五錢

熊胆四錢

青鹽三錢

右極細攪勻熬令稀膏點用

治眼暴赤發癰痛不可忍者救苦丸

黃連兩

當歸二錢

甘草一錢

右同剉細新水半碗浸一宿以慢火熬約至一半以綿濾去滓以淨為妙用火再熬作稠膏子為度攤在枕上倒

合以物蓋之用熟艾一大彈子許底下燃之用艾煙膏子艾盡為度再入下項藥

朱砂飛一錢

腦子半錢

乳香

沒藥等分

右同研極細入黃連膏內搜和丸如米大每用二丸點眼大角內仰面卧藥化則起



治眼發赤腫毒氣侵睛脹痛宣毒散

盆硝

雄黃

乳香

沒藥各等分

右為極細末以少許鼻內嚙之

治眼風毒發腫鼻中欲嚏嚏多大損而生瘡宣風散

川芎

甘菊各二錢

乳香

沒藥各一錢

右和勻再研極細少許鼻內嚙之

能遠視不能近視局方中定志丸目能近視不能遠視

萬壽地芝丸

生薑

四兩

天門冬四兩

枳殼三兩

甘菊二兩

右為細末煉蜜丸如桐子大茶清或溫酒下一百丸食後此藥能愈大風熱

洗眼藥

呵子二兩

黃丹四兩

蜜八兩

柳枝四十寸

右以河水二碗熬至半碗用一錢熱水化洗之石器內熬

治眼赤腫以青塗蛆不以多少淘淨曬乾末之令害眼人仰卧合目用藥一錢散在眼上須臾藥行待少時去藥赤

瞎亦無

治倒睫 無名異末之揆捲在紙中作撥子點着到藥處吹殺以烟熏睫目自起

瘡瘍論第二十六

論曰瘡瘍者火之屬須分內外以治其本內經云膏粱之變足生大丁其原在裏發于表也受持如虛言內結而發諸外未知從何道而出皆是從虛而出也假令太陽經虛從背而出少陽經虛從鬢而出陽明經虛從髕而出腎經虛從脛而出又經曰地之濕氣感則害人皮膚筋脉其在外感則內行若其脉沉實當先疎其內以絕其原也其脉浮大當先托裏恐氣傷於內有內外之中者邪氣至其過絕經絡故發癰腫經曰榮氣不從道于肉理乃生癰疽



此因失托裏及失疎通又失榮和衛也治瘡之大要須明托裏疎通行榮衛三法托裏者治其外之內疎通者治其內之外行榮衛者治其中也內之外者其脉沉實發熱煩燥內無厥赤痛其邪氣深于內也故先疎通以絕其原外之內者其脉浮數焮腫在外形證外顯恐邪氣極而內行故先托裏內外之中者外無焮惡之氣內亦藏府宣通知其任經當和榮衛也用此三法之後雖未差必無變証亦可使邪氣頓減而易痊愈故經曰諸痛癢瘡瘍皆屬心火又曰知其要者一言而終不知其要流散無窮

鍼灸法曰凡瘡瘍可灸刺者須分經絡部分血氣多少俞穴遠近若從背而出當從太陽五穴隨證選用或刺或灸泄其邪氣凡太陽多血少氣

至陰 通谷 束骨 崑崙 委中

從鬢而出者當從少陽五穴選用 少陽少血多氣

竅陰 夾谿 臨泣 陽輔 陽凌泉

從髭而出者當從陽明五穴選用 陽明多血少氣

蠡足 內庭 陷谷 衝陽 解谿

從腦而出者初覺腦痛不可忍且欲生瘡也腦者髓之海當灸刺絕骨以泄邪氣髓者舍也故脉浮者從太陽經依前選用脉長者從陽明經依前選用脉絃者從少陽經依前選用論曰諸經各有井榮俞經合井主心下滿及瘡色青榮主身熱及瘡赤色俞主體重節痛瘡黃色經主欬嗽寒熱瘡白色合主氣逆而泄瘡黑色隨經病而有此證者或宜灸宜鍼以泄邪氣經曰邪氣內搖則腫熱宜砭射之也內經曰夫瘡瘍已覺微腫腫硬皮血不變色脉沉不痛者當外石而泄之王注曰石砭也可以破大癰出膿今以排鍼代之凡瘡瘍已覺微腫腫硬皮血不變色脉沉不痛者當外灸之引邪氣出而方止如以有膿水者不可灸當刺之淺者亦不灸經曰陷者灸之如外微覺木硬而不痛者當急灸之是邪氣深陷也淺者不可灸慎之

諸病瘡瘍如嘔者是濕氣浸于胃也藥中宜倍加白朮服之

內疎黃連湯治嘔噦心逆發熱而煩脉沉而實腫硬木悶而皮內不變色根深大病在內藏府秘澁當急疎利之

黃連

芍藥

當歸

檳榔

木香

黃芩

山梔子

薄荷

桔梗

甘草已上各一兩連翹二兩

右除檳榔木香二味為細末外並剉每服一兩水一盞半煎至一盞先吃一二服次每服加大黃一錢再服加錢以利為度如有熱証止服黃連湯大便秘澀加大黃覺無熱証少煎沒藥內托復煎散時時服之如實無熱及大小便通止服復煎散稍有熱証却服黃連湯秘則加大黃如此內外皆通榮衛和調則經絡自不道絕矣治腫脹於外根繫不深形証在表其脉多浮痛在皮肉邪氣盛則必侵於內急須內托以救其裏也服內托復煎散

地骨皮

黃耆

芍藥

黃芩

白朮

茯苓

人參

柳桂味淡

甘草

防己

當歸已上各一兩防風二兩

右以咀先煎蒼朮一斤用水五升煎至三升去木滓入前藥十二味再煎至三四盞絞取清汁作三四服終日服之又煎蒼朮滓為湯去滓再依前煎服十二味滓此除濕散鬱熱使胃氣和平如或未已再作半料服之若大便秘及煩熱少服黃連湯如微利及煩熱已過却服復煎散半料如此使榮衛俱行邪氣不能內侵也治諸瘡瘍藏府已行如痛不可忍者可服當歸黃耆湯并加減在後

當歸

黃耆

地黃

地骨皮

川芎

芍藥等分

右以咀每服一兩水一椀煎至五分去滓溫服如發熱者加黃芩煩熱不能卧者加梔子如嘔是濕氣侵胃也倍加白朮

膏藥方

好芝藤油半斤

當歸半斤

杏仁四十九個去皮

桃柳枝各四十九條長四指

右用桃柳二大枝新綿一葉包藥繫于一枝上內油中外一枝攪於鐵器內煎成人黃丹三兩一處熬水中滴成不散如珠子為度

治金絲瘡一云紅絲瘤其狀如線或如繩巨細不等經所謂丹毒是也但此燥毒不甚廣闊人患此疾頭手有之行至心則死下有之上往亦然法當於瘡頭截經而刺之以出血後嚼萍草根塗之立愈

治從高墜下。涎潮昏冒。此驚恐得也。苦杖散。

苦杖紅少

右細末。熱酒調下。如塵後瘀血不散。或聚血皆治之。

治丁瘡奪命散

烏頭尖

附子底

蝎稍

雄黃錢一

蜈蚣對

礪砂

粉霜

輕粉

麝香

乳香各半

信半錢

腦子少許

右為細末。先破瘡出惡血畢。以草杖頭用紙帶入于內。以深為妙。

地骨皮土皮一兩去

木香半兩

穿山甲二錢半炙黃

麝香半

右為細末。酒調下三錢。及小兒斑後生癰。米飲調下。効如神。

治丁瘡毒氣入腹昏悶不食。

紫花地丁

蟬壳

管仲各半兩

丁香

乳香錢各一

右細末。每服二錢。溫酒調下。

治惡瘡有死肉者。及追膿。

白丁香

輕粉

粉霜

雄黃

麝香錢各一

已豆三個去油

右同研細。新飯和作錠子用之。

治諸瘡大疼痛。不辨肉色。護腫光色。名曰附骨癰。如神三生散。

露蜂房

蛇退皮

頭髮洗淨等分

三味燒灰存性。研細。酒調三錢。

治膀胱移熱于小腸上。為口糜。好飲食。人多有此疾。當用導赤散。五苓散。各半兩煎服。

治少陰口瘡。半夏散。若聲絕不出者。是風寒過絕。陽氣不伸也。

半夏一兩

桂半

草烏頭半



右同煎一盞水作二服其效如神

治太陰口瘡甘藷散

生甘草一

白礬一

右噙化嚥津

治赤口瘡乳香散

乳香

沒藥各一

白礬飛半

銅綠許

為細末摻用

諸瘡瘍痛色變紫黑者回瘡金銀花湯

金銀花連衣二兩

黃耆兩

甘草兩右三味劉細酒一分入瓶內閉口重

湯內煮三二時取出去滓放溫服之

諸瘡腫已破木破嫩腫甚當歸散主之

當歸 黃耆 栝婁 木香 黃連各右為粗末煎一兩如痛而大便秘

加大黃錢三

乳香散 治瘡口痛大者

寒水石燒一兩

滑石一兩

乳香

沒藥各五

腦子許

右各研細同和勻少摻瘡口上

雄黃散 治諸瘡有惡肉不能去者

雄黃一錢

巴豆一個去

右二味同研如泥人乳香沒藥少許再研細少上惡肉自去也

木香散 治瘡口久不斂

木香

檳榔各一 黃連二

右為細末摻上如痛加當歸一錢貼之自收斂

又方 小椒去炒黑色

定粉一兩

風化灰錢五

白礬二錢半

乳香

沒藥各一

右為細末摻瘡口上

鐵頭歲 治瘡瘍嫩腫木硬

蟾酥

麝香錢一