

病純下血痢以四物湯加黃連白朮共瘀血加桃仁紅花通加

地榆主之方見三卷內

病如大便閉或裏急後重數至圜而不能便或少白膿或少有

血慎勿利之舉其陽則陰氣自降矣以升陽防風湯主之

方見三卷內

病下焦積冷陽氣虛脫滑利不禁是也

治法當補中散寒為本經云酸以收之澁以止之故以收熱止

脫凡下多則傷血必須行滯氣熱厚腸胃而止痢也

方嚴氏當歸丸

白朮二兩炙草七錢乾薑五錢附子一枚烏梅一兩去核

蛤粉一兩川歸二兩白芍一兩阿膠五錢厚朴七錢薑製

右為末醋糊丸每食前米清下三五十丸

病熱毒入胃下痢膿血以黃連阿膠丸主之

方黃連阿膠丸

黃連

炒二兩

山梔仁

五錢

阿膠

黃蘗

炒各一兩

右件依法修合醋煮麴糊為丸如梧桐子大每服三四十丸

白湯食前送下

病休息痢經久不已以四君子湯加陳皮木香煎下駐車丸

方四君子湯

人參

三錢

白朮

二錢

白茯苓

一錢五分

甘草

少許

右咬咀水煎熟食前溫服

方駐車丸

黃連

二兩

當歸

一兩五錢

乾薑

炮一兩

右件共為細末用阿膠四兩切炒成珠為末用好米醋四合

熬成膏為丸如梧桐子大每服五十丸食前米湯送下

痢疾未愈瘕症又作以六和湯主之燕治暑毒下痢方見二卷內

弱瘕疾未止因生冷不節飲食傷胃變成下痢以四獸飲主之

方四獸飲

人參 白朮 白茯苓 半夏 橘紅各一錢五分

草菓 甘草炙各八分 生薑五片 烏梅一杓

右用塩少許醃少時以厚紙包裹水濕透煨乾香熟煎空心服之

治一切下痢積熱虛脫滑利並皆治之

方訶子散

乾薑大分 栗殼蜜炙一錢 訶子七分 橘紅七分

右剉一劑用水煎熟空心服

病下痢積已少。但虛坐者是血少也。以胃風湯去桂加熟地黃

主之。方見本卷前

病下痢大孔痛。此熱流下也。以木香、檳榔、黃芩、黃連各等分。加些少炮乾薑煎服。外用火燒過瓦塊一片。再於炭火中燒通紅。入槐花湯淬候溫。貼在肛門上。一日易換十餘次。神効。

病痢後脚痛緩弱不能行履。名曰痢風。以大防風湯主之。方見三卷內

病一切濕熱痢症。滑脫不禁等症是也。

治法當清理濕熱為主。經云苦可以勝濕。寒可以勝熱。是以清濕理熱調血理氣。故用烏梅丸主之。

方烏梅丸

黃連 二兩
當歸 二兩
枳殼 一兩
烏梅 一兩

石為末醋糊丸空心米飲以下三五十九。

下痢身熱譫語氣實者以承氣湯治之。方見三卷內。

中暑下痢煩渴燥熱治以黃連香薷散加人參主之。方見三卷內。

下痢鮮血不止此乃大腸經血熱所致也。

治法當清熱涼血為主是以用黃連槐花理大腸經熱用歸為

地芍以補涼血阿膠艾葉以止下痢之血粟殼以固脫滑

加味四物湯

黃連 三錢
槐花 二錢
川歸 一錢
川芎 六分

粟殼 七分
生地 一錢
白芍 八分
阿膠 一錢

艾葉 七分
○右咬咀水煎食前溫服。

下痢清白手足厥冷腹疼不已以附子理中湯主之。方見三卷內。

痢下痢血腹脹裏急後重夫痢皆由腸胃濕熱而成也。

治法當用苦寒之劑以下腸胃中濕熱為主經云苦可以去濕寒可以勝熱丹谿又云調血則便膿止已行氣則後重除故用芩連大黃等諸苦寒以清腸胃中濕氣為本佐歸芍調血木香檳榔導氣二者為標。

方導氣湯

黃連 一錢 黃芩 一錢 大黃 一錢 川歸 一錢五分

白芍 八分 木香 二分 檳榔 七分

右咬咀水煎熟空心服。

時疫痢疾長幼傳染率皆相似以倉廩湯加陳皮煎服。方見本卷前

下痢脫肛以養臟湯加升麻去木香或升陽防風湯煎服。方見本卷

赤白痢疾以香連茱萸丸或駐車丸尤可。方見本卷前

方香連菜萸丸

黃連

如莖大

吳茱萸

浸泡七次去枝梗四兩

石件同炒香微黃色地上去火毒揀各一處另為細末每末

一兩入木香末二錢醋煮麴為丸如梧桐子大每服一

百丸若白痢用茱萸丸赤痢用黃連丸赤白夾雜各半赤

先起先服連丸白先起先用茱萸丸看赤白多少丸藥和服

俱用溫酒送下不能飲以米湯亦可

治下痢血夫痢由濕熱而成法當清熱理濕為主故用黃連清

熱茯苓滲濕阿膠理血

方黃連阿膠丸

黃連

三兩

茯苓

二兩

阿膠

炒成珠另研為末二兩

右件先將滾水化開阿膠末成糊為丸食前米湯下五十丸

一切痢疾皆由濕熱怫鬱而成法當清熱疎滯為主是以用黃連黃栢大黃等諸苦寒以清濕熱木香檳榔青皮陳皮廣木枳殼丑末香附等諸辛溫以疎積滯。

〔方〕木香檳榔丸

黃連 四兩 黃栢 二兩 大黃 二兩 木香 一兩

檳榔 七錢 丑末 五錢 香附 八錢 廣木 五錢

青皮 七錢 陳皮 七錢 枳殼 一兩

右為末以水丸如梧桐子大食前米飲下或五十九丸六七十丸量人虛實加減

治虛怯人久痢不止嘔吐等症是以用人參白朮茯苓甘草等補中益氣以止痢木香調氣薑香乾薑溫胃以止嘔

〔方〕錢氏白朮散

人參 二錢 白朮 一錢 茯苓 八分 甘草 炙五分

木香 七分 藿香 七分 乾薑 五分

右咬咀。水煎熟食。後溫服。

積滯成痢。急促。去不通。泰量人壯實。以萬靈丹下之。○若熱痢。以導水丸。○白痢燒麩丸。

○萬靈丹 靈州 川烏 一隻重八錢者炮 石菖蒲 桂心 黃連 人參

桔梗 乾薑 杏仁 厚朴 酥炙

威靈仙 浸火炙 吳茱萸 湯泡七次晒乾山梔湯浸一宿取出焙乾 紫苑

柴胡 防風 猪牙皂角 甘遂

白茯苓 巴豆 鹽炒黃各二錢五分另研

右件依法製度為末。入巴豆和勻。煉蜜成劑。杆一二千下。磁器收貯。臨服丸如梧桐子大。每服大人服五丸。氣實者七

丸。小兒看大小虛實斟酌用。溫酒或白湯空心送下。

方導水丸

黑牽牛

取頭末二兩

滑石

另研二兩

黃芩

取末一兩

大黃

取末一兩

右件和勻。滴水為丸。如梧桐子大。每服壯實人六十丸。小弱量虛實與服。

方燒惠丸

巴豆

去殼

丁香

硝砂仁

杏仁

去皮尖

白礬

如杏仁大各一枰

右用大肥惠子一枚去核。包前五件在內。用粗紙三五重裹。水濕紙放。慢灰火中煨紙乾。待礬銷為度。杵極爛為丸。如梧桐子大。壯實人每服三丸。小弱人量減與服。

○癰亂論

卒霍亂皆因醉飽過度傷于胃土脾弱不能運化加以風寒暑濕之氣所感致陽盛於外陰生於內邪正相搏陰陽交爭揮霍撩亂吐利交作邪在上則吐邪在下則瀉邪在中焦既吐且利所以此疾多生於夏秋縱寒月有之亦有伏暑而然病之將作必先肚腹疼痛吐瀉之後甚則轉筋此兼風也手足厥冷氣少唇青此兼寒也身熱煩渴氣麤口燥此兼暑也四肢重着骨節煩疼此兼濕也又有上不得吐下不得瀉邪結腹中疼之至極名曰乾霍亂此係內有所傷外有邪氣所遏升降不通最爲危證急用薑鹽飲煎湯灌下通達其氣但得吐利方爲佳兆若手足厥冷將欲絕者宜用艾於臍中灸之投以附子理中之類俟甦醒審其寒熱用藥若陽氣已脫遺尿不知或膏汗如珠或大躁欲入水或四肢不收或氣少不語誠爲難治臨症之際不可

連進粥飲。使碍氣道。審其風者散之。寒者溫之。暑者清之。濕者利之。不可執一而泥也。

○癰亂脉辨

脉微而濇。代而散。或隱而伏。或大而虛。或又關滑。皆為癰亂吐瀉之候。○洪者為熱。弦者為飲。氣口脉滑。膈間有宿食。留飲宜順其性。以鹽湯吐之。

○癰亂法則

霍亂之症。內因飲食。七情所傷。外因風寒暑濕。六淫所遏。水火相干。陰陽相搏。上下失離。榮衛失統。甚則筋挛掣痛。均其吐瀉過多。津液重亡。筋失所養。而致治療大法。在乎分利陰陽。散風行濕。降火引清。氣上升。使濁氣下降。如陰虛加以參朮等。補則如六和湯之類。

○丹豁活法

霍亂之症。揮霍撩亂。起於一時。多由內傷挾外感。陰陽乖隔。而致偏陽多熱。偏陰多寒。卒然而來。上吐下瀉。名濕霍亂。其症雖危。仍多可治。蓋由所傷之邪。因吐利而解之故也。如欲吐利而不得吐利者。名乾霍亂。其證必危。不治。蓋由所傷之邪。不得發越壅閉正氣。關格。陰陽不得通接之故。治法大要。必在探吐升提。氣中而寓發散之意焉。餘則詳其虛實寒熱。加減用藥。

如有寒。腹滿而痛。四肢拘急。轉筋下利者。宜理中加附子。官桂。如中暑霍亂。煩燥大渴。心腹撮痛。四肢冷汗。腳轉筋。宜藿香正氣散。或理中湯加石膏。

如霍亂吐瀉。心腹疼痛。宜先用鹽湯探吐。後用藿香正氣加水。

香五分。若煩欲登園而不通。再加枳殼一錢。

如夏月多食寒冷。乘風取涼。以致苗不化。否隔上下。而成霍亂。宜六和湯。倍加藿香。

凡轉筋。多由血熱。宜四物加酒。今紅花。南星。蒼朮。

凡霍亂不渴。宜以生薑理中湯最妙。如渴者。用五苓散。加五味。麥門冬。滑石。

如冬月霍亂。理中湯為主。夏月黃連香薷飲。井中浸冷服。

二陳湯。加藿香。蒼朮。厚朴。砂仁。口止。人參。神麴。善治霍亂吐瀉。遇寒月。加乾薑。甚則加附子。

凡轉筋。男子以手挽其陰。女子牽兩乳。近兩傍。其筋自和。此異得之妙法也。

治霍亂轉筋惡風。此風暑令病。以石膏理中湯主之。

石膏理中湯

石膏

人參

白朮

各二錢五分

甘草

炙一錢

乾薑

一分五錢

右咬咀。水二鍾煎一鍾。食前服。

甲寒霍亂吐瀉。以理中湯主之。

方見三卷內。

○手足寒厥轉筋。加黑

附子。

炮二錢

病暑熱霍亂。蓋霍亂之症。皆由中氣虧敗。外邪干之而成。

治法當補中氣為本。理外邪為標。是以用人參黃芪白朮甘草

補益中氣。茯苓澤瀉滑石等。分利小水。以泄火。石膏寒水

石。以清熱。木香和氣導滯。葛根解肌止渴。桂枝通血脉。和

榮衛。

方桂苓甘露飲

人參

三兩

黃芪

二兩

白朮

二兩

甘草

炙一兩

茯苓

二兩

澤瀉

一兩

滑石

一兩

石膏

一兩五錢

寒水石

兩半

葛根

一兩

桂枝

五錢

木香

五錢

右共爲細末。每白湯調服二錢。

霍亂多寒。肉冷脉絕。以通脉四逆湯治之。

〔方〕通脉四逆湯

吳茱萸

八分

黑附子

一錢五分

桂心

去皮不見火

木通

細辛

白芍藥

當歸 各一錢

甘草

炙五分

右咬咀。薑七片。棗二枚。水一鍾。酒半鍾。煎七分。溫服。

〔病〕霍亂吐瀉不止。此乃中氣虧敗。脾胃不和所致也。

〔治〕法當補中氣。和脾胃。故用人參。白朮。甘草等。補中氣。以止瀉。

砂仁。霍香。白朮。豈以止嘔。半夏。杏仁。降逆氣。厚朴。疎滯。香

薤以清暑。赤茯苓。木瓜等。以理濕。

〔方〕六和湯

人參 二錢

白朮 二錢

甘草 六分

砂仁 七分

藿香 八分

白扁豆 一錢

半夏 七分

杏仁 七分

厚朴 七分

香薷 二錢

赤茯苓 一錢

木瓜 七分

右咬咀。用薑三片。棗二枚。水二鍾。煎一鍾。溫服。

〔病〕七情鬱結。五臟之間。互相刑剋。陰陽不和。揮霍交亂。吐利交

作。以七氣湯治之。

〔方〕七氣湯

橘紅 二錢

茯苓 去皮

半夏 各一錢五分

厚朴 薑製

人參 各一錢

白芍藥

紫蘇 各五分

官桂 三分

甘草 四分

右咬咀。水一鍾。酒半鍾。生薑七片。棗二枚。煎七分。空心溫服。

霍亂嘔吐不止。以正氣散主之。
方見三卷內。