

訂補明醫指掌卷之七

和雲洲皇甫中編

長洲念山邵從臯訂補

子繩山邵達校閱

癰症一

歌牛馬猪羊雞五癰治須尋火與尋痰更將痰火分
多少識得樞機總不難

論夫癰有五馬癰則張口搖頭馬鳴牛癰則目正直
視腹脹猪癰則喜吐沫羊癰則揚目吐舌雞癰則
搖頭反折善驚蓋以其形之類而名之也古者既
有五癰之名治無分別槩用香竄鎮墜之藥殊爲



訂補明醫指掌卷之七

和雲洲皇甫中編

長洲念山邵從臯訂補

子繩山邵達校閱

癰症一

歌牛馬猪羊雞五癰治須尋火與尋痰更將痰火分
多少識得樞機總不難

論夫癰有五馬癰則張口搖頭馬鳴牛癰則目正直
視腹脹猪癰則喜吐沫羊癰則揚目吐舌雞癰則
搖頭反折善驚蓋以其形之類而名之也古者既
有五癰之名治無分別槩用香竄鎮墜之藥殊爲



未當丹溪云癰病蓋因痰涎壅盛迷瞞孔竅發則
頭旋顛倒手足搐搦口眼相引胸背強直叫吼吐
沫食頃乃甦大率屬痰與火法當尋火尋痰分多
分少治之亦有因驚而得者驚則神不守舍舍空
而痰聚也宜以行痰為主佐以定悸寧心安神可
也彼香竄燥劑寧不助火耗氣乎

痰

痰者動則有聲脉滑涎沫出必得吐後用安神丸
大率以行痰為主二陳湯加南星瓜蒌黃連方見痰症

安神丸

治痰癰

黃連

一兩五錢酒製

硃砂

一兩水飛

生地黃

一兩

當歸

一兩酒洗

山

炙五錢

蜜丸

每五十丸

火

火者有熱面赤脉散大抵肥人痰多瘦人火多

吐後用平肝青黛黃連川芎柴胡或寧神

寧神丹

治火盛

天麻

五錢

人參

五錢

陳皮

五錢

白朮

五錢

當歸身

五錢

白茯苓

五錢

荊芥

五錢

僵蠶

五錢

獨活

五錢

遠志

五錢

犀角

五錢

麥門冬

一兩

棗仁

炒五錢

辰砂

五錢

半夏

一兩

南星

一兩

石膏

一兩

甘炒

三錢

白附子

三錢

川芎

三錢

大黃

三錢

珍珠

三錢

地黃

五錢

黃連

五錢

金箔

三十片

酒丸

空心

白湯下

五十丸

驚

因驚而得者則神不守舍舍空痰聚必先行痰亦

用吐痰吐後安神丸方見前或三癰丸

三癰丸治一切驚癰荆芥穗二兩白礬生半兩硃砂為衣

顛狂症二

歌謔言歌走勿踰墻妄自稱尊號曰狂顛者身殭心

不樂須知二症有陰陽

論夫狂者陽症其狀少臥而不飢妄言歌笑踰垣上

屋棄衣奔走自高賢也自貴倨也自辨智也顛者

陰症其狀僵仆直視意不樂是也丹溪云大率多

因痰結于心胸間治當鎮心神開結痰有中邪而

得者以治邪法治之蓋陽虛陰實則顛陰虛陽實



則狂扁鵲云重陰者顛重陽者狂故顛狂二症陰陽之不同也

脉顛癇之症陽浮陰沉數熱滑痰狂發于心驚癇弦急可尋浮病腑淺沉病臟深○顛脉搏大者生沉小緊急者不治狂脉實大者生沉小者死顛脉虛可治實則死

顛症

顛者神不守舍顛狂如有所見經年不愈心經有損是爲眞病若悲哭呻吟爲邪所憑者非狂也用蠶故帛一味燒灰好酒調服二錢顛風麻仁湯顛疾失心者宜助心氣用靈苑方



顛風麻仁湯

麻仁四升水六升猛火煮七合服

靈苑方

助心氣硃砂一兩棗仁半兩乳香半兩

右作一服溫酒下。以醉為度。勿令吐服。後便令睡。待其自醒。則神魂安矣。萬一驚觸。不可復治。

狂症

狂邪者。發作無時。披頭大叫。踰垣上屋。不避水火。棄衣奔走。欲殺人。苦參丸。卒狂妄言者。針大拇指甲上去一韭葉許。大抵狂病宜大吐下。則可愈。大黃一物湯。

苦參丸

治狂邪苦參多不蜜丸薄荷湯下五十九

大黃一物湯

大黃四兩酒浸一宿水三升煎之分三服必

數日後方可與食但得寧靜方爲吉兆不可見其
瘦弱減食便以溫藥補之及以飲食飽之病不再
作戒之戒之緩與之食方爲得體故曰損其穀氣
則病易愈所以然者食入于陰長氣于陽故也。
○按前二症必有所因或因大怒動其肝風或因大
驚動其心火或素有痰卒爲火升升而不降壅塞
心竅神明不得出人主宰失其號令心反爲痰所
役一時發越若踰垣上屋持刃殺人裸體罵詈不
避親疎飛奔疾走涉水如陸者此肝氣大旺木來
乘心名之曰狂又謂之太顛法當抑肝鎮心降龍
丹主之若撫掌大笑語言不倫左顧右盼如見鬼

神片時正性復明深為赧悔少頃而狀態如故者
此為上隔頑痰泛濫洋溢塞其道路心為之碍痰
少降則正性復明痰復升則又發明之曰顛法當
利肺安心安神滾痰丸主之

降龍丹

抑肝鎮心

黑鉛

一兩熔開投水銀一兩不在手炒至成粉為度名曰銀鈔

硃砂

五錢

蛇含石

五錢火內假過

金箔

五百片

錫箔

五百片

研細丸如芡實大每服三丸茯神湯

磨化下

安神滾痰丸

礞石

一兩

風化硝

一兩

硃砂

一兩

沉香

五錢

珍珠

五錢

其末煎大麻膏丸如芡實

大每服三丸薑汁竹瀝調下

瘧症一

〔歌〕瘧本非風溼上求有無汗症見剛柔角弓口
風狀燥劑教君勿妄投

〔論〕仲景云太陽病發熱脉沉而遲日瘧傷寒發汗過
多因致瘧大發溼家汗亦成瘧瘡家發汗亦成瘧
產後去血過多亦成瘧其症身熱足寒頸項強急
惡寒時頭熱面赤目脉赤獨頭搖卒口噤背反張
者是也有汗曰柔瘧無汗曰剛瘧剛瘧屬陽柔瘧
屬陰丹溪云瘧屬太陰溼土故經云諸瘧強直背
屬于濕蓋溼土過極反兼風化制之然兼化者虛
象而實非風也切不可槩作風治而用燥藥大率

屬氣虛亦有火兼痰者宜辨之若身涼手足冷脉
沉細者爲陰瘧若口眼牽扯手足戰搖伸縮者爲
風痰若發熱喘嗽生痰爲痰火宜隨症治之若目
瞪口開昏冒不知人者不治並用如聖飲加減治
之

如聖飲 治剛柔二瘧與瘧瘧同治法

羌活

上

防風

中

川芎

中

白芷

中

柴胡

中

芍藥

中

人參

中

當歸

中

甘草

中

半夏

下

黃芩

中

烏藥

中

右用水二盞薑三片煎一盞入薑汗竹瀝溫服○
有汗曰柔瘧加白朮杜枝○無汗曰剛瘧加蒼朮



南京中医药大学图书馆藏

麻黃或加葛根亦可。○痰多加貝母瓜蒌枳實紫
蘇子。○火盛加山梔仁麥門冬花粉去川芎柴胡
烏藥半夏羌活防風白芷。○如口噤咬牙大便秘
者加大黃利之。○產後去血過多成瘕者加黃芩
熟地黃

厥症四

歌 厥形有六要消詳痰氣尸虺陰其陽故使四肢成
厥逆陰陽虛實各分張

論 夫陰厥者始因泄利身寒厥冷足踰臥唇口青目
利溲白不渴脉遲陽厥者身熱四肢厥逆大小便
門澀脉數熱極反厥也痰厥者寒痰迷悶心胸墜



南京中医药大学图书馆藏

道不行。四肢厥冷。僵仆卒倒。不知人事。厥者氣暴逆也。故卒然厥逆。不知人。僵仆身冷。虺厥者。胃寒虺蟲攻胃。手足厥冷。吐虺尸。厥者冒犯不正之氣。忽然手足厥冷。肌膚起粟。頭面青黑。或妄言。或口噤昏瞶。不知人。或因雨喪問病。入廟登榘而得。丹溪云。有因氣而厥者。身冷脉伏。有血虛而厥者。因血大損故也。脉必芤澀。有因痰滯而厥者。口中流涎昏不知人。脉沉滑。有氣虛而厥者。有所勞傷。氣弱不能運行故也。凡此之類。在乎細辨之。

陰陽厥

陰厥。理中湯重者四逆湯。二方俱見中寒外多關元穴五

十壯陽厥四逆散大便閉熱極反厥大承氣湯

之方見傷食

四逆散

治陽厥輕者

甘草炙一

枳殼炒一

柴胡一

芍藥一

芍藥炒一

劉一貼

水二鍾

煎八分

不拘時服

氣血厥

蘇合香丸

四七湯

調氣散

八味順氣散

方見蘇合香丸

治風

治風

婦人血厥

倉公散

白薇湯

公散

治血厥

瓜蒂

藜蘆

礞石

飛一

雄黃

末之

每用

少許

吹鼻中

取嚏

白薇

湯

白薇

治血厥

白薇

當歸

人參

半

甘草

炙七

劉

一貼

水二盞

煎一盞

溫服



虻厥

虻厥理中湯加檳榔川椒煎吞烏梅丸

一方一見中寒

心不止用烏梅川椒黃檗煎服蓋虻聞酸苦則安

尸厥

尸厥蘇合香丸

方見類中風症

調氣散

方見氣症

或追魂湯

追魂湯

治卒厥不知人

麻黃

去節三小

杏仁

二十粒

生甘草

一煎服

痰厥

痰厥昏悶不醒稀涎散

方見中風導痰湯

方見痰症

痿症五

歌諸痿多因肺熱坐故云痿獨取陽明分明白是膏

梁疾勿謂為風浪立名

論夫痿有五。脈筋骨肉痿。廢是也。古方多以治風之藥通治痿。何其謬也。至丹溪始辨之。以風痿一。另立篇目。源流不同。治法迥別。此開千古之新。丹溪云。內經謂諸痿起于肺熱。又謂治痿獨取陽明。蓋肺金體燥。居上而主氣。畏火者也。脾土主溼。居中央主四肢。畏木者也。火性炎上。若嗜欲無節。則水失所養。火寡于畏而侮所勝。肺得火邪而熱矣。木性則急。肺受熱邪。則金失所養。木寡于畏而侮所勝。脾得木邪而傷矣。肺熱則不能管攝一身。脾傷則四肢不能爲用。而諸痿作矣。故瀉火則肺金清而木不實。何傷脾之有。補腎水則心火降而

肺金不虛何肺熱之有故陽明實則宗筋潤而能束骨關節利矣治痿之法莫出于此然或有溼熱或痰或血虛或氣虛或死血或食積妨礙不得降者比比皆然當審而療之尤當淡薄滋味焉

〔脈痿〕因肺燥脈多浮弱寸口若沉發汗則錯足痛或軟者審于尺滑疾而緩或沉而弱

虛痿

六率虛與熱氣血兩虛者四物湯加參芪知母黃藥熟多加黃芩尺血虛四物湯加黃蘗蒼朮

方見血虛

或丹溪補陰丸

方見火虛

氣虛者四君子湯加黃蘗知

母

方見脾胃