

臨證指南醫案卷四

許關李大瞻翰圖

古吳葉桂天士先生著 錫山鄒錦畹滋九全校

華旦玉堂

積聚

木犯土
虛中挾
滯

葛

噯怒強食。肝木犯土。腹痛突如有形。緩則泯然無跡。

氣下鳴響。皆木火餘威。乃癰疝之屬。攻伐消導。必變腹滿。以虛中挾滯。最難速功。近日痛瀉。恐延秋痢。

丁香

厚朴

茯苓

炒白芍



臨證指南醫案目

卷四

積聚

痞

噎膈

噫噎

嘔吐

吐衄

不食

腸痺

便閉

肺痺

胸痺

哮

喘

呃

疸

卷四

續金匱要略卷四



臨證指南醫案卷四

許關李大瞻翰圖

古吳葉桂天士先生著 錫山鄒錦畹滋九全校

華旦玉堂

積聚

木犯土
虛中挾
滯

葛

噯怒強食。肝木犯土。腹痛突如有形。緩則泯然無跡。

氣下鳴響。皆木火餘威。乃瘕疝之屬。攻伐消導。必變腹滿。以虛中挾滯。最難速功。近日痛瀉。恐延秋痢。

丁香

厚朴

茯苓

炒白芍



廣皮

煨益智仁

又下午倦甚暮夜痛發陽微陰濁乃踞用溫通陽明法

人參

吳萸

半夏

薑汁

茯苓

炒白芍

又

照前方去白芍加川棟牡蠣

白

瘧邪久留結聚血分成形仲景有緩攻通絡方法可

脾胃傷
氣分結
痞

宗但瘧母必在脇下以少陽厥陰表裏為病今脈弦大

面色黃滯腹大青筋皆露頸脈震動純是脾胃受傷積

聚內起氣分受病痞滿勢成與瘧母邪結血分又屬兩

途經年病久正氣已怯觀東垣五積必疎補兩施蓋緩



攻為宜。

生於朮

雞肫皮

川連

厚朴

新會皮

薑渣

水法丸

氣滯濕熱
腑聚

馬

三病後食物失和。腸中變化。傳導失職。氣滯釀濕。鬱而

成熱。六腑滯濁為之聚。昔潔古東垣輩於腸胃宿病。每取丸劑緩攻。當倣之。

川連

蘆薈

名華上炙

雞肫皮

不落水去垢新瓦上炙脆

煨木香

小青皮

萊菔子

南山查

紫厚朴

蒸餅為小丸

濕熱食滯

陳

八濕勝脾胃。食物不化。向有聚積。腸腑不通。熱氣固鬱。



當進和中。忌口勿勞。不致變病。

黃芩

枳實

廣皮

萊菔子

白芍

白朮

蒼朮

雞肫皮

水泛丸

痰凝脈絡

吳

一三

右脇有形高突。按之無痛。此屬癥痞。非若氣聚凝痰。

難以推求。然病久僅阻在脈。須佐針刺宣通。正在伏天

宜商。

真蛤粉

白芥子

瓜蒌皮

黑梔皮

半夏

鬱金

橘紅

薑皮

痺脈絡凝

曹

著而不移。是為陰邪聚絡。診脈弦緩。難以五積肥氣

攻治。大旨以辛溫入血絡治之。

當歸鬚 延胡 官桂 橘核 韭白

王三騎射馳驟。寒暑勞形。皆令陽氣受傷。三年來右胸脇形高微突。初病脹痛無形。久則形堅似梗。是初爲氣結。在經久則血傷入絡。蓋經絡系於臟腑外廓。猶堪勉強支撐。但氣鈍血滯。日漸癰痺。而延癰痕。怒勞努力。氣血交亂。病必旋發。故寒溫消剋。理氣逐血。總之未能講究。絡病工夫。考仲景於勞傷血痺諸法。其通絡方法。每取蟲蟻迅速飛走。諸靈俾飛者升。走者降。血無凝著。氣可宣通。與攻積除堅。徒入臟腑者。有間。錄法備參末議。

蜣螂蟲 廔蟲 當歸鬚 桃仁 川鬱金

伏梁

川芎 生香附 煨木香 生牡蠣 夏枯草

某

用大酒麴末二兩加水稀糊丸無灰酒送三錢
俗內豈有伏梁
伏梁病在絡。日後當血凝之慮。脈數左大。是其徵也。

厚朴 一錢 青皮 八分 當歸 一錢 鬱金 一錢

益母草 三錢 茯苓 一錢 澤瀉 一錢

某

脈數堅。伏梁病在絡。宜氣血分消。

桃仁 三錢 炒研 鬱金 一錢 芫蔚子 一錢 枳實 七分

厚朴 一錢 茯苓 三錢 通草 五分

自難經分出積者。陰氣也。五臟所生。聚者陽氣也。六腑所成。後巢氏病源另立癥瘕之名。以不動者為癥。

積聚之症各殊
治法亦迥別案
中皆泛之方治
積聚之法未及
百分之一學者
宜廣求之

動者爲痕。究之亦卽難經積聚之意也。前賢有云。積聚者。就其盲膜結聚之處。以經脈所過部分屬臟者爲陰。陰主靜。靜則堅而不移。屬腑者爲陽。陽主動。動則移而不定。故是案中又從而悟出云。著而不移。是爲陰邪。聚絡大旨以辛溫入血絡治之。蓋陰主靜。不移卽主靜之根。所以爲陰也。可容不移之陰邪者。自必無陽動之氣。以旋運之。而必有陰靜之血。以倚伏之。所以必藉體陰用陽之品。方能入陰出陽。以施其辛散溫通之力也。又云。初爲氣結在經。久則血傷入絡。輒仗蠕動之物。鬆透病根。是又先生化裁之妙。於

古人書引伸觸類而得。若夫薈肫之去熱滯。芥蛤之豁凝痰。不過爲先生用古處也。案中積症。第見伏梁。不能盡備。然宋時諸賢。於五積九積治法。載在書籍者。頗多大略。消補兼施。并以所惡者攻。所喜者誘。爾業醫者。自當知之稔也。姚亦陶

痞

痰熱內閉

宋

前議辛潤下氣以治肺痺。謂上焦不行則下脘不通。古稱痞悶都屬氣分之鬱也。兩番大便胸次稍舒而未爲全爽。此豈有形之滯。乃氣鬱必熱。陳腐粘凝膠聚。故脘腹熱氣下注。隱然微痛。法當用仲景梔子豉湯解其陳腐鬱熱。暮臥另進白金丸一錢。蓋熱必生痰。氣阻痰滯。一湯一丸以有形無形之各異也。

黑山梔

香豉

鬱金

杏仁

桃仁

瓜蒌皮

降香

另付白金丸五錢

此所云不服藥
為中醫說也近
日醫者之藥一
概俱停天下遂
無枉死之人矣

熱邪裏結

孫 寒熱由四末以擾胃。非藥從口入以擾胃。邪熱津液。

互膠成痰。氣不展舒。阻痺腕中。治法不但攻病。前議停藥。欲謬藥氣盡。病自退避。三舍耳。

人參

川連

鹽水炒

枳實

半夏

鬱金

石菖蒲

某 脈不清。神煩倦。中痞惡心。乃熱邪裏結。進瀉心法。

炒半夏

黃芩

黃連

乾薑

枳實

杏仁

劉 熱氣痞結。非因食滯。胃汁消燥。舌乾便難。苦辛開氣。

酸苦泄熱。是治法矣。

川連

生薑

人參

枳實

橘紅

烏梅

生白芍

氣閉化熱

顧

氣閉久則氣結不飢不食不大便。

川貝母

白蔻仁

鬱金

杏仁

金銀花

萊豆殼

又

氣結必化熱。乃無形之病故徒補無益。

鮮省頭草

川斛

甜杏仁

川貝母

麻仁

何

三煩勞之人衛氣少固霧露雨濕傷其流行清肅瘡癢

外洄腕脇反痺乃經脈為病無關腑臟

鈎藤

生白蒺

鬱金

白蔻仁



桑葉

橘紅

又氣室熱鬱。仍治上可以通痺。

杏仁

鬱金

香附

瓜蒌皮

黑山梔

蘇梗

周

寒熱嘔吐。虬蟲自利。是暑濕熱外因。因嗔怒動肝邪。

熱邪入厥陰

氣入於厥陰。胸滿腹脹。消渴。議以開痞方法。

瀉心湯去參甘加枳實白芍

伊

因驚而得邪。遂入肝。故厥後熱。神識昏狂。視得面青。

舌白微嘔渴。飲胸次按之而痛。此屬痞結。乃在裏之症。

宗仲景以瀉心湯為法。



暑濕伏
邪夾食

川連

半夏

乾薑

黃芩

人參

枳實

尤

面垢油亮。目皆黃。頭脹如束。胸脘痞悶。此暑濕熱氣
內伏。因勞倦。正氣泄越而發。既非暴受風寒。發散取汗。
徒傷陽氣。按脈形濡濇。豈是表症。凡傷寒必究六經。伏
氣須明三焦。論症參脈。壯年已非有餘之質。當以勞倦
傷伏邪例診治。

滑石

黃芩

厚朴

醋炒半夏

杏仁

薏仁

竹葉

又

胸痛自利。狀如結胸。夫食滯在胃。而胸中清氣。悉爲

濕濁阻遏與食滯兩途此清解三焦卻邪湯藥兼進保

和丸消導

合參法

淡黃芩

川連

淡乾薑

厚朴

醋炒半夏

鬱金

白蔻仁

滑石

送保和丸三錢

暑邪阻氣

談氏

胸痞不饑熱不止舌白而渴此暑邪未盡仍清氣分

鮮竹茹

淡黃芩

知母

橘紅鹽水炒

滑石

桔梗

枳殼汁

鬱金汁

某

四惡寒泄瀉悉減胸脘仍悶餘暑未盡胃氣未甦故耳

大麥仁

四錢

佩蘭葉

三錢

新會皮

一錢

半夏

炒一錢半

金斛

一錢半

茯苓

三錢

