

S294

1276

1部13

醫學從衆

四



醫學從衆卷七

閩吳航陳念祖修園甫著

次男元犀靈石叅前

心典徽菴

孫男

心蘭芝亭

全校字

泄瀉

泄瀉之症有五。而總不離於濕。初起只以平胃散加猪苓
澤瀉。主之。他方皆不逮也。又有五更天將明時必洞源一
二次。名曰脾腎泄。難治。蓋以腎旺於亥子。今腎大虛。閉藏



失職故五更之時而特甚也。亦謂之脾者。以泄瀉之時。一
定不移。五行之土。猶五常之信也。四神丸加味主之。天抵
初瀉與瀉之未甚。宜利水次補脾。久瀉大瀉。宜補腎以胃
關煎八味丸之類為主。兼服補中益氣湯。以升其下陷之
氣。蓋以腎為胃關。二便開闔皆腎所主也。

脈息

宜沉細 忌浮大

加味平胃散

蒼朮

二錢
炒

炙草

陳皮
各

猪苓

厚薄薑汁炒

澤瀉各一錢五分

生薑三片

水煎服

如頭痛發熱惡寒者外感風寒也加紫蘇二錢如川芎

防風各一錢

如傷食飽悶脹痺等症加山查麥芽之類大醉之後更

加乾葛二錢

如腹痛不休脈細手足冷中寒也加乾薑二錢肉桂吳

萸各一錢

如脈洪數有力口中熱舌紅腹痛時作時止小便短澀

火瀉痛也加木通一錢乾葛一錢五分若兼腸垢裏急



後重再加黃連一錢白芍三錢

如瀉月水瀉口渴水便不利加滑石三錢研末

如瀉而腹痛不止爲土傷木賊加酒白芍三錢防風一錢

如服前藥不能效者是脾腎虛寒宜加補骨脂炒扁豆白朮各二錢吳茱萸分分乾薑一錢以溫之如滑脫不止爲加訶子肉豆蔻一錢五分鸚粟殼一錢以瀉之

四神丸

方見待方

鄉前輩林公祚祖傳加白朮八兩鸚粟殼二兩肉桂二



兩醋調炒米粉爲丸。名六神丸。治同。再加桂仲四兩。茯苓四兩。名因腎啟脾丸。自註云。凡服此丸。俾脾元足。而營衛運斯分消之力。旺腎元足。而開闔神斯固攝之權。行。

溫補脾腎元義主方

林公傳

杜仲

錢二

人參

白朮

各一錢五分

茯苓

肉豆蔻

去油各一錢

補骨脂

砂仁

各五分

五味

二分

水煎空心午前服

小腹隱痛加肉桂五分



小便不利加澤瀉一錢

胃關煎

治大瀉將脫久瀉不止

熟地

三四五錢

白朮

二錢

乾薑

一二錢炒

吳黃

五七分

炙草

一錢

扁豆

炒研

山藥

炒各二錢

水煎服

按己上為治瀉之恒法。又有變通活法不可不知。如人瀉服溫補及固澁之藥不止。或愈而復作。或既愈次年又應期而作。俱是錮精未除。宜通因通用之法。本事溫脾湯主之。又有感秋金燥氣。始則咳嗽。久則往來寒熱。



中國醫藥大學圖書館藏

泄瀉無度。服溫補藥更甚。或完穀不化。有似虛寒。而不知肺中之熱。無處可宣。急奔大腸。食入則不待傳化而直出。食不入則腸中之垢。亦隨氣奔而出。是以瀉利無休也。宜以黃芩。地骨皮。甘草。杏仁。阿膠。潤肺之藥。兼潤其腸。則源流俱清。寒熱咳嗽泄瀉一齊俱止矣。又有瀉火亡陰。過服香燥之品。發熱口渴微喘。汗出煩燥。陰氣虛盡。陽氣不能久留。宜急養其陰。以阿膠。地黃。門冬等類。熬膏三四觔。日服十餘次。半月藥盡。遂效。另製補脾藥。未善。後全愈。此喻嘉言之驗案也。

溫脾湯

本事方見時方

主治錮冷在腸胃間。泄瀉腹痛。宜先取去。然後調治。不可謂虛以養病也。

千金溫脾湯

方見實易

治積久熱痢赤白

生薑瀉心湯

治心下痞鞭乾噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利者

甘草瀉心湯

下後痞益甚日利數十行穀不化此非熱結但以胃中



中醫藥大學圖書館藏

虛客氣上逆故使嘔也

半夏瀉心湯

嘔而發熱心下滿而不

黃芩湯

太陽少陽合痛自利者

若嘔者加生薑一錢五分夏一錢名黃芩加半夏生

薑湯

胸中熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔者

即半夏瀉心湯去黃芩加桂桂以和表裏



北京中醫藥大學圖書館藏

乾薑黃連黃芩人參湯

下利醫復吐下之食入口卽吐

此方治嘔家夾熱不利於香砂橘半者服此如神今張石頑先生借治脾胃虛寒腸有積熱之泄甚效

厚薄生薑甘草半夏人參湯

此仲景治汗後腹脹滿之方也今石頑借治瀉後腹脹滿甚效

石頑治總戎陳孟庸瀉後腹脹作痛服黃芩白芍之類脹急急甚其脈洪盛而數按之則濡此濕熱傷脾胃之氣也



中國醫藥大學圖書館藏

與厚薄生薑甘草半夏人參湯一劑痛止脹減而泄利已與乾薑黃芩黃連人參湯二劑瀉止而飲食不覺與生夏瀉心湯二劑而安

葛根黃芩黃連湯

各見傷寒

此湯仲景治桂枝症醫反下之利遂不止脈促喘而汗出之症今借治表邪未解腸胃俱熱之瀉甚效

按君氣質輕清之葛根以解肌而上利佐苦寒清肅之茶連以止汗而除喘又加甘草以和中先煮葛根後納諸藥解肌之六緩清中之氣銳又無補中逐邪者殊法



矣

鍋粬蓮肉糖散

治老幼脾瀉久不愈神方

飯鍋把

四兩淨末

蓮肉

四兩去心淨末

白糖

四兩

右共和勻每服三五匙一日三次食遠服

丹礬蠟榴丸

治一切久瀉諸藥不效宜服此丸

黃丹

枯礬

黃蠟

各一兩

石榴皮

將蠟溶化小銅杓內再以丹礬榴皮三味細末乘熱爲



河南中醫藥大學圖書館藏

丸如荳大空心服五丸兼治紅痢用清茶下白痢用薑

湯下

鍋粃松花散

治白痢不止神效方

飯鍋粃

二兩

松花

二兩

臘肉骨頭

五錢

共為末砂糖調不拘時服

火腿紅麴散

各見種福堂

治脾泄

陳火腿骨

煨存性研末

紅麴

松花



中醫藥大學圖書館藏

右三味各等分爲細末砂糖調陳酒送下

風痺痿

風痺痿三症不同。近世不能爲辨。而混同施治。誤人不淺。茲特分別之。

風者肢節走痛也。內經謂之賊風。後人謂之痛風。又謂之白虎。歷節風。其中表裏寒熱虛實。宜因脈辨症而藥之。至久痛必如絡如木。通刺蒺藜。紅花。金銀花。鈎藤之類。最能通絡。可隨宜加入。久痛必挾鬱。鬱而成熱。熱盛則生瘰。如商星。半夏。招葉根。黃柏。鬱金。川貝。竹瀝。薑汁之類。俱能解



寧夏中藥大學圖書館藏

鬱清熱化痰可隨宜加入多用桑枝桑寄生者蓋以桑爲箕星之精也多用虎骨者以風從虎亦以骨治骨之義也用烏附辛桂之藥而不效者宜用威靈麥冬桑葉瞿麥生苁菊花茯苓阿膠甘草之類爲膏滋養陽明亦是柔潤熄肝風之類

痺者閉也風寒濕雜至合而爲痺與痛風相似但風則陽受之痺則陰受之雖行痺屬風痛痺屬寒着痺屬濕而三氣之合自當以寒濕爲主蓋以風爲陽邪寒濕爲陰邪陰主閉閉則重着而沉痛是痺症不外寒濕而寒濕亦必挾

風寒曰風寒。濕曰風濕。此三氣雜合之說也。內經云。在陽
命曰風。在陰命曰痺。以此分別。則兩症自不濕治矣。至於
治法。不外三痺湯。及景岳三氣飲之類。爲主。如黃芪五物
湯。黃芪防己湯。桂枝芍藥知母湯。烏頭湯之類。皆古聖經
方。當知擇用。張景岳云。祇宜峻補真陰。宣通脈絡。使氣血
得以流行。不得過用驅風等藥。再傷陰氣。必反增其病矣。
若風痺。胞痺。及臟腑之痺。當另立一門方。能分曉醫門法
律。分別甚詳。宜熟玩之。

痿者。兩足痿弱而不痛也。內經分爲五臟。肺痿者。主皮毛