

草部

草原始

卷四



本草原始合雷公炮製卷之四

雍邱正字李中立纂輯並書畫

草部

竹葉處處有之。竹之類甚多而入藥者惟  
三種。人多不能盡別。謹按竹譜。箬竹堅而  
節促。體圓而質勁。皮白如霜。卽水白竹也。  
淡竹似篁而茂。卽甘竹也。苦竹有白有紫。  
說文云。冬生草也。象形。下垂者。箬箬也。蓋

竹從倒草竹草也而冬不死故從倒草一

曰竹倒種故從倒草竹性喜東南引生故

西北種之故曰倒種久之滋引自滿東南

竹葉味苦平大寒無毒主欬逆主氣逆

筋急惡瘍殺小蟲除煩熱風瘧疾瘰癧吐

根作湯益氣止渴補虛下氣消毒實通神

明輕身益氣汁主風症小兒身中惡瘡煮

取竹汁日深洗良

竹物之有

節者也

故管中

生竹葉

也



竹葉瀝乾與鹽少許寒溫  
 所合之。疥癬竹葉為末雞膏和塗食  
 竹葉味辛平大寒主胸中痰熱欬逆上  
 氣。按藥性論云味甘無毒瀝大寒瘧暴  
 中風風痺胸中大熱止煩悶皮筋微寒主  
 嘔哕溫氣寒熱吐血崩中溢筋。久渴心  
 煩服竹瀝良。治產後身或強直口噤面  
 青手足強反張飲竹瀝一二升醒。姓振  
 若煩此子煩故也竹瀝不限冬少細細服  
 之。小兒癰奇竹茹三兩醞三升煎一升  
 去滓服一合兼治小兒口噤體熱病

淡竹

味甘淡木

經曰味辛

非也



苦竹葉及〔蘆〕療目瘡目痛明目利九竅  
 竹筴味甘無毒主消渴利水道益氣可久  
 食。卒失聲濃煮苦竹葉服之良。頭瘡  
 大筴竹葉燒為灰量瘡大小用灰調生油  
 傅少入臙粉佳。有一種草  
 莖如欒葉如淡竹亦名之

苦竹味苦



淡竹葉俗多收採利小水治喉痺等症并  
 神效。又有一種短莖大葉亦堪入藥

附子

味甘

性熱

秋周

紫厚



根冬不乾

附子生犍為山谷及廣漢皮黑體圓底平

山芋狀相彷彿以八月上旬採八角者長

一個重一兩者氣全堪用係烏頭傍出故

附子僉名味辛甘溫大熱有毒主風寒咳


逆邪氣溫中金瘡破敗堅寒濕

腰膝拘攣膝痛脚疼冷弱不能行步腰脊

風寒心腹冷痛霍亂轉筋下利赤白堅肌

腎強陰孕婦忌煎墮胎甚速。若陰盛陽傷寒其人必燥熱而不欲飲水者是也宜服靈散附子一枚燒灰存性為末蜜水調服而愈此逼散寒氣然後熱氣上行而汗出乃愈。附子缺市以山芋造成充實但味甘而不辛為異

靈散



八角附  
子本黑  
底平



俗呼大附  
子又呼黑  
附子



雷公云凡使先須認勿誤用有烏頭喙身烏黑少有傍尖身喙皮土蒼有大烏許者孕八九個周圍底陷黑如烏鐵宜於文武火中炮令皺折即劈破用天雄身全矮無尖周匝四而者附孕十一個

皮蒼色卽是天雄宜炮皺折後去皮尖  
底用不然陰制用並得剉子只乃附子  
傍有小顆附子如素核者是宜生用治  
風疹神妙木鱉子只是諸家附雄烏平  
毗德者號曰本鱉子不入葉中用若服  
令人喪目若附子底平有九角如藏色  
一兩個個重一兩卽是氣全堪用夫  
牛兩于文武火中炮令皺折者去之用  
刀刮土孕子并去底尖微細劈破子星  
下平地上掘一坑深一尺安附于中一  
宿至明取出焙乾用夫欲炮者灰火勿  
用雜木火只用柳木最妙若陰制使卽  
生去尖皮底薄切用東流水并黑豆浸  
五日日夜然後漉出于日中晒令乾用  
使須陰制去尖了每十兩用  
生烏頭五兩東流水六升

之頭故謂之烏頭味辛甘溫大熱有大毒主中風惡風洗洗出汗

味辛甘溫大熱有大毒  
主中風惡風洗洗出汗

除寒濕痺效逆上氣破積聚寒熱消胸上  
痰食不下心腹冷疾臍間痛肩脾痛不可  
伸仰目痛不可久視又墮胎其汁煎之  
名射罔味苦有大毒療尸注瘰癧堅及頭中  
風痺痛敷箭射禽獸即亡中人亦死倘誤  
中人甘草藍青小豆葉浮萍皆可解也  
烏頭係至頂之附子北土有以川烏當之  
非也。治墜螫烏頭末少許研時調傳之

治壘壘鳥頭末少許預焙調傳之

10

蛇胆

聖

五

卷之五

藝人射

頂金

天


五  
易

水



10

烏喙喙乃鳥之口此藥兩歧相合如鳥之口故名烏喙味辛微溫有去毒生肌之功  
 夫腎濕陰衰寒氣凝滯血閉  
 腰痛不能行步癰腫膿結又腫  
 胎。烏喙係兩歧之鳥頭也



項雨歧

二月採

水炮去  
皮

烏喙江東人呼為堇晉醫張華中書生寧堇  
 于肉者是也唐武后置堇于食賀氏食之  
 暴死蘇秦曰人之飢所以不食烏喙者以  
 其雖偷充腹而與死同也也可見烏喙過  
 至毒之物也  
 者可不慎歟



天雄此與烏頭附子。本並出建平。故謂之

三建謝靈運山居賦曰。三建異形而同出

別說云。始種烏頭而不生。諸附子側子之

類經年獨生長大者。是也。淮南子云。大雄

云。取天雄三枚。內雄雞腸十搗。生食之。令

人勇。味辛甘大溫。有大毒。主大風寒濕

痺。歷節痛拘攣。慢急破積聚邪氣。金瘡

筋骨輕身健行。療頭風去來疼痛。心腹結

毒。閉節重不能行。步除骨節痛長陰氣強

志。令人武勇力作不倦。又墮胎。廣雅云。一

歲為側子。二歲為烏喙。三歲為附子。四歲

為烏頭。五歲為天雄。今一年種之。便有此



五物豈今人種時之法用力倍至故爾繁  
 盛也耶然元種者母為鳥頭傍出者為附  
 子其長二三寸者為天雄兩歧相合者為  
 鳥喙附子之小者為側子實五物而三種  
 也惟此物形體獨長大故補天雄○天雄  
 係長柄之附子也宜炮皺折後去皮尖底  
 用之○生少室山八月採本經云二月採  
 恐非時也

天雄形長三寸



天雄

鳥頭鳥喙生朗陵山谷天雄生少室山谷  
 附子側子生犍為山谷及廣漢今並生蜀  
 主本只種附子至成熟後有鳥頭鳥喙天  
 雄側子收時乃一處造釀方成釀之法先

於六月內踊造大小麴麴至收採前半月  
預先大麥煮成粥後將土伴麴造醋候熟  
淋去糟其醋不用大酸酸則水解之便於  
所收附子等去根鬚于新潔瓮內淹浸土  
日每日撓一遍日足撈出以彌疎篩之  
令生白衣後向慢風日中晒之百廿日以  
透乾為度是  
以色俱碧耳

側子狀如棗核又從附子旁生故曰側子

味辛大熱有大毒主癰腫風痺歷節腰節  
疼痛冷寒熱風癰又墮胎。喙附雄烏側同  
根而本經分生三處各有所宜故也

附子生處小

附子生處



水齋子只是諸藥除雜烏頭明時者實  
小色黑如桑椹號曰水齋子不入藥用者  
服之令人喪日

雷公云

側子只是附子旁有小顆側子  
如棗核者是宜主用治風疹神

也妙

蓖麻子胡地者良。葉似律草而厚大。莖赤  
有節如甘蔗。高丈餘。秋生細花隨便結實。  
殼上有刺實類巴豆。色斑形如牛蛭。又名  
草麻子。味甘辛平。有小毒。主水蠱水研二  
十枚服之吐惡沫。加至三十枚三

之日一服差則止又主風虛寒熱身體瘡疥  
浮腫尸注惡氣卒取油塗之葉主風腫不  
仁搗蒸敷

油可調印色

正



背



紅者佳

治難產及胎衣不下取草麻子七枚去殼  
取仁研如膏塗腳心底子及衣下便速洗  
去不雨腸出即用此膏塗頂腸當自入  
治一切毒腫疼痛不可忍者搗草麻子  
之即

雷公云

凡使勿用黑天赤利子緣在他

不用草麻子形似巴豆節節目黃黑斑  
點凡使先須和皮用鹽湯煮半日去皮

取子研

通用

葫蘆田野墟村中甚多花白子初青如綠

豆顆每朵如盞面大又中有一二百子十

月方熟紅春夏採葉秋冬採莖根一名蔓

草一名蔓味酸溫有毒主風瘙癢疹溫瘧

味及出產處不同治療又別自是二物斷無疑焉

雷公云凡使春用隔年花莖夏用根秋

切于柳木白中搗取自然汁出緩

緩于鍋子中煎如稀湯任用也



天南星生平澤處處有之苗起數莖每莖  
端六七葉高一尺餘結實作包稍如鼠尾  
根比芋而圓肌細膩且白炮之易裂本經  
云葉似蒟蒻兩枝相抱五月開花似蛇頭  
黃色六月結子作穗似石榴子紅色根似  
芋而圓是虎掌非南星也然南星多生南  
方形圓如星故以名之味苦辛有毒生中  
風餘痰厥癰下氣  
破堅積消通腫利胸膈散血墮胎凡  
生薑湯泡七次入注。