

女
科
經
論

卷三
一
四

女科經綸卷三

馮李蕭

燠賡六纂著

弟磯仔臨

校

張

崑嶸墳

郭士升天階

沈

衍孟嘉

承郡

姚

安詰符

薛

雋臥弓

陳

晉目章

胡公裔次史

全參訂

王

朝翼如

祝艷芳斐卿

葉大年蒼臣

胎前證

妊娠惡阻有絕之之法

金匱要略曰婦人得平脈陰脈小弱其人渴不能食無寒熱名
妊娠于法六十日當有此證設有醫者治逆却一月加上下者
則絕之。

婁全善曰惡阻者謂嘔吐惡心頭眩惡食擇食是也絕之者
謂絕止醫治候其自安也予嘗治一二妊婦惡阻病嘔吐愈
治愈逆因思仲景絕之之旨遂停藥月餘自安真大哉聖人
之言也。

徐忠可曰期有未滿六十日則胎未成又加吐利因醫悞治
則脾胃實有受傷處但當斷絕病根爲主不得泥安胎之說。

而狐疑致悞也故曰絕之

妊娠惡阻屬經血閉塞臟氣不宜

巢元方曰、妊娠惡阻者、心中憤悶、頭眩、四肢懈墮、惡聞食氣、欲
啖鹹酸果實、多睡少起、世言惡食、又云惡阻是也、三四月以上、
不自勝舉、此由婦人本元虛羸、血氣不足、腎氣又弱、兼當風飲
冷、心下有痰水、挾之、娠後經血閉塞、水漬于臟、臟氣不宜、故心
煩憤悶、氣逆嘔吐、血脈不通、經絡痞澁、則四肢沉重、挾風則頭
目眩、又不知患之所在、脈理和平、卽是有胎也、

妊娠惡阻屬五味不化中氣壅實

聖濟總錄曰婦人所食穀味化爲血氣下爲月水凡妊娠之初月水乍聚一月爲媒二月爲胚三月爲胎成則男女上食于母口如鳥在牒胚之時血氣未用五味不化中氣壅實所以脾胃不思穀味聞見于物卽惡心有阻也

妊娠惡阻屬氣血積聚內鬱攻胃

朱丹溪曰凡孕二三月間嘔逆不食或心煩悶此乃氣血積聚以養胎元精血內鬱穢腐之氣上攻于胃是以嘔逆不能納食血既養胎心失所榮是以心虛煩悶法當調血散鬱用參朮甘草補中氣橘紅紫蘇水香生薑散鬱氣茯苓麥冬黃芩竹茹清

熱解煩名參橘飲

。 妊娠惡阻屬胃氣虛弱中脘停痰

陳良甫曰、妊娠惡阻病產寶謂之子病巢氏病源謂之惡阻、由胃氣怯弱中脘停痰脈息和順但肢體沉重頭眩擇食惟嗜酸鹹甚者寒熱嘔吐胸膈煩悶半夏茯苓丸主之、五明齋笑以。 妊娠惡阻屬痰飲血壅停滯肝經胃氣不調胃氣不和。 戴復庵曰惡阻者婦人有孕惡心阻其飲食是也胎前惡阻見食嘔吐喜酸物多臥少起俗名病兒蓋其人宿有痰飲血壅遏而不行故飲隨氣上停滯肝經肝之味酸則必喜啖酸物金剋

木以辛勝之。小半夏茯苓湯。或二陳湯。通順氣。喜。逆。類。金。賦。

食。妊。娠。嘔。吐。屬。于。寒。治。以。溫。其。人。前。有。寒。者。宜。溫。而。止。逆。

金匱要略曰。妊。娠。吐。嘔。不。止。乾。薑。人。參。半。夏。丸。主。之。前。惡。阻。具。

徐忠可曰。諸。嘔。吐。酸。皆。屬。于。火。此。言。胃。氣。不。清。暫。作。嘔。吐。也。

若。妊。娠。嘔。吐。不。止。則。因。寒。而。吐。上。出。爲。嘔。不。止。則。虛。矣。故。以。

半。夏。治。嘔。乾。薑。治。寒。人。參。補。虛。而。以。生。薑。糊。半。夏。以。下。其。所。

逆。之。氣。此。湯。用。南。酒。煮。之。上。有。寒。者。宜。溫。而。止。逆。用。山。

。妊。娠。嘔。吐。惡。阻。勿。作。寒。治。此。湯。用。南。酒。煮。之。上。有。寒。者。宜。溫。而。止。逆。用。山。

大。全。曰。婦。人。經。候。不。調。或。不。行。身。無。病。似。病。脈。滑。大。而。六。脈。俱。

均是孕婦脈也。精神如故。惡聞食氣。或但嗜一物。或大吐。或時吐清水。此名惡阻。勿作寒病治之。宜服人參、白朮、甘草、香附、烏藥、丁香、香生、薑橘紅、保生湯。
按。娠嘔吐。金匱主于寒。大論勿作寒治。是矣。其用藥。則多辛熱何也。

娠嘔吐屬肝挾衝脈之火衝上

羅太無曰。有孕婦三月嘔吐痰。并飲食。每寅卯時作。作時覺少腹有氣上衝。然後膈滿而吐。此肝脈挾衝脈之火衝上也。用沉香磨水化抱龍丸一服。膈寬氣不上吐止。

。妊娠嘔吐屬怒氣傷肝

朱丹溪曰有妊二月嘔吐眩暈脈之左弦而弱此惡阻因怒氣所激肝氣傷又挾胎氣上逆參朮補之大非所宜以茯苓半夏湯下抑青丸

。妊娠嘔吐惡阻屬少陽之火上衝胃口

趙養葵曰惡阻多在三箇月之時相火化胎之候壯火食氣上衝胃口食入卽嘔吐少陰腎水旣養胎少陽之火益熾須用清肝滋腎湯卽六味飲加柴胡白芍先用逍遙散止嘔再用調經滋腎湯加吐續嘔甚者加川連吳茱妙

胎前惡阻嘔吐用半夏論

陳良甫曰千金方有半夏茯苓湯。茯苓丸專治惡阻。此二方比來少有服者。以半夏能動胎。胎初結。慮其辛燥易散故也。須薑汁炒以制毒。凡惡阻非半夏不能止。是有故無殞也。婁全善曰。大千方謂半夏動胎不用。今觀仲景用人參半夏乾薑丸。羅謙甫用半夏茯苓湯。朱丹溪用二陳加減。並治胎前惡阻。痰逆嘔吐。心煩頭眩。惡食俱効。獨不知此乎。予治惡阻。用之未嘗動胎。正經云。有故無殞是也。

薛立齋曰。半夏乃健脾氣。化痰滯。主藥脾胃虛弱嘔吐。或痰

涎壅滯飲食少胎不安必用半夏茯苓湯倍加白米安胎健脾胃嘗用驗也。

惡阻嘔吐用藥大法

薛立齋曰妊娠若飲食不甘或欲嘔吐用六君子加紫蘇枳殼若惡阻嘔吐頭眩體倦用參橘飲未應用六君子湯若惡阻嘔吐不食亦用參橘散或飲食停滯腹脹嘔吐此是脾胃虛弱不能消化用六君子湯不應用平胃散加參苓慎齋按已上一十三條序胎前有惡阻嘔吐之證也凡婦人妊孕其始證先見于惡阻而惡阻自金匱有絕之法而下病

機蓋非一端。巢元方以下主于氣凝血聚。陳良甫以下主于停痰積飲。若仲景金匱以寒治太無養葵作火論于惡阻病。機可謂詳悉。但胎前無寒產後無熱。此常法也。故惡阻嘔吐大抵寒者少熱者多。總屬血壅胎元。臟氣不能宣通。停痰積飲鬱熱壅滯。變而爲火。有熱無寒。致生諸證。故丹溪立齋論治。每以枳殼紫蘇蘇梗木香砂仁爲降氣順氣之法。所謂胎前須順氣者此也。

妊娠子煩屬君相二火

陳良甫曰。妊娠煩悶者。以四月受少陰君火。以養精。六月受少

陽相火以養氣。若母心驚膽虛多有是證。

李太素曰：煩者心中煩亂不安也。由受胎後血熱于心，心氣不清，故人鬱悶撩亂不寧。因妊娠而煩，故曰子煩。非子在腹中煩也。古云：四月受少陰君火以養精，六月受少陽相火以養氣。故煩多屬火。今胎受君相之火，豈有母煩之理？況母既以二火養胎，則火瀉矣。又何煩之有？若曰母虛而煩，則當每月皆然。何獨于四月六月而虛且煩？亦不拘于四月六月也。似說不通。

○ 妊娠子煩屬于熱

齊仲甫曰、妊娠煩悶有四證、有心中煩、胸中煩、有子煩、諸屬于
熱、若臟虛而熱氣乘心、令人煩者、名虛煩、若積痰飲嘔吐痰沫
者、名用口煩、或血積停飲、寒熱相搏、致胎氣不安、謂子煩、用犀
角散竹瀝湯之類、

。妊娠子煩屬心肺虛熱痰積于胸

單養賢曰、是心肺虛熱、或痰積于胸、若三月而煩者、但熱而已。
若痰飲而煩者、吐涎惡食、煩躁不安也。大凡妊娠既停痰積飲。
又寒熱相搏、氣鬱不舒、或煩躁、或嘔吐涎沫、劇則胎動不安、均
爲子煩也、

。妊。娠。子。煩。屬。胎。元。壅。鬱。熱。氣。上。衝。
朱丹溪曰。子煩由胎元壅鬱熱氣上衝。以致煩悶。法當清熱疎
鬱。以安胎。犀角散主之。

妊。娠。子。煩。分。證。用。藥。之。法。

薛立齋曰。前證若因內熱。用竹葉湯氣滯。用紫蘇飲痰滯。用二
陳加條芩枳殼氣鬱。用分氣飲加川芎脾胃虛弱。用六君子加
紫蘇山枳。

。妊。娠。煩。躁。屬。熱。乘。心。脾。津。液。枯。燥。

陳良甫曰。妊。娠。煩。躁。口。乾。者。足。太。陰。脾。經。其。氣。通。于。口。手。少。陰。

心經其氣通于舌。若臟腑氣虛榮衛不和。致陰陽隔絕。熱乘心。脾津液枯燥。故心煩口燥。與子煩大同小異。宜知母丸。

妊娠煩躁口乾用藥之法

薛立齋曰。前證若胃經實火。用竹葉石膏湯。若胃經虛熱。用人參黃芪散。若胃經氣虛。用補中湯。若肺經虛熱。用紫蘇飲。若肝經火動。用加味逍遙散。若脾氣鬱結。用加味歸脾湯。若腎經火動。用加味地黃丸。

妊娠暴渴爲血凝病

大全曰。有孕婦暴渴。惟飲五味汁。名醫耿隅診其脈曰。此血欲。

疑非疾也已而果孕然古方有血欲凝而渴飲五味之證不可不知

慎齋按已上九條序胎前有子煩煩躁口乾血渴之證也妊
娠煩躁本屬肺腎二經有火仲景云火入于肺則煩入于腎
則躁胎繫于腎腎水養其胎元則元氣弱不足以滋腎中之
火火上燦肺肺受火刑變爲煩躁此金虧水涸之候法當滋
其化源清金保肺壯水滋腎爲主良甫以君相二火論子煩
產寶以停痰積飲論子煩未悉病機之要若丹溪以子煩爲
氣血壅聚胎元熱氣上衝爲病亦是大概言之耳