

聖濟總錄

吳錫璜署

大德重校聖濟總錄卷第四十七

胃病門

胃虛冷

論曰足陽明胃之經與足太陰為表裏其氣喜溫而惡寒得溫則能變化水穀若其氣不足寒冷之氣乘之則令脛寒不得卧惡風洒洒目急腹中常痛兩脇虛脹善鳴時寒時熱唇口乾面目浮腫食飲不下皆胃虛冷故也

治胃氣虛冷不思飲食硃砂丸方

硃砂

研二兩

陳橘皮

湯浸去白焙

桂

去粗皮

乾薑

炮

當歸

切焙

厚朴

去粗皮生薑汁炙

芎藭

胡椒

縮砂

去皮

甘草

炙剉

附子

炮裂去皮臍各四兩

白朮

三兩

五味子

一兩半

阿魏

研半兩

青鹽

研二兩

右十五味除別研外搗羅為末用銀石鍋入好酒一升白蜜十兩先下硃砂阿魏青鹽三味并好麪一兩同煎煮稀稠成糊入藥末和成劑熟杵丸如梧桐子大每服二十丸生薑鹽湯下不拘時候

治胃氣虛冷腹脹食減四肢少力丁香丸方

丁香

半兩

厚朴

去粗皮生薑汁炙一兩

乾薑

炮半兩

吳茱萸

湯洗焙乾炒半兩

青橘皮

湯浸去白焙一分

桃人去皮共二人炒一兩

五味子

訶梨勒去核

栝榔剉各半兩

木香一分

右十味搗羅為細末煮棗肉丸如菰豆大每服十九橘皮湯下不拘時服

治胃氣虛冷不思飲食及冷氣攻腹脇疼痛四肢少力口吐酸水喫食無味沉

香湯方

沉香

一兩

白豆蔻

去皮一兩

青橘皮

湯浸去白焙一兩半

高良薑

半兩

桂

去粗皮一兩

栝榔

剉

吳茱萸

湯洗焙乾炒

厚朴

去粗皮生薑汁炙各三分

右八味粗搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候

治胃氣虛冷肌瘦少力不思飲食厚朴丸方

厚朴

去粗皮生薑炙

陳橘皮

湯浸去白焙

訶梨勒

核去

桂

去粗皮

附子

炮裂去

乾薑

炮

白茯苓

去黑皮

甘草

炙各一兩

右八味搗羅為細末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸溫米飲下

治胃氣虛冷不思飲食脇肋脹滿胸膈不快藏府不利烏頭湯方

烏頭

炮裂去

益智

去皮炒

青橘皮

湯浸去白焙一兩半

木香

訶梨勒

去核各半兩

山芋

二兩

粟米

五兩

白鹽

炒一兩

右八味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服食前

治胃氣虛冷臍腹疼痛或滑泄下利不思飲食厚朴丸方

厚朴

去粗皮 洗一兩

乾薑

炮二兩

附子

炮裂去皮 一兩

訶梨勒

煨去核 三分

白朮

剉一兩

右五味搗羅為細末醋煮麵糊和丸如梧桐子大每服二十丸加至三十丸

空心食前米飲下日二

治胃氣虛冷腹脇脹滿疾逆不思飲食順氣湯方

厚朴

去粗皮 姜汁炙

陳橘皮

湯浸去白焙

白朮

剉各一兩

半夏

為末姜汁製 作餅炙半兩

乾薑

炮半兩

甘草

炙一兩

右六味粗搗篩每服三錢匕水一中盞入生薑三片棗一枚擘煎至七分去

滓溫服不計時候

治胃氣虛冷腹脹減食訶梨勒湯方

訶梨勒

五枚炮 去核

大腹

剉五枚

草豆蔻

去皮十枚

甘草

炙

白朮

人參

各半兩

右六味粗搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片棗一枚擘同煎至七分去

滓食前溫服

治胃氣虛冷大便滑泄臍腹多痛葷撥丸方

華橙

高良薑

肉豆蔻

去殼

桂

去粗皮

縮沙

去皮

附子

炮裂去皮臍

白朮

胡椒

訶梨勒

炮去核各一兩

右九味搗羅為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九丸粟米飲下空心食前

治胃中虛冷惡寒灑灑卧而不寐補胃煮散方

細辛

去苗葉一兩半

柏子人

人參

芎藭

剉各一兩

防風

去叉

桂皮

去粗

陳橘皮

湯浸去白焙各半兩

甘草

炮

吳茱萸

漿水浸一宿新水淘焙乾炒各三分

右九味搗羅為細散每服二錢七水七分煎沸通口服

治胃中虛冷霍亂吐瀉煩熱發渴或下利赤白丁香湯方

丁香皮

剉二兩

白朮

剉四兩

甘草

炙一兩

乾薑

炮半兩

枇杷葉

拭去毛二兩

片七

草豆蔻

去皮五枚

右六味粗搗篩每服三錢七水一盞生薑三片同煎至七分去滓食前溫服

治胃冷嘔逆厚朴湯方

厚朴

去粗皮塗生薑汁炙一兩

白朮

桂

去粗皮各三分

桃人

去皮共炙人變炒

丁香

各半兩

右五味擘搗篩每服三錢七水一盞煎至七分入醋數滴去滓熱呷

治胃寒胸膈虛滿面目浮腫飲食不化丁香湯方

丁香

藿香葉

附子

炮裂去皮
各一分 乾薑

炮半

右四味劉碎用水一升煎取五合去滓徐徐呷盡

治五飲酒癖忪悸動氣心下否滿嘔逆吞酸背寒中冷身體寒戰心腹注痛可思飲食腹內虛鳴便往滑利胃虛氣弱心下有冷疾者最宜服餌新法半夏散

方

舊名湯

生薑

切作片子鹽淹一宿焙乾秤十二兩

甘草

八兩炙對

陳麴

二十四兩炒

草豆蔻

去皮三兩

陳橘皮

湯浸去白三兩

丁香

二兩

半夏麴

一兩半

右七味擣羅為散每服三錢匕入鹽少許沸湯點服不計時候

治胃虛冷中脘氣滿不能傳化善飢不能食溫胃煮散方

人參末

錢二

生附子末

半錢

生薑

一分

右三味和勻用水七合煎至二合以雞子一枚取清打轉空心頓服

治胃氣冷不思食人參附子湯方

人參

一兩

附子

炮裂去皮臠一兩

桂

去粗皮一兩

乾薑

炮三分

甘草

炙半

半夏

湯洗七遍焙一兩

枳殼

去瓢殼炒

丁香

陳橘皮

去白炒

白朮

草豆蔻

去皮各一兩

右十一味剉如麻豆每服三錢匕生薑如錢大二片水一盞煎至七分去滓溫服

治胃冷不思食痰逆多吐茯苓湯方

白茯苓

去黑皮一兩

半夏

湯洗七遍焙乾一兩

人參

一兩

陳橘皮

湯去白焙一兩半

丁香

半兩

木香

半兩

白朮

一兩

草豆蔻

去皮二兩

檳榔

剉半兩

桂

去粗皮三錢

厚朴

去粗皮生薑汁炙一兩半

枳殼

去瓢炒半兩

右十二味剉如麻豆大每服三錢匕水一盞煎至七分不拘時去滓溫服
治胃虛冷嘔逆豆蔻湯方

草豆蔻

去皮一兩半

桂

去粗皮

生薑

去皮切

附子

炮裂去皮臍各三分

甘草

炙剉

丁香

各半兩

右六味細剉每服五錢匕水一盞半棗一枚擘破同煎至八分去滓溫服
治胃冷嘔逆氣厥不通方

丁香母

三粒椎碎

陳橘皮

一枚全者湯浸去白焙

右二味用水一盞煎取半盞去滓熱呷

胃實熱

論曰胃氣盛實則壅滯不宣蘊積生熱令人口乾煩渴面目悉黃譫妄狂越身

熱多汗腹脇堅滿大便秘難皆其證也

治胃氣實熱唇焦口乾引飲不止赤芍藥湯方

赤芍藥

生乾地黄

焙各一兩 大黃

甘草

炙各半兩

右四味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服日再

治胃氣實熱口舌乾燥頭痛煩渴黃芩湯方

黃芩

去黑心

此胡

去苗各一兩

葛根

剉

赤芍藥

各三分

甘草

炙半兩

石膏

碎二兩

右六味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候

治胃氣實熱煩躁多渴黃連丸方

黃連

去須

赤茯苓

去黑皮各三分

麥門冬

去心焙一兩

苦參

半兩

右四味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十丸食前臨卧煎竹葉湯下

治胃氣實熱頭痛寒熱狀如溫瘧唇口乾燥黃芩梔子湯方

黃芩

去黑心

梔子人

犀角

鎔

赤茯苓

去黑皮

射干

各一兩

大黃

剉半兩

右六味粗搗篩每服五錢匕水二盞煎至一盞次入生地黄汁半合蜜一匙

攪勻更煎數沸去滓食後溫服

治胃氣實熱唇口乾燥頭昏體倦五心煩熱地骨皮湯方

地骨皮

二兩

防風

去

甘草

炙各一兩

右三味粗搗篩每服三錢匕水一盞半煎至一盞去滓食後溫服

治胃實熱嘔噦吐逆不食頭痛煩渴犀角飲方

犀角

鎊

枇杷葉

炙去毛

葛根

剉

麥門冬

去心

焙各一兩

右四味搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

治胃實熱氣盛消穀善飢頭目昏痛衄血煩渴黃連丸方

黃連

須去

枯樓根

麥門冬

去心

知母

焙

茯神

去木

各一兩

右五味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九丸溫熱水下不拘時候

治胃實熱煩渴咽乾吐逆葛根湯方

葛根

剉十兩

甘草

炙三兩

半夏

二兩

生薑汁半盞漿水半升同煮軟切焙乾

黃連

去須一兩

右四味搗篩每服三錢匕水一盞生薑二片竹筴少許同煎至七分去滓

溫服不拘時候

治胃實熱乾嘔煩悶目黃躁渴前胡湯方

前胡

去芦頭

茅根

剉二兩

麥門冬

去心

甘草

炙各一兩

黃芩

去黑心

半兩

右五味搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

治胃實熱升麻梔子湯方

升麻

劉

梔子人

射干

赤茯苓

去黑皮各三兩

白朮

五兩

芍藥

四兩

右六味咀咀如麻豆大每服五錢匕水一盞煎至八分入地黃汁一合赤蜜一匙更煎一二沸去滓溫服

治胃中實熱吐逆心煩不下食飲薑蜜飲方

生薑

半兩取自然汁

白蜜合

糯米

半合淘淨細研

右三味和勻入新汲水一盞調開分二服不拘時

治胃氣盛實壅澀不宣蘊積為熱口乾煩渴地黃飲方

生地黃汁

生薑汁

藕節汁

生蜜

各二合

右四味調和令勻分作三服不拘時候

治胃府實熱發渴飲水漿不止茯神飲方

茯神

去木一兩

枯樓根

麥門冬

去心焙各二兩半

萎蕤

知母

焙各二兩

右五味搗篩每服先以水三盞煮小麥一合淡竹葉一合十餘沸去滓然後下藥末五錢匕生地黃半分切棗三枚擘破同煎至一盞去滓溫呷

治胃氣實熱苦頭痛汗不出口中乾燥通熱湯方

人參

二兩

白茯苓

去黑皮一兩

甘草

分一

羌胡

去苗一兩

葛根

剉一兩

麻黃

去根節一兩

黃芩

去黑心半兩

石膏

碎三兩

五加皮

剉半兩

右九味粗搗篩每服三錢七水一盞生薑三片煎取七分去滓溫服

食亦

論曰內經曰大腸移熱於胃善食而瘦入謂之食亦胃移熱於膽亦曰食亦夫胃為水穀之海所以化氣味而為榮衛者也胃氣和則食飲有節氣血盛而膚革充盈若乃胃受邪熱消鑠穀氣不能變精血故善食而瘦入也病名食亦言雖能食亦若飢也胃移熱於膽亦曰食亦以膽為陽木熱氣乘之則鑠土而消穀也

治胃中結熱消穀善食不生肌肉參苓丸方

人參

赤茯苓

去黑皮

菖蒲

遠志

去心

地骨皮

牛膝

酒浸切焙各一兩

右六味為細末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸溫米飲下日三不拘時治胃熱善食而瘦龍膽湯方

龍膽

黃連去須

木通劉

苳胡去苗

麥門冬去心焙

人參各一兩

陳橘皮去白焙

黃芩去黑心各半兩

右八味狗撻篩每服三錢匕以水一盞煎取七分去滓溫服食後日二

治胃熱善食不生肌甘露飲方

生乾地黄焙

熟乾地黄焙

天門冬去心焙

麥門冬去心焙

枇杷葉去毛

黃芩去黑心

石斛去根

甘草炙

枳殼去瓢

山茵陳各一兩

右十味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎取七分去滓食後溫服日二

治胃熱消穀善飢不為肌膚沈香湯方

沉香

人參

麥門冬去心

地骨皮

生乾地黄焙

小草

甘草炙各一兩

右七味粗搗篩每服五錢匕水一盞半同煎至八分去滓溫服日三不拘時

治胃熱消穀善飢不生肌肉病名食亦升麻湯方

升麻

梔子人

射干

赤茯苓去黑皮各三兩

芍藥四兩

白朮五兩

生地黃汁

蜜各一升

右八味咬咀六味如麻豆大每服五錢匕以水一盞半煎取一盞去滓下地

黃汁半合再煎二沸次下蜜半匙共煎取一盞溫服老小以意加減

治胃熱善食而瘦病名食亦乾地黃湯方

生乾地黃

麥門冬焙去心

桔樓根各三兩

甘草炙

枳殼去瓢炒

黃芩

去黑心各一兩

右六味粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎取七分去滓溫服日二三

胃反

論曰脾與胃合主腐熟水穀今脾胃氣虛水穀不化與停飲相擊胃中虛脹其氣逆上食久反出故名胃反也其候朝食暮吐暮食早吐寒熱作時心下否結狀如覆杯

治胃反吐逆不止心膈不利飲食減少生薑散方

生薑

切炒三兩

蓬莪茂

剉炒一兩

陳橘皮

湯浸去白炒

甘草

剉炒各二兩

右四味搗羅為散每服一錢匕入鹽少許沸湯點服

治胃反食下便吐人參湯方

人參

澤瀉

甘草炙

桂去粗皮各二兩

陳橘皮

湯浸去白切炒

乾薑

炮各一兩

赤茯苓

去黑皮四兩

青竹茹

三兩

大黃

剉炒二兩

右九味粗搗篩每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓溫服日三夜一
治反胃吐逆虛氣上攻心疼痛多吐酸水藿香丸方

藿香葉

木香

各一兩半

半夏

湯洗去滑二兩

丁香

檳榔

劉各三分

白朮

一兩

華澄茄

紅豆蔻

去皮各半兩

右八味搗羅為末酒煮麵糊和丸梧桐子大每服二十九橘皮湯下不拘時

治胃反惡心粥藥不下鎮脾散方

京三稜

炮一兩半

丁香

三分

右二味搗羅為散每服一錢匕沸湯點不拘時候

治反胃吐食日久不止大腸結燥丹砂丸方

丹砂

研

鉛丹

研

陳橘皮

去白炒各半兩

半夏

湯洗七次去滑焙

厚朴

去粗皮生薑汁炙

麥蘖

炒

陳麴

焙

代赭

煨各一兩

皂莢

去皮子炙取半兩

右九味搗研為末和勻稀糊為丸如梧桐子大每服二十九空心日午卧時

用溫酒下米飲亦得

治胃反嘔吐噦逆鉛丹丸方

黑鉛

鉛汁入紙灰以柳木椎同研成粉羅過一兩

右二味同研極細用米醋一升同入砂石器內熬為膏入乾蒸餅少許搗令熟丸如赤小豆大每服十丸生薑湯或米飲下不拘時候

治胃反不納飲食開胃和氣木香湯方

木香 一分 胡椒 二十粒 糯米 一撮

右三味同炒至米熟將搗篩分作五服每服用水一盞至六分去滓溫服

治胃反及膈氣不下食方

蒼米 或白米遇日西時於日下水微拌濕自心中想日氣如在米中便只日中曬乾紙袋盛掛通風處

右一味每有患者水煎一撮和汁飲之即時便下

治胃反不下食木香湯方

木香 兩 胡椒 一分 高良薑 一分 甘草 兩 蓬莪朮 兩

右五味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓食前溫服

治胃反吐酸水心胸壅悶葶藶丸方

葶藶 木香 乾薑 枳殼 大黃

枳榔 縮沙人 訶梨勒 白茯苓 人參

右十味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸生薑湯下

治多年胃反不止石亭脂丸方

石亭脂

紫貝鉛各二兩

鹽酒五兩

右三味旋燒鉛煎酒中汁滓盡將鉛與石亭脂攪勻炒之或煖起即將銚子水上煖止俟勻熟水浸煖餅丸如梧桐子大每服二十九丸煎石蓮乾棗乾柿乾薑湯下。

治胃虛氣逆食已反出礬石丸方

白礬

鉛丹二兩

石亭脂半兩生為末在後入

右三味先將前二味和研入甘鍋內以炭半秤漸煨令通赤為度駐少火更養一夜取出細研出毒兩日乃入石亭脂同研細以粟米飯和丸如菉豆大每日米飲下十五丸

治胃虛脹其氣上逆食已反出礬石丸方

白礬

三兩燒令汁盡

右一味細研如麴以研飯為丸如梧桐子大每日空心米飲下十五丸
治久患翻胃及小兒驚吐諸吐田李散丸

硫黃

細研半兩

水銀

一分與硫黃再研無星

右二味同研如黑煤色每服三錢匕生薑四兩取汁酒一盞同薑汁煎熟調藥空心服衣被蓋覆當自足指間汗出迺遷徧身汗徹即差常有人病反胃經三年不差消羸殆盡服藥一服汗出皆如膠腥穢不可近當日更不復吐遂差又小兒諸吐用此藥量兒長少服一錢匕至一字匕冷水調下吐立定此散極浮難調須先滴少水以指緩緩研殺稍稍增湯使令調和若傾入湯酒盡浮泛不可服又烏頭煮散茱萸散皆治反胃惟田李散有陰陽理勝於二方今載二方於後但性差熱更量府藏寒溫用之

治胃氣虛冷不能飲食食已即吐酸水茱萸散方

吳茱萸

湯洗七遍炒乾

乾薑

炮裂

右二味等分搗羅為散空心熱酒調下三錢匕

治胃反烏頭煮散方

烏頭

炮裂去皮臍三兩

棟實

一兩半

楸榔

剉

木香

各一兩

右四味搗羅為散每服二錢匕水一盞煎至七分入鹽一捻溫服

治陰陽氣不升降否氣膈氣心痛腹痛咽喉噎悶氣道不勻嘔吐痰沫飲食不下大便秘利不定或裏急後重大腹痛不可忍此藥養氣消痰溫中散滯緩氣