

素問病機下 素問玄機

劉守真醫書六

新刊素問玄機原病式序

河間處士劉完素守真撰

夫醫教者。源自伏羲。流于神農。注于黃帝。行于萬世。合于無窮。本乎大道。法乎自然之理。孔安國序書曰。伏羲。神農。黃帝之書。謂之三墳。言大道也。少昊。顓頊。高辛。唐虞之書。謂之五典。言常道也。蓋五典者。三墳之末也。非無大道。但專明治世之道。三墳者。五典之本也。非無常道。但以大道為體。常道為用。天下之能事畢矣。然而玄機奧妙。聖意幽微。浩浩乎不可測。使之習者。雖聰智明哲之士。亦非輕易可得而悟矣。洎乎周代老子。以精大道。專為道教。由是儒道二門之教著矣。歸其祖。則三墳之教一焉。儒道二教之書。比之三墳之經。則言象義理昭然可據。而各得其一意也。故諸子百家。多為著述。所宗之者。庶博知焉。嗚呼。余之醫家。自黃帝之後。二千五百有餘年。漢末之魏。有南陽太守張機。仲景。恤於生民。多被傷寒之疾。損害橫天。因而輒考古經。以述傷寒卒病方論。一十六卷。使後之學者。有可依據。然雖所論未備諸病。仍為道要。若能以意推之。則思過半矣。且所述者。衆所習者。多故自仲景至今。甫僅千歲。凡著述醫書。過往古者八九倍矣。夫三墳之書者。大聖人之教也。法象天地理。合自然本乎大道。仲景者。亞聖也。雖仲景之書。未備聖人之教。亦幾於聖人文亦玄奧。以致今之學者。尚為難焉。故今人所習。皆近代方論而已。但究其末而不求其本。况仲景之書。復經大醫士叔和撰次遺方。唐開寶中。節度使高繼冲編集進上。雖二公操用心智。自出心意。廣其法術。雜於舊說。亦有可取。其間或失仲景本意。未符古聖之經愈。令後人學之難也。况仲景之世。四升。乃唐宋之一升。四兩為之一兩。向者人能勝毒。及多咬咀湯劑。有異今時之法。故今人未知其然。而妄謂時世之異。以為無用。而多不習焉。唯近世朱奉議。多得其意。遂以本仲景之論。而兼諸書之說。編集作活人書二十卷。其門多其方。眾其言直。其類辯使後學者易為尋核施行。如今之用者多矣。然而其間亦有未合聖人之意者。往

往但相肖而已。由未知陰陽變化之道。所謂水極似金。金極似火。火極似水。水極似土。土極似木者也。故經曰。亢則害。承乃制。謂己亢過極。則反似勝己之化也。俗未之知。認似作是以陽為陰。失其意也。嗟夫。醫之妙用。尚在三墳。觀夫後所著述者。必欲利於後人。非但矜衡而已。皆仁人之心也。非不肖者。所敢當其間。互有得失者。由乎言本求其象。象本求其意。意必合其道。故非聖人而道未全者。或盡其善也。鮮矣。豈欲自涉非道而亂聖經以惑人志哉。自古如祖聖伏羲畫卦。非聖人就能明其意。二萬餘言。至周文王方始立象。演卦而周公述爻。後五百餘年。孔子以作十翼。而易書方完。然後易為推究。所習者衆。而注說者多。其間或所見不同。而互有得失者。未及於聖。竊窺道教。故也。易教體乎五行八卦。儒教存乎三綱五常。醫教要乎五運六氣。其門三。其道一。故相須以用。而無相失。蓋本教一而已矣。若忘其根本。而求其華實之茂者。未之有也。故經曰。夫五運陰陽者。天地之道也。萬物之綱紀。變化之父母。生殺之本始。神明之府也。可不通乎。仙經曰。大道不可以籌算。道不在數。故也可以籌算者。天地之數也。若得天地之數。則大道在其中矣。經曰。天地之至數。始於一。而終於九。數之可十。推之可百。數之可千。推之可萬。萬之不可勝數。然其要一也。又云。知其要者一言而終。不知其要。流散無窮。又云。至數之機。迫迮而微。其來可見。其往可追。敬之者昌。慢之者亡。無道行私。必得天殃。又云。治不法天之紀。地之理。則災害至矣。又云。不知年之所加。氣之興衰。虛實之所起。不可以為工矣。由是觀之。則不知運氣而求醫。無失者鮮矣。今詳內經素問。雖已校正改誤。音釋往往尚有失。古聖之意者。愚俗聞之。未必不曰爾。何人也。敢言古昔聖賢之非。嗟夫。聖人之所為。自然合於規矩。無不中其理者也。雖有賢哲。而不得自然之理。亦豈能盡善而無失乎。況經秦火之殘。文世本稀少。故自仲景之後。有缺。第七一卷。天下至今。無復得其本。然雖存者。布行于世。後之傳寫。鏤板重重。差誤不可勝舉。以其玄奧而俗莫能明。故雖舛訛而孰知之。故近代勃勒孫奇高保衡林億等校正。孫兆改誤。其序有言曰。正謬誤者六千餘字。

增註義者二千餘條。若專執舊本以謂往古聖賢之書而不可改易者，信則信矣，終未免泥於一隅。及夫唐王水次註序云：世本紀繆篇目重疊，前後不備，文義懸隔，施行不易。坡會亦難。歲月既淹，習以成弊，或一篇重出而別立一名，或兩論併合而都為一目。或問答未已而別樹篇題，或脫簡不書而云世缺重合經而冠鍼服併方宜而為放篇隔虛實而為逆從。合經絡而為要論，節皮部而為經絡，退至道以先針。如此之流，不可勝數。又曰：其中簡脫文斷義不相接者，搜求經論有所遷移以補其處，篇目墮缺指事不明者，詳其意趣加字以昭其義。篇論吞併義不相涉，缺漏名目者，區分事類別目以冠篇首。君臣請問，義理乘戾者，考較尊卑增益以光其意。錯簡碎文，前後重疊者，詳其旨趣，削去繁雜以存其要。辭理祕密，難粗論述者，別撰玄珠以陳其道。凡所加字皆朱書其文，使今古必分。字不雜揉，然則豈但僕之言哉？設若後人或怒王水林億之輩，言舊有說謬者，弗去其註而惟攻其經，則未必易知而過其意也。然而王水之註善則善矣，以其仁人之心而未備聖賢之意，故其註或有失者也。由是校正改誤者，往往證當王水之所失，其間不見其失，而不以改證者，不為少矣。雖稱正改誤，而或自失者亦多矣。嗚呼！不唯註未盡善，而王水遷移加減之經，亦有臆說而不合古聖之意者也。雖言凡所加字皆朱書其文，既傳乎世，即世文皆為墨字也。凡所改易之間，或不中其理者，使智哲以理推之，終莫得其真意，豈知未達真理而不識其偽所致也。註皆有舛訛，比之舊者，則亦易為學矣。若非全元起本及王水次註，則林億之輩未必知若是焉。後之知者，多因之也。今非先賢之說，僕且無能知之。蓋因諸舊說而方入其門，耽翫既久而粗見得失，然諸舊失而今有得者，非謂僕之明也。因諸舊說之所得者，以意類推而得其真理，自見其偽亦皆古先聖賢之道也。僕豈生而知之者哉？夫別醫之得失者，但以類推氣造化之理而明可知矣。觀夫世傳運氣之書多矣，蓋舉大綱乃學之門戶，皆歌頌鈴圖而已，終未備其體用，及至有得失而

感人志者也。况非其人。百未得於經之一二。而妄撰運氣之書。傳於世者。是以矜己惑人。而莫能彰驗。致使學人不知其美。俾聖經妙典。日遠日疎。而習之者鮮矣。悲夫。世俗或以謂運氣無徵。而為惑人之妄說者。或但言運氣為大道玄機。若非生而知之。則莫能學之者。由是學者寡而知者鮮。設有攻其本經。而復有註說雕寫之誤也。況乎造化玄奧之理。未有比物立象。以詳說者也。僕雖不敢以其志慕茲道。而究之以久。略得其意。惜乎天下尚有未若僕之知者。據乎所見。而輒伸短識。本子三墳之聖經。兼以衆賢之妙論。編集運氣要妙之說。十萬餘言。九篇三部。勒成一部。命曰內經運氣要旨論。備見聖賢經之用矣。然妙則妙矣。以其妙道。乃為對病臨時處方之法。猶恐後學未精。貴者或難施用。復宗仲景之書。率參聖賢之說。推夫運氣造化自然之理。以集傷寒雜病脉證方論之文。一部三卷。十萬餘言。目曰醫方精要。宣明論。凡有世說之誤者。詳以此證明之。庶令學者真偽自分。而易為得用。且運氣者。得於道同。蓋明大道之一也。觀夫醫者。唯以別陰陽虛實。最為樞要。識病之法。以其病氣歸于五運六氣之化。明可見矣。謹率經之所言。二百餘字。兼以語辭二百七十七言。緒歸五運六氣而已。大凡明病陰陽虛實。無越此法。雖已並載前之二帙。復慮世俗多出妄說。有違古聖之意。今特舉二百七十七字。獨為一本。名曰素問玄機原病。遂以比物立象。詳論天地運氣造化自然之理。二萬餘言。仍以改證世俗謬說。雖不備舉其誤。其意足可明矣。雖未備論諸疾。以此推之。則識病六氣陰陽虛實。幾于備矣。蓋求運氣言象之意。而得其自然神妙之情理。易曰。書不盡言。言不盡意。設卦以盡情偽。繫辭焉以盡其言。變而通之以盡利。鼓之舞之以盡神。老子曰。不出戶。知天下。不窺牖。見天道。其出彌遠。其知彌少。蓋由規矩而取方員也。夫運氣之道者。猶諸此也。嗟夫。僕所述其文者。非但欲以美於己。而非於人。矜於名。而苟於利也。但貴學者。易為曉悟。而行無枉錯耳。如通舉內經運氣要旨論及醫方精要。宣明論者。欲令習者。求其備也。其間或未臻其理者。幸以將來君子。以改正焉。但欲同以宣揚古聖之妙道。而普

救後人之生命爾

欬嗽論第二十一

河間處士 劉完素守真述
明 新安 吳勉學師古校

論曰。欬謂無痰而有聲。肺氣傷而不清也。嗽是無聲而有痰。脾濕動而為痰也。欬嗽謂有痰而有聲。蓋因傷於肺氣。動於脾濕。欬而為嗽也。脾濕者。秋傷於濕。積於脾也。故內經曰。秋傷於濕。冬必欬嗽。大抵素秋之氣宜清。須反動之氣。必上衝而為欬。甚則動於脾濕。發而為痰焉。是知脾無留濕。雖傷肺氣而不為痰也。有痰寒少而熱多。故欬嗽者。非專主於肺而為病。以肺主皮毛。而司於外。故風寒先能傷之也。內經曰。五臟六腑皆能令人欬。非獨肺也。各以其時主之。而受病焉。非其時。各傳而與之也。所病不等。寒暑燥濕風火六氣。皆令人欬嗽。唯濕病痰飲入胃。留之而不行。上入於肺。則為欬嗽。假令濕在於心經。謂之熱痰。濕在肺經。謂之風痰。濕在肺經。謂之氣痰。濕在腎經。謂之寒痰。所治不同。宜隨證而治之。若欬而無痰者。以辛甘潤其肺。故欬嗽者。治痰為先。治痰者。下氣為上。是以南星半夏勝其痰。而欬嗽自愈。枳壳陳皮利其氣。而痰自下。痰而能食者。大承氣湯微下之。少利為度。痰而不能食者。厚朴湯治之。夏月嗽而發熱者。謂之熱痰嗽。小柴胡四兩。加石膏一兩。知母半兩。用之。冬月嗽而發寒。謂之寒嗽。小青龍加杏仁服之。然此為大例。更當隨証隨時加減之量。其虛實。此治法之大體也。

蜜煎生薑湯

蜜煎橘皮湯

燒生薑糊桃

此者皆治無痰而嗽者。當以辛甘潤其肺故也。如但用青陳皮藥。皆當去白。本草云。陳皮味辛理上氣。去痰氣滯塞。青皮味苦理下氣。二味俱用。散三焦之氣也。故聖濟云。陳皮去痰。穰不除即生痰。麻黃發汗。節不去而止汗。

治風痰熱咳嗽其脉弦面青四肢滿悶便溺祕溢心多燥怒水煮金花丸

南星

半夏各一兩
生用

天麻五錢
雄黃三錢

白麵兩
寒水石一兩
燒存性

右為細末滴水為丸每服五七十九至百丸煎漿水沸下藥令沸浮為度濾出淡漿水浸另用生薑湯下或通聖加半夏及局方中川芎丸防風丸皆可用也

小黃丸治熱痰欬嗽脈洪面赤煩熱心痛唇口乾燥多喜笑宜小黃丸

南星湯

半夏一兩
洗各

黃芩一兩
半夏一兩

右為細末生薑汁浸蒸餅為桐子大每服五十九至七十九食後薑湯下及小柴胡湯中加半夏亦可

白术丸治痰濕欬嗽脉緩面黃肢體沉重嗜卧不收腹脹而食不消宜白术丸

南星

半夏各一兩
俱湯洗

白术一兩
半夏一兩

右為細末糊為丸桐子大每服五七十九生薑湯下及局方中防己丸亦可用

玉粉丸治氣痰欬嗽脉澀面白。上喘氣促。洒淅惡寒。愁不樂宜服之。

南星

半夏一兩
俱洗各

官桂去皮一兩

右為細末薄糊為丸如桐子大每服五七十九生薑湯下食後及局方中防己丸亦可玉粉丸加

減在後心下否者加枳實伍錢身熱甚者加黃連五錢體重者加茯苓一兩氣上逆者加苦葶苈五錢喘促者加人參桔梗各五錢浮腫者加郁李仁杏仁各五錢大便秘者加黃連五錢

雙玉散治痰熱而喘痰湧如泉

寒水石

石膏各等分

右為細末煎人參湯調下三錢食後服

治痰千絳湯

半夏二兩
生味

大皂角

去皮子
半兩剉

服二服効。

防風丸。治痰嗽胸中氣不清利者。枳术丸亦妙。

防風解

枳殼瓣兩去皮炒

白术一兩

右細末燒餅為丸。每服五七十丸。生薑湯下。

天麻丸

治風痰立效者不宣服。

天麻一兩

半夏

南星略一錢

雄黃少許

右以白麵二兩滴水為丸。如桐子大。每服五十丸至百丸。煎淡水令沸。下藥煮十餘沸。濾出食前。生薑湯下。

利鬲丸。主胸中不利。痰嗽喘促。利脾胃壅滯。調秘瀉藏。推陳致新。消進飲食。治利鬲氣之勝藥也。

木香半錢

檳榔一錢

人參錢

當歸錢

藿香半錢

大黃酒浸焙一兩

厚朴薑制三兩

枳實炒三錢

甘草三錢

右為細末。滴水和丸。如桐子大。每服三五十丸。食後諸飲皆下。

欬氣丸。治久嗽痰喘。肺氣浮腫。

青皮去白

陳皮去白

檳榔

木香

杏仁去皮

郁李仁去皮

茯苓

澤瀉取頭末

當歸

茂炮

馬兜零

苦亭慈各上三兩

人參

防己各五錢

半夏洗五

草烏一字

桂枝

右為細末。生薑汁麵糊為丸。如梧子大。每服一二十九。加至五七十丸。生薑湯下。食後服。

玉粉丸。治癰結咽喉不利。語音不出。

半夏錢

五

草烏一字

桂枝

右同為末。生薑汁浸蒸餅為丸如雞頭大。每服一丸。至夜含化。多歲不愈者亦効。

枳殼湯治久痰胸鬲不利者。多上焦發熱。

枳殼麵炒去殼。三兩。

桔梗三兩。黃芩一兩。

右同判。每日早用二兩半水三盞。煎至二盞。匀作三服。早時一服。中時一服。臨卧時一服。三日七兩半藥盡。服生半夏湯。

生半夏湯

半夏
遍切作片子。七

右每服秤三錢。水一盞半。入生薑五大片。同煎至一盞。和滓食後服。一日三二服。服三日畢。再服枳术丸。盡其痰為度。論曰。先消胸中氣。後去鬲上痰。再服枳术丸。謂首尾合盡。消其氣。謂令痰不復作也。

清鎮丸治熱嗽。

小柴胡湯內加人參一倍。

青黛
研末

右為細末。麵糊丸如桐子大。每服五十丸。生薑湯下。

半夏丸治因傷風而痰作喘逆。兀兀欲吐。惡心欲倒已吐。加檳榔三錢。

半夏
洗切。兩湯

雄黃
研末

右同為末。生薑汁浸蒸餅為丸桐子大。每服三十丸。生薑湯下。

白术散治夏暑大熱。或醉飲冷痰濕不止。膈不利。

白术

茯苓

半夏
洗

黃芩
分等

右為簾末。每服五錢至七錢。水二盞。入生薑十片。煎至一盞。去滓。調陳皮末一錢。神曲末一錢。食後服。

法曰大熱大飲。蓋酒味熱而引飲冷。冷與熱凝於胸中。不散而成濕。故痰作矣。甚者宜吐之。吐後服五苓甘露勝濕去痰之劑。

白朮湯治痰潮上如湧泉。久不可治者。

白朮

白茯苓

半夏等

右為末。每服半兩。病大者一兩。水二盞。生薑七片。煎至一盞。取清調神。麵末二錢頓服之。病甚者下玉壺丸一百丸。大効。永除根。

天門冬丸治婦人喘。手足煩熱。骨蒸。夜汗。口乾引飲。面目浮腫。

天門冬

叶兩去
稱

麥門冬

八兩

心

生地黃

三斤取汁
膏子

汗

右二味為末。膏子和丸。如梧子大。每服五十丸。煎逍遙散送。逍遙散中去甘草。加人參。或服王氏博濟方中人參荆芥散亦可。如面腫不已。經曰。面腫曰風。故宜汗。麻黃桂枝可發其汗。後服柴胡飲子去大黃。故論曰。治藏者治其俞。治府者治其合。浮腫者治其經。治俞者治其土也。治合者亦治其土也。如兵家圍魏救趙之法也。

虛損論第二十二

論曰。虛損之疾。寒熱因虛而感也。感寒則損陽。陽虛則陰盛。自上而下。治之宜以辛甘淡。過於胃則不可治也。感熱則損陰。陰虛則陽盛。故損自下而上。治之宜以苦酸鹹。過於脾則不可治也。自上而損者。一損於肺。皮聚而毛落。二損於心。血脉虛少。不能榮養藏府。婦人月水不通。三損於胃。飲食不為肌肉。自下而損者。一損於腎。骨痿不能起于床。二損於肝。筋緩不能自收持。三損於脾。飲食不能消。冠論曰。心肺損而色敝。腎肝損而形瘦。穀不能化而脾損。感此病者。皆損之病也。漸漬之深。皆虛勞之疾也。故四君子湯治肺損而皮聚毛落。益氣可也。

白朮

人參

黃耆

茯苓各

右為龜末。每服五六錢。七錢水一盞。煎至七分去滓。食後溫服。
八物湯治心肺虛損。皮聚而毛落。血脉虛損。婦人月水愆期。宜益氣和血。

白朮

人參

黃耆

茯苓

川芎

熟地黃

當歸

芍藥各等分

人參

黃耆

伏神

桂枝

熟地黃

當歸

右龜末服五七錢水一盞。煎至七分去滓。食後溫服。

十全散治心肺損及胃。飲食不為肥膚。宜益氣和血調飲食。

白朮

芍藥

川芎

甘草等分

金剛丸

桂枝

熟地黃

當歸

右為末。加生薑棗同煎水一大盞。藥五錢。煎至七分。食前日三服。

金剛丸治腎損骨痿不能起于床。宜益精。

草薢

杜仲

炒去絲
浸酒

兔絲子

酒浸等分

牛膝丸

酒下

右為細末。酒煮豬腰子為丸。每服五七十九。空心酒下。

牛膝丸治腎肝損骨痿不能起于床。筋緩不能收持。宜益精緩中。

牛膝酒

草薢

杜仲

炒去絲
浸酒

防風

浸酒

兔絲子

酒浸等分

牛膝酒

防風

兔絲子

酒浸等分

白蒺藜

各等分

右細末酒煮豬腰子。搗丸桐子大。空心酒下五七十九。

桂枝

減半

右細末酒煮豬腰子。搗丸桐子大。空心酒下五七十九。

桂枝

減半

防風

兔絲子

酒浸等分

白蒺藜

各等分

右和劑服餌如金剛丸法。腰痛不起者甚効。

胡蘆巴

破故紙

等分

桂餅

牛膝酒

減半

防風

兔絲子

酒浸等分

桂枝

減半

防風

白蒺藜

各等分

此藥養血益腎。

蒼朮一斤米熟地黃一斤

川薑錢一兩夏五味子半

右為細末。棗肉為丸如梧子大。每服一百丸至二百丸。食前水飲下。或酒治血虛又痔甚効。經曰。腎苦燥。急食辛以潤之。開腠理致津液。通氣五味子味酸。故酸以收之。此雖陽盛不燥熱。乃是五藏虛損於內。故可益血收氣也。此藥類象神品藥也。

治陽虛陰盛心肺不足。宜八味丸。若形體瘦弱無力多困。未知陰陽先損。夏月地黃丸。春秋宜腎氣丸。冬月宜八味丸。

消渴論第二十三

論曰。消渴之疾。三焦受病也。有上消中消腎消。上消者上焦受病。又謂之鬲消病也。多飲水而少食。大便如常。或小便清利。知其燥在上焦也。治宜流濕潤燥。中消者胃也。渴而飲食多。小便黃。經曰。熱能消穀。知熱在中。法云宜下之。至不欲飲食則愈。腎消者。病在下焦。初發為膏淋。下如膏油之狀。至病成而面色黧黑。形瘦而耳焦。小便濁而有脂。治法宜養血以肅清。分其清濁而自愈也。法曰。燥上而渴。辛甘而祛。用潤肺故可用蜜煎生薑湯。大器頓之。時時呷之。法云心肺之病莫厭煩而少飲。內經云補上治宜以緩。又曰。辛以潤之。開腠致津液通。則肺氣下流。故氣下火降而燥衰矣。其渴乃止。又經曰。二陽結為消。王注曰。二陽結於胃。及大腸俱熱也。腸胃藏熱。則善消水穀。甘辛降火之劑。黃連末一斤。生地黃自然汁。白蓮花鴉自然汁。牛乳汁各一斤。熬成膏子。黃連末為丸如梧桐子。每服三十丸。少呷溫水送下。日進十服。渴病立止。

治上焦鬲消而不欲多食。小便清利。宜小柴胡湯。或加白虎湯。或錢氏方中地骨皮散。內加芍藥。

黃耆 石膏 黃芩 桔梗之類是也。

人參石膏湯治高消上焦煩渴不欲多食。

人參
人參
人參

石膏一兩

知母錢甘草四錢

右為籠末每服五錢至七錢水煎食後溫服。

順氣散治消中熱在胃而能食小便赤黃微利之為効不可多利服此藥漸漸利之不欲多食則愈。

厚朴一兩薑制大黃四錢枳實二錢炒

右剉每服五錢水煎食遠服。茴香散治腎消病下焦初證小便如膏油。

茴香炒苦練炒

右細末酒調二錢食前服。

八味丸治腎消大病加減法。

本方內倍加山藥外桂附從四時加減假令方內桂附一兩春各用三錢夏用一錢秋用五錢冬全用一兩。

珍珠粉丸治白淫夢泄遺精及滑出而不收。

黃柏一斤於新瓦上燒令通赤為度真蛤粉一斤

右為細末滴水丸如桐子大每服一百丸空心酒下法曰盛陽乘陽故精泄也黃柏降火蛤粉鹹而補腎陰也又治思想無窮所願不得之證。

竹籠散治消渴。

五靈脂黑豆去皮

右等為細末每服三錢冬瓜湯調下無冬瓜苗葉皆可日二服小渴二三服効渴定不可服熱藥。唯服八味丸去附子加五味子。

靈樞脹論云。帝問岐伯。脹形何如。岐伯曰。夫心脹者。煩心氣短。卧不安。肺脹者。虛滿而喘。肝脹者。脇下滿而痛。引少腹。脾脹者。善饑。四肢煩悶。體重不能勝衣。卧不安。腎脹者。引背中央。然腰髀痛。六府脹。胃脹者。腹滿。胃脘痛。鼻聞焦臭。妨于食。大便難。大腸脹者。腸鳴痛而灌濯。冬日重。于寒則飧泄。食不化。小腸脹者。小腹脹滿。引腰而痛。膀胱脹者。少腹氣滿而氣癃。三焦脹者。氣滿于皮膚中。硜硜然而不堅。膽脹者。脇下痛。脹口苦。善太息。又水脹篇云。帝問岐伯。水脹何如。答曰。水始起也。目窠上微腫。如新卧起之狀。其頸脉動。故陰股間寒。足胫脹。腹乃大。其水已成矣。以手按其腹。隨手而起。如裏水之狀。此其候也。帝曰。膿脹何如。岐伯曰。膿者。寒氣客于皮中。皺空空然。不堅。腹身大盡。腫皮厚。按其腹。窅而不起。腹色不變。此其候也。鼓脹何如。答曰。鼓腹身皆大。大與膿脹等也。色蒼黃。腹筋起。此其候也。腸覃何如。答曰。寒氣客于腸外。與衛相搏。氣不得榮。因有所繫癖。而內着惡氣。乃起。瘍肉生。其始大也。大如雞子。稍以益大。至其成。如懷子狀。久者離歲。按之則堅。推之則移。月事不以時下。此其候也。石瘕何如。答曰。石瘕生于胞中。寒氣客于子門。閉塞氣不通。惡血當瀉不瀉。因以留止。日以益大。壯如懷子。月事不時。皆生于女子。可導而下。帝曰。膿脹鼓脹可刺耶。曰。先瀉其脹之血絡。復調其經。刺去其血絡也。

經云平治權衡。去菀陳剉。開鬼門。潔淨府。平治權衡者。察脈之浮沉也。去菀陳剉者。疎濶腸胃也。開鬼門潔淨府者。發汗利小便也。又鼓脹之病。治以雞屎醴。名醫云。其腫有短氣不得卧。為心水。兩脇痛。為肝水。大便鵝溏為肺水。四肢脣腫為脾水。腰痛足冷為腎水。口苦咽乾為胆水。乍虛乍實為大腸水。各隨其經絡分其內外。審其脉證而別之。大有風水。皮水。石水。黃汗歸各藏以論之。風合歸肝。皮合歸肺。黃汗歸脾。石合歸腎。風水脈浮必惡風。皮水脈亦浮。按下沒指。石水脉沉。腹滿不喘。黃汗脉沉遲。發熱而多涎。久而不愈。必致癰膿。水腫脉浮帶數。即是虛寒潛止其間。久必沉伏。沉伏則陽。

虛陰實為水必矣。要知水脉必沉是也。論者脉出者死與病不相應也。諸唇黑則傷肝。缺盆平則傷心。脣出則傷脾。足平則傷腎。背平則傷肺。此五者必不可療也。治法云。腰以上宜發汗。腰以下利小便。錢氏論虛實腹脹實則不因吐瀉。又病之後亦不因下利。脹而喘急悶亂更有痰有熱及有宿食不化而脹者。宜服大黃丸。白餅子。紫霜丸下之。更詳認大小便如俱不通。先利小便。後利大便。虛則久病。吐瀉後其脉微細。肺主目胞。腮虛腫。手足冷。當先服瑞氣丸。後服異功散。及和中丸。益黃散溫其氣。因于氣腫者。橘皮煎丸。因于濕為腫者。煎防己黃耆湯。調五苓散。因于熱為腫者。服八正散。

又一法。燥熱于肺為腫者。乃絕水之源也。當清肺除燥。水自生矣。于破瘻湯中加黃芩。如熱在下焦。陰消使氣不得化者。當益陰則陽氣自化也。黃芩黃連是也。

五脉論五水炙法

青水炙肝井。赤水炙心榮。黃水炙脾俞。白水炙肺經。黑水炙腎人。

婦人蠱脹無脉。燒青丸。五皮散亦是。

論諸蠱脹者。有二脹。若從胃。則旦食而不能夜食。旦則不脹。夜則脹是也。若水腫証濡泄者。是也。內經曰。蠱脹之病。治以雞屎醴酒調服。水脹之病。當開鬼門。潔淨府也。

白茯苓湯名變水

白茯苓

澤瀉各二兩

郁李仁二錢

右㕮咀作一服。水一椀煎至一半。常服無時。從少至多服。或煎得澄入生薑自然汁在內。和麵或做粥飲作常食。五七日後覺脹下再中。以白术散。

白术

澤瀉各半兩

右為細末。每服三錢。煎茯苓湯調下。或丸亦可。服三十九。

末治之藥。服黃耆芍藥建中之類。以調養之。平復後。忌房室。猪魚鹽麵等物。
治水氣。盡張潔淨。府楮實子丸。

楮實子一斗水二斗
教成膏子

白丁香一兩半

茯苓三兩去皮

右三味為細末。用楮實膏為丸。如桐子大。不計丸數。從少至多。服至小便清利。及腹脹減為度。後服中治藥。末治藥。調養藥。疏啓其中。忌甘苦酸補。其下五補七宣。

取穴法

治腫。治其經。治金火也。井榮俞經陰經金也。金木水火陽經火也。

治腫水香散

木香

大戟

白牽牛分等

右為細末。每用三錢。猪腰子一對。批開。捺藥在內燒熟。空心服之。如左則塌左。右則塌右。如水腫不能全去。於腹上塗甘遂末。在遠臍滿腹。少飲甘草水。其腫便去也。

治水腫

螵蛸去頭尾。與葡萄心同研。露七日曝乾。為細末。淡酒調下。暑月濕用尤佳。

又方

棗一斗。鍋內入水。上有四指。用大戟并根苗。蓋之遍盆。合之煮熟。為度。去大戟不用。旋旋喫無時。盡棗決愈神効。

眼目論第二十五

論曰。眼之為病。在府則為表。當除風散熱。在藏則為裏。宜養血安神。暴發者為表而易治。久病者在裏而難愈。除風散熱者。鴻青丸。王之養血安神者。定志丸。婦人熟乾地黃丸是也。或有體肥氣盛。風熱上行。日昏澁者。槐子散主之。此由胸中氣濁上行也。重則為痰厥。亦能損目。常使胸中氣清。無此。