

名醫類案

第二十四



續名醫類案卷二十四

錢塘魏之琇編集

海昌王士雄孟英
定州楊照藜素園
同校

妊娠

王顯字世榮文昭皇后之懷世宗也夢爲日所逐化爲龍而
遶后后寤而驚悸遂成心疾文明太后敕召徐謩及王顯
等爲后診脈徐謩言是微風入臟宜進湯藥及加鍼灸顯
診云按三部非有心疾將是懷孕生男之象後果如言

汪石山診一婦形長色紫妊五月矣求脈之以別男女汪曰



脈右大於左。脈訣云：左大爲男，右大爲女。今脈右大，當是女耶？彼則喜曰：我男胎矣。往歲有妊時，尊甫先生診之，亦謂右脈浮大，當是女孕。後生男，今妊又得是脈，可知爲男矣。後果生男。汪曰：脈書但道其常，莫能盡其變。此醫所以貴乎望聞問切也。

張子和診一婦人，年四十餘，得孕，自以爲年衰多病，故病復作。醫亦不察，加燔針於兩臍旁，又以毒藥攻磨，轉致腹痛，食減形羸，已在牀枕。張診其脈曰：六脈皆平，惟右尺洪大有力，此孕脈也。兼擇食爲孕無疑。左右皆笑之。不數月生一女。兩目下各有燔針痕，幾喪其明。凡治病婦，當先問孕。

不可倉卒。

王翦之妻病臍下積塊，擇食面黃肌瘦而不月，或謂之乾血。

氣治之無效，張視之曰：「孕也。」其人不信，再三求治，乃與之。

平藥以應其意。妙否則別求人治或致誤事終不肯下毒藥。凡攻病之藥皆曰毒

藥後月到果胎也。問何以別之？曰：尺脈洪大也。亦有尺脈微弱而孕

者見求子門素問陰陽別論。所謂陰搏陽別之脈。汪石山案

崑山周知縣景星家一婦病腹中塊痛，崑科診之曰：「氣積。」投

以流氣破積之劑，又命人以湯餅軸戛之不效。聞有巫峯

神廟頗靈，往問之云：「此胎氣也，勿用藥。信之，彼果生一男。」

南京戶部主事韓文光妻病腹中作痛，按之若有物在臍

左右者適浙中一名醫至京請診之云是癰疽服三稜蓬
朮之劑旬餘覺愈長亦以其不效乃止後數月生二男此
皆有命而然可不慎哉客中閒集

程氏光治一有胎婦兒啼腹中皆不治乃傾豆於地令婦紙
頭拾之兒啼止江西通志

萬密齋曰兒啼腹中此症臨月將產婦人有之師母錢氏嘉
靖戊子有娠九個月兒在腹中哭錢大驚令作男子拜而
止之過二十日生師兄邦孝師母以下似萬門人語邦孝似萬之子

李有懷妾高氏懷妊二十七月舉子後亦長成雲間襍誌

朱丹溪曰懷孕受物乃一臟之虛假如肝臟虛其肝氣止能

養胎無餘用也不能榮肝肝虛故愛酸物

治法

邢氏亡其名朱勝非婦偶小疾命視之曰小疾爾不藥亦愈然不宜孕孕必死其家以爲狂言後一歲朱婦得子其家方有抱孫之喜彌月婦疾作急召之堅不肯來曰去歲已言之無可療之理越宿而婦卒人共奇之

錢塘縣志

薛立齋治一妊婦胎六月體倦嬾食面黃晡熱而胎不長因勞欲墜此脾氣不足也用八珍湯倍參朮茯苓三十餘劑胃漸健胎安而長矣

一妊婦因怒寒熱往來內熱晡熱脇痛嘔吐胎至八月而不長此因肝脾鬱怒所致用六君加柴胡山梔枳殼紫蘇桔

梗病愈而胎亦長矣

胎動

薛立齋治鴻臚張淑人痢疾後胎動心神不安肢體殊倦用
八珍散二十餘劑漸愈。因勞加煩熱頭痛以大劑補中益
氣湯加蔓荊子治之。熱痛頓止。仍用前散又五十餘劑而
安。其後生產甚易。

一妊婦八月胎欲墜如產。卧久稍安。日晡益甚。此氣血虛弱。
用補中益氣湯加茯苓半夏隨愈。更以八珍湯調理而安。
一妊婦小便作痛。其胎不安。氣攻左右。或時逆上。小便不利。



用小柴胡湯加青皮山梔清肝火而愈。後因怒小腹脹滿，小便不利，水道重墜，胎仍不安。此亦肝木熾盛所致。用龍胆瀉肝湯一劑，諸症頓愈。乃以四君子加柴胡升麻以培脾土而安。

孫文垣治張溪亭子室，娠已七月，夢見亡過祖母，揮拳在背，打一下，即覺胎動不安，血已下，大小便皆急，腰與小腹脹痛者五日。診之兩寸俱短弱，此上焦元氣大虛。當驟補之。人參阿膠黃耆白朮各二錢，當歸白芍條芩杜仲各一錢，砂仁香附各五分，苧根嫩皮三錢，葱白六錢，一劑而血止。再劑諸症悉除。四劑後減去葱白苧根調理旬日，足月產。



一。女。

吳孚先治孫氏妊婦六月作瀉欲小產診之曰此水胎也四君子加炮薑製附十餘劑而安。

陳三農治一孕婦腰痛甚如欲小產用杜仲一兩薑汁拌炒續斷一兩二味爲丸白湯送下遂安。

薛立齋治一婦人胎下墜或動身體倦飲食少思此脾氣虛弱用補中益氣湯倍白朮加蘓梗三十餘劑而安產後眩暈胸滿咳嗽用四物加茯苓半夏桔梗而愈。

一妊婦內熱晡熱或兼寒熱食飲少思其胎或下墜或上攻此肝經血虛而火動耳先用加味道遙散數劑次用六君



子加柴胡。枳殼各數劑而愈。

一婦人每受胎。三四月作痛欲墜。此爲胎痛。用當歸二錢。熟地黃三錢而愈。

張飛疇曰。古人用條芩安胎。惟形瘦血熱。營行過疾。胎常上逼者相宜。若形盛氣衰。胎常下墜。非人參舉之。不安。形實氣盛。胎常不運者。非香砂耗之。不安。血虛火旺。腹常急痛者。非歸芍養之。不安。體肥痰盛。嘔逆眩運者。非二陳豁之。不安。此皆治母氣之偏盛也。若有外邪。仍宜表散伏邪。時氣尤宜急下。惟忌芒硝。切不可犯。

雄按條芩。但宜於血熱之人。若血虛有火者。余以竹茹

桑葉絲瓜絡爲君。而輔以他藥極有效。蓋三物皆養血清熱。而息內風也。物之堅強莫如竹。皮肉之緊貼亦莫如竹實。爲諸血證之要藥。觀其塞舟不漏可知矣。桑葉蠶食之以成絲。絲瓜絡筋膜聯絡。質韌子堅。具包羅維繫之形。且皆色青入肝。肝虛而胎系不牢者。勝於四物阿膠多矣。

子懸

此證卽胎上逼也。附子湍。

嚴氏紫蘇飲。許叔微云。治懷胎近上。脹滿疼痛。謂之子懸。陳良甫曰。姙至四五月。君相二火養胎。熱氣逆上。胎湊心胸。

腹滿痞悶。用此加黃芩、山梔之類。一方無川芎，名七寶散。

紫蘇一兩，腹皮、人參、川芎、橘皮、白芍、當歸各三分，甘草一

分，剉分三服。水一盞，生薑四片，葱白煎去渣服。汪詠菴曰：此方每服

止用蘇葉一錢，當歸七分，腹皮以下皆五分，甘草二分，無葱白。

沈堯封治郁姓婦懷妊九月，偶因勞動，遂覺腹痛，胎漸升至

胸中，氣塞不通，忽然狂叫咬人，數人扶持不住，卽子懸之

最重也。用旋覆代赭湯去參、棗，連灌兩劑，胎墮得生。又一

婦證亦如之，服前藥胎墮而死。

又陸檢修正室，子上撞心，江穩婆教磨代赭汁服，遂產兩

子。一子在上橫於心下，一子撞着上子，故經一晝夜不止。



撞心得不死。產下遂安。

陳良甫曰：一婦孕七個月，遠歸，忽然胎上衝作痛，坐臥不安。兩醫治之無效，遂云胎已死矣。用蓖麻子研爛，和麝香貼臍中以下之。命在呼吸。陳診之，兩尺脈絕。他脈和平。陳問二醫作何證治之。荅云：死胎。陳問何以知之。曰：兩尺沈絕。以此知之。陳曰：此說出何書。二醫無以荅。陳曰：此子懸也。若是胎死，却有辨處。面赤舌青，子死母活；面青舌赤吐沫，母死子活；唇舌俱青，母子俱死。今面不赤，舌不青，其子未死。是胎上逼，宜以紫蘇飲連進，至十服而胎近下矣。

雄按：成中荊人，妊八月而患欬，礙眠鼻衄如射，面

浮指腫。諸藥不應。余思素屬陰虛。內火自感。胎因火動。上奏心胸。肺受其衝。欬逆乃作。是不必治其嗽。仍當以子懸治之。用七寶散去參。芍生薑。爲其胸滿而內熱也。加生石膏。以清陽明之火。熟地以攝根蒂之陰。投之即安。今年冬亦以八月之妊。而悲哀勞瘁之餘。胎氣衝逆。眩暈嗽痰。腕脹便澹。舌黃口渴。予蠲飲六神湯。去膽星。茯苓。加枳實蘇葉大腹皮。以理氣開鬱。黃芩梔子竹茹。以清熱安胎。一劑知。二劑已。凡子懸證。因於痰滯者。余每用此法。無不應如桴鼓。

薛立齋治一妊婦。每因恚怒。其胎上逼。左關脈弦洪。乃肝火

內動用小柴胡加茯苓枳殼山梔而愈。但體倦不食。用
君子加枳殼柴胡山梔而瘥。

孫文垣治費少垣乃眷。妊已九月。痰多喘嗽。胎氣上逆。眼撐
不能起。兩太陽微疼。此子懸症。兼痰火也。以大紫蘇飲爲
主。纔服一帖。卽不上逆。胸膈頓寬。惟喘咳不止。與七製化
痰丸而安。紫蘇飲。紫蘇。腹皮。川芎。白芍。陳皮。當歸。生薑。
人參。甘草。葱白。

陸祖愚治梅養中子婦。孕七月。其夫出外經商。患胎上衝心。
不時昏暈。或與紫蘇安胎飲。數劑不效。脈之寸大於關。關
大於尺。俱帶弦數。此血虛極而火上炎之故也。用清氣養

榮湯磨沉香四分牛黃二分煎就徐徐灌之不終劑而甦矣。

萬密齋治徐太和之妻娠八月得子滿病或作子懸胎不放腹滿轉甚胎墜下迫玉門大張胞形外露但仰臥不能坐其脈兩手俱堅大搏指謂曰病無害乃雙胎也胎肥氣弱不能束約故下墜耳用束胎利氣主之加人參一錢升麻炒三分服三劑胎復上而安後生一男一女。

楊乘六治我修姪婦妊八月一日胎忽上搶塞至心口喘滿不思食自汗悶絕僵臥口噤目直視面色不赤舌色不青按其兩手脈息尙有急取丸子兩許滾水研化灌之灌至

兩酒杯。胸口鬆動。口開睛轉。手足運動而甦。問何藥。乃爾神效。曰。八味丸也。又問此何病而用此丸。曰。此子懸也。由下元虛冷中無火以養嬰兒。故上奏以就心火之溫。如入睡被中。足冷則上縮也。後用耆朮芎歸煎送前丸。服至兩月而產。沈堯封云。此是百中僅一非實。見虛寒脈證。熱藥不可嘗試。

子腫

一孕婦遍身皆腫。或以爲白火疸。或以爲鼓脹。治俱不效。產科郭大生曰。此名琉璃胎。至將產一月前。必飲食大進。產卽腫消矣。後果然。彼蓋閼歷多故耳。然病之所以然。究未