

醫學從眾錄

會文堂書局
印行 卷六

羌活 桂枝 秦艽 防風 續斷 附子 歸身 金毛狗脊 虎骨 杜仲 晚蠶沙 二
川芎 八分 桑枝 三錢 生薑 一兩 大棗 二枚 陳酒 二斤 浸二日夜 煎服

集賢癰毒膏

川烏 草烏 南星 半夏 當歸 紅花 獨活 羌活 大黃 桃仁 山甲 肉桂 白芷 硃

砂 二兩 硫磺 半兩 松香 一兩 生薑汁 一盞 麻油 一盞 竹汁 一盞 右收煎好加乳香沒藥血竭胡

椒樟腦細辛牙皂末 若加商陸根鳳仙開楊花鮮烟葉鮮蘇鮮希欬等汁更妙

蒼朮黑豆飲 治痺方

茅山蒼朮 洗淨泥垢先以米泔水浸三宿用蜜酒浸一宿去皮用黑豆一層拌蒼朮一層蒸二次再用蜜酒蒸一

次同和在砂鍋內熬濃汁去渣隔湯燉滴水成珠為度每膏一和煉蜜白湯調服 一老人專用此方壽至八十

餘身輕健甚於少年

七製松香膏 治濕毒第一神方 松香 第一次薑汁煮第二次蔥汁煮第三次白鳳仙汁煮第四次燒酒煮第五

次開楊花汁煮第六次商陸根汁煮第七次紅醋煮

桐油 三斤 川烏 草烏 蒼朮 官桂 乾薑 草麻 以上各 血餘 八兩 右八味共入桐油熬至藥枯髮

消滴水成珠慮去渣入牛皮膏四兩烱化用前製過松香漸漸收之雖火加樟腦一兩好麝香三錢厚紙攤之貼患

處神效

虎骨木通湯 治一切麻木痺證風濕節

虎骨 木通 煎湯頓頻多吃即愈

紅花白芷防風飲 治風濕四肢疼痛

紅花 白芷

防風 五

威靈仙 三錢

酒煎服取汗三服全愈

山甲白薇澤蘭飲

治前風俗名鬼打及頭項手足筋骨疼痛半身不遂等疾照方一服即愈

山甲

炒研

白薇

二錢

澤蘭

三錢

照分

量行酒煎服

硫磺數痛膏

治痛風

風節

四肢疼痛

用醋磨

硫磺數

之或用葱白杆

搗炒熱

熨之

鶴膝風

喻嘉言曰鶴膝風者即風寒濕之痺於膝也如膝骨日大上下肌肉日枯且未可治其膝先養其氣血使肌肉滋榮後治其膝可也此與治偏枯之證大同小異急瀝其未枯者使氣血流行而復榮倘不知此但服麻黃防風等散風之藥鮮不全枯者故治鶴膝風而急攻其痺必並其足痿而不用矣

大防風湯

治邪氣是三陰腿膝疼痛及痢後腰膝痛鶴膝風附骨疽症但赤熱嫩腫者禁用

四君子湯去茯苓加

肉桂附子黃耆牛膝杜仲熟地白芍川芎羌活防風

五積散

治少陰傷寒及外感風寒胸滿嘔吐腹痛寒熱往來脚氣冷秘寒疝寒癰等證

按鶴膝

多是虛寒脚氣多是濕熱一補一攻治法各判然脚氣有腎氣素虛氣喘小腹痺者腎氣丸必不

不可緩鶴膝赤熱嫩腫者二妙散桂枝芍藥知母湯亦必需此活法也

二妙散 治濕熱痿證

黃柏

蒼朮

水煎服

三氣湯

桂枝芍藥知母湯

三錢

見明膏

專治風寒濕骨節痛歷節痛風痿痺麻木不仁鶴膝風偏頭風濕肩風等證並治跌撲閃倒等傷陰證

無名腫毒已破者勿貼小兒孕婦勿貼

活短頭髮用仁二兩 大黃 靈仙 雄鼠黃各一兩 川烏 草烏 劉寄奴各八兩 土鱉大者三 羌活

獨活 紅花 當歸 蛇床子 蒼朮 生南星 生半夏 白芥子 桃仁各一兩 右十八味俱切碎

樟冰一兩 甘松 山柰 花椒 猪牙皂 山甲各一兩 華散 浸藥以上各三錢不必細切 乳香 白

芷路五 右十味研極細末 鮮烟葉汁一斤 鮮商陸根汁六兩 鮮開楊花汁三兩 鮮

艾葉汁半斤 白鳳仙花汁三兩 生薑汁半斤 韭汁半斤 葱汁半斤 大蒜汁

四兩 用足秤秤麻油三斤四兩先將頭髮入油熬半炷香再將前藥

渣入前松香熬化再將絲綿濾去湯再熬至油面起核桃花紋先加入極細蜜

斤投此二味時務須慢慢洒入不可太多太驟以滴水成珠離火待溫然後移入細

枝不佳手攪青布攤貼每張淨藥重四錢既時加肉桂末五錢細辛末二錢

脚氣

東垣云脚氣實由水濕然有二焉南方卑濕清濕氣虛則疾起於下此是外感北方常食糟乳又飲酒太過脾胃有傷

不能運化水濕下流此內而外者也 脚氣有乾濕不同如兩脛腫大者濕脚氣是為癰疽不宜驟補宜雞鳴散疎

通其下不使其壅若癰疽成者宜去惡血然後服藥如兩脛不腫或頑癢或癰急或緩緩名乾脚氣 物湯加牛

膝木瓜蒼朮黃柏肉桂澤瀉之類主之二證雖不宜驟補而三陰受病上氣喘急及上入少腹不仁急宜八味丸補火

以利水外以礬石一兩醋一斗五升煎三五沸浸之丹溪以白芥子白芷等分為末薑汁調敷之 脚氣證小腹頑

頑痺不仁不過三五日即令嘔吐名脚氣入心死證 治脚氣入心仲景用腎氣丸通膀胱之氣安其腎水不使攻心

巢氏用風引湯取石性易於下達勝其濕熱不使攻心二方皆為救危之神劑一治腎氣之虛一治熱濕之盛宜識證

擇用之

診法

脈浮弦起於風濡弱起於濕洪數起於熱遲澀起於寒沉而伏毒在筋骨也指下澀澀不調毒在血分也夏暑脚膝冷痛其脈陽濡陰弱濕溫也脚氣多從暑濕得之

論冷熱不同

問曰何故得者有冷有熱答曰足有三陰三陽寒中三陽所患必冷暑中三陰所患必熱故有表裏冷熱冷熱不同熱者療以涼藥冷者療以熱藥以意消息之脾受陽毒即熱頑腎受陰濕即寒痺

論腫不腫

凡有人久患脚氣不自知別於後因他病發動療之得差後直患嘔吐而復脚弱余為診之乃告為脚氣病者曰我平生不患脚腫何因名為脚氣不肯服湯藥醫以為石發狐疑之間不過一旬而死故脚氣不得拘定以腫為候有腫者亦有不腫者其以小腹頑痺不仁者脚多不腫小腹頑後不過三五日即令人嘔吐者名脚氣入心如此者死在旦夕凡患脚氣到心難治以其腎水剋心火故也

脚氣腫滿

病源此由風濕毒氣搏於腎經腎主水今為邪所搏則腎氣不能宣通水液不傳於小腸致水氣擁溢腑臟浸漬膚膚故腫滿也

千金翼溫腎湯主腰脊脚浮腫不遂方

茯苓

乾薑

澤瀉

附子

桂心

三兩

右四味切以水六升煮取二升分三服

又療脚氣初發從足起至膝腫腰脊痠者方

烏牛尿一服一升日二服腫消止痠痠者二分尿一分牛乳合煮乳結乃服之又方用生豬肝一具細切以酒

盤食之今書若不盡者分再食之

崔氏 療脚氣遍身腫方

大豆二大升

桑白皮一握

檳榔十四枚

茯苓二兩

右四味和老酒二升煎服

療脚氣滿小便少者方

檳榔四十枚

大豆三升

桑白一升

水煎服

徐王和實散宜春秋服消腫利小便兼補療風虛冷服不飽食方

枳實半斤

桂心一尺

茯苓五兩

白朮五兩

右四味為散酒服方寸匕日三服

手脚酸痛兼微腫方

烏麻五升

右一味以酒一升漬一宿隨多少飲之

唐侍中

療苦脚氣攻心此方正散腫氣極驗

檳榔七枚

生薑二兩

橘皮

吳萸

紫蘇

木瓜一兩

以水三升煎服

脚氣上氣入腹腫方

野椒根一升

酒二升投安瓶中泥頭塘火燒得一沸然後溫服

常山甘草湯方

常山三兩

甘草一兩

苦寒熱日三服

寒甚陰傷者腎氣衰微者

鹿茸

淮山藥

石棗三兩

地黃

黃耆

茯苓

丹皮二兩

川附半斤

澤瀉半兩

水煎服

千金蠶引湯

療兩脚痠痺腫或不仁尚急出不得行癰腫方

麻黃二兩 吳萸 秦艽 桂心 人參 經辛 乾薑 防己 川芎 甘草 附子一兩 石膏二兩 杏

仁十枚 白朮三兩 茯苓二兩 生薑 桑枝各一 風仙二兩 右諸味杵末用麻油五斤將藥浸入油內

春五夏三秋七冬六候日數已足入潔淨大鍋內慢火熬至藥枯浮起為度佳火片時用布袋濾渣將油稱量每油

一斤對定黃丹六兩用桃柳枝不時攪之以黑如漆亮如鏡為度滴入水內成珠用布攤貼隨時貼此膏更用藥

風引湯鈔觀 雞鳴散方見

治腳氣第一品藥不問男女可服如感風濕流注脚痛不可忍筋脈腫者並宜服之加鹿茸者其效如神

醫學從眾錄卷八

婦人雜病方

烏骨雞丸治婦人經結不舒蒸熱欬嗽月事不調或久閉不行或倒經血溢於上或產後褥勞或崩淋不止及帶

下赤白淫諸證兼療男子斷喪太早勞嗽吐紅成虛損者

烏骨白絲毛雞一隻男婦老幼皆宜 五味二兩 熟地黃四兩如血熱加 右二味

入雞腹內用陳酒量便各二碗水數碗砂鍋中煮者旋添原燂汁盡全下五藥末搗爛焙乾骨用酥炙共為細末

綿黃耆酒拌炒 於潛木酒上蒸九 白茯苓去皮 當歸身酒洗 白芍藥酒炒各 五味預為粗末同雞肉

搗焙共為細末入下諸藥

人參三兩或五兩 牡丹皮酒洗 川芎酒洗 右三味各為細末和前藥中另用乾山藥六兩打糊象

手丸成晒乾勿令破罐收貯清晨人參或沸湯送下三錢臥時酒再服二錢大便壅塞者煨黃耆為丸亦可 應證加

入溫涼調氣等藥 雞屬翼補肝尤妙在烏骨蓋雞翼歸坎乙癸同源兼滋衝任也

四烏鯁骨一鹿茸丸治氣竭肝傷血枯婦人血枯經閉丈夫陰痿精傷 按此方以蒐血之品為補血之用

乾血勞證以此方為上劑全用治五勞虛極肌肉甲錯尚有乾血用大黃黃芩力實本於此 雀卵功專燥腎和氣

雀卵者搗可代雞卵及肝亦可代雞屬異而肝主血也

北黃龍牡榴補散

治血崩

大生地炒

龍骨

牡蠣

石榴皮

烏梅肉

陳棕皮

百草霜

京墨

右研極細末用淮山五錢研末醋水打糊為丸分作七日服內加人參三錢尤效或用人參湯下

百草血餘棕灰散

治血崩

陳棕灰

百草霜

頭髮灰

共為細末每服一錢陳酒下

棉花子散

治血崩不止

陳棕

棉花子

二味燒灰存性研細末每服一錢五分陳酒送下

韭汁童便湯

治月水逆行上行口鼻搗韭汁以童便沖溫服

髮灰藕汁飲

治血淋痛脹甚者髮灰藕汁調服

屬香琥珀丸

治經閉

上藥

血珀末

麝香

酒打和為丸每服三分

艾葉後冬牛角散

治女子帶下虛脫證極效

艾葉粉

白後冬

赤石脂

牡蠣

烏梅肉

牛角

共為末好米醋一杯

拌煎藥晒乾再研末打糊為丸每服三錢

白鶴血竭飲

治乾血勞證方此證過三年者不治

白鶴子

去毛肝腸淨入血竭

一兩

一兩

一兩

一兩

一兩

一兩

一兩

血即行如心中慌亂者食白煮肉一塊即止

雞子黃丹飲 治孕婦下痢

雞子黃丹一破一孔如指大以銀匙攪勻加入黃丹三錢用飲封口放在飯鍋上蒸熟食之

安胎方 治胎動不安或腹痛或腰酸或頭暈或眼花或口乾或舌燥或手足心熱或胎前產後諸症最妙是月亦可服

人參 三錢 白朮 三錢 黃芩 三錢 甘草 三錢 川芎 八分 砂仁 三錢

熟地 三錢 白芍 三錢 茯苓 三錢 麥冬 三錢 肉桂 五分 丁香 五分 砂仁 三錢

三錢以酒一盞

熟地黃散 治胎漏以炒熟地黃散磨末每服三四錢加砂仁少許調服

皮硝湯 治死胎不下

皮硝 三錢 北蒼 三錢 寒月如製附子 五分 酒半杯每使一杯煎二三沸溫服

牛膝整子湯 治胎衣不下

牛膝 三錢 整子 五分 水煎服

大麥芽散 治產後腹脹閉結胸悶氣結坐臥不安大麥芽 一升 水三升煎至一升調人參末五錢

山查湯 治產後血暈乃惡血及肺結喘欬死蘇木 一兩 水三升煎至一升調人參末五錢

非菜間鼻湯 治產後血暈非菜切入有嘴瓶內將醋三碗煎滾入瓶內將瓶嘴塞產婦鼻孔即醒

澤蘭洗方 治產後陰腫澤蘭葉煎湯洗即收

猪脚湯 治婦人吹乳不通猪脚爪一個兔毫頭一個并煮食之一日即通乳無子者人食之亦有乳

綠瓜子散 治乳不通綠瓜子連子燒存性燒酒下 一二錢被蓋取汗即愈

蟹殼散 治乳巖此證失因乳中一粒大如豆漸漸大如雞蛋七八年後方破爛一破則不可治矣宜急服此藥用生

蟹殼數十枚放砂鍋內焙焦為末每服二錢好酒調下須日日服不可間斷

青皮散 治乳癰初起

青皮^{土蘇} 山田^妙 白芷 甘草 貝母^{婦人} 共為細末溫酒調服

鯽魚數乳膏 治乳癰乳痛

活鯽魚一個 鮮山藥^{一斤} 全搗敷上以紙蓋之

南星半夏散 治吹爛乳癰

南星 半夏 皂角^{去皮} 五倍子^炒 各等分研極細末米醋調敷

乳豆湯 治乳癰

乳香 防風 知母 陳皮 木通 香附^炒 沒藥 川芎 甘草 當歸 貝母^{婦人} 沒仁 銀花

瓜蒌仁^{路二} 橘葉^{二十片} 水酒各半煎服後服四五服必愈

蟬蟬餅方 治乳癰用大蟬蟬一個去皮淨入半夏^{五錢} 麝香^{五錢} 共打爛為一大餅敷患處用帛縛之約三時許解去其

其效如神

貝母白芷內消湯 內消乳癰方 大貝母 白芷 各等分為末每服二錢白酒下有熱加白蘇散若有孕婦忌用

白芷

銀蘇散 治乳癰癰潰爛者方可服神效

雄雞黃^{三錢} 土棟樹子^{三錢} 露蜂房^{三錢} 俱煨存性為細末分作三服酒下間兩日服一服

痛止濃毒散飲奇效

雄黃麝散 治婦人陰中突出如蛇或雞冠等樣者

雄黃一錢 冰片二錢 輕粉一錢 麝香一錢 俱為末和勻再研細收貯先用

芎歸湯煎洗隨後擦藥早晚兩次甚效漸收

芎歸湯

川芎 當歸 白芷 甘草 膽草 各等 每服用五錢煎湯洗患處擦藥

必消散 治婦人乳腫不論內外吹取五穀大楊樹上木耳菌拭淨淨瓦上炙焦存性為細末每服三錢砂糖調陳酒

送下即消

豬肝條方 治婦人陰戶内生瘡疼痛難堪用豬肝切成條於香油中微湯過後蘸臘川椒末搽入戶內引蛆蟲候一

時辰取出再換二三條即愈

合蚌散 治婦人陰戶内生瘡作痒用活蚌剖開將蚌肉半個手掣對陰戶一夜次日又用一個全安

蛇床洗方 治女人陰痒用蛇床子煎湯洗之立愈

當歸散 瘰而有火胎不安宜此杜娘常服即易產胎中疾苦產後百病去之

白朮散 肥白有寒胎不安者此能養胎

竹葉湯 治產後中風病癱發熱面正赤喘而頭痛

甘麥大麥湯 治婦人臟燥悲傷欲哭

四物湯 治婦人百病

米魚膠糯米散 治婦人白帶

米魚膠 糯米 研細 拌好開水冲服

猪肚胡椒湯 治婦人經寒往來時有痛猪肚一個洗淨胡椒八兩裝入肚內炖爛食

傷寒附法 太醫院使錢編輯

傷寒傳變大法已詳傷寒論註及心法要訣中矣然近世治四時傷寒者咸用河間兩解等法每多神效誠治斯證之捷法也今復採雙解散防風通聖散諸經驗名方編為歌訣俾後之學者知所變通庶幾於傷寒一證經權常變有所遵循而無遺法矣

雙解散完素解和初法

雙解散聖合六一四時溫熱傷寒兩許為劑發重汗下兼行表裏宜強者加倍弱減半不解連進自然汗若因汗少麻倍大便鞭硝黃加倍添 名曰雙解散者以其能發表攻裏即防風通聖散六一散二方合劑也河間製此解利四時冬溫春溫夏熱秋燥者至令傷寒凡邪在三陽表裏不解者以兩許為劑如蔥薑湯煎服之候汗下兼行表裏解形氣強者兩許為劑形氣弱者五錢為劑若初服因汗少不解則為表實倍加麻仁以汗之因便鞭不解則為裏實倍加硝黃以下之連進二三服必令 出下利而解也今人不知其妙以河間過用寒涼仲景傷寒初無下法畫而不用真可惜也不知其法神捷莫不學取效從無寒中痞結之變即有一二不解者亦未盡法之善則必已傷陽弱故不解也防風通聖散詳在後

河間解法

汗下已通仍不解者四不傳已傳經內熱者 葛根湯用白虎解表清有表熱煩柴葛解表實大熱三黃湯煎尿赤涼天水胃實不便大柴胡 服雙解散汗下已通而仍不解者皆因汗之不做或已傳經治之不及也若表已解而有微熱煩渴者用桂苓甘露飲以和太陽之裏若內熱太甚大熱大渴者用白虎湯合黃連解毒湯以清陽明之裏若表未解又傳陽明身熱而煩用 葛根湯以解兩陽之邪若表實無汗大熱而煩用三黃石膏湯以表清裏

之熱者更有熱尿赤而澀者用涼膈散合天水散以清和之若胃中潮熱不大便有微表者用柴胡湯下之無表者三承氣湯下之桂苓甘露飲白虎湯大柴胡湯三承氣湯已詳傷寒要訣六一散涼膈散詳在雜病要訣

防風通聖散

防風通聖治風熱鬱在三焦表裏中氣血不宜經絡壅滯梔子薄荷歸芍硝黃芍木青滑石麻黃桔梗與防利利減硝黃梔子自汗麻去桂枝增 此方治一切風火之邪散於三焦表裏經絡氣血不得宣通初感發熱頭初感發熱頭痛膚癢經斑黃抽搐煩渴不眠便秘尿澀皆可服之功效甚奇用之自知其妙也

柴葛解肌湯

四時合病在三陽柴葛解肌柴葛黃白芷桔梗芍藥利減石膏嘔半羌 此方陶華所製以代葛根湯

凡四時太陽陽明少陽合病輕證均宜以此湯增減治之增減者謂如無太陽證者減羌活無少陽證者減柴胡也即柴胡葛根羌活白芷桔梗赤芍石膏黃芩甘草也下利減石膏以避裏虛也嘔加半夏薑以降裏逆也

黃連解毒湯 梔子金花湯 三黃石膏湯

陽毒熱極疹斑嘔煩渴呻吟語狂下後便秘熱不已連合梔子解毒湯裏實便鞭常攻下梔子金花加大黃石膏麻黃豆豉下利除黃入葛根 陽毒熱極等證或下後便秘熱不已宜黃連解毒湯即黃連黃芩黃蘗梔子也若裏實常攻下便秘者宜加大黃名梔子金花湯若表裏無汗當發汗者且加石膏麻黃淡豆豉白芍三黃石膏湯下利者減石膏加葛根避裏不實也

消毒犀角飲

消毒犀角表疹斑毒壅咽喉腫痲痺犀角生芩荆防草熱盛加薄荷連 消毒犀角飲即消毒飲之防風荆芥牛蒡子甘草加犀角也熱盛加連翹薄荷黃芩黃連也

桂枝白虎湯

風溫虛熱汗出多難任衣可奈何須是舒睡而燥渴方宜桂枝虎合 風溫初起脈浮有力汗少壯熱宜於麻黃湯
湯若脈虛身熱汗多難用麻黃湯合與桂枝白虎人參湯如不舒睡口中和而不嘔不渴身熱汗多脈浮盛者乃亡
陽之說非風溫也即桂枝白虎加人參湯亦可用也

瀉心導赤各半湯

越經無證如醉熱脈和導赤各半湯連梔子神寒麥知滑犀草黑梔薑 越經病名也無證謂無表裏證脈和而身
熱不解形如醉人者是越經證也宜瀉心導赤各半湯治之即黃連黃芩梔子茯苓人參麥冬知母滑石犀角甘草
燈心生薑大棗也

大羌活湯

兩感傷寒病二經大羌活湯草川芎二防二朮二活細生地苓連知母同 兩感傷寒病名也二經謂一日太陽少陰
二日陽明太陰三日少陽厥陰同病也張潔古製大羌活湯治之即甘草川芎防風防己蒼朮白朮羌活獨活細辛
生薑黃芩黃連知母也詳在傷寒要訣

還陽散 黑奴丸

陰毒還陽散黃耆退陰地烏乾薑均陽毒黑奴丸小麥煎今麻硝黃釜煙膠 還陽散即石硫黃末每服二錢新汲水調
下良久寒熱不出再服之汗出愈還陰散即炮燻色川烏微炒乾薑黃芩各分爲末每服一錢鹽湯滾數沸服四服不渴
連服三次即溫熱服若吐冷服亦可黑奴丸即小麥成黑疽者名曰小麥奴黃芩麻黃仁硝大黃釜底煤灶突烟梁
上塵也爲末蜜丸重四錢新汲水下服後若渴飲冷水者令逆意飲之須臾自覺震振汗出腹响微利而解也若不
渴者恐是陰極似陽服之反爲害耳

九味羌活湯

九味羌活即中和四時不正氣為病潔古製此代麻桂羌活防蒼細蒼生地草苓喘加杏仁無汗加麻有桂多胸滿去地加枳桔煩渴加石膏自汗此湯即中和湯張潔古製此以代麻黃桂枝二湯即羌活防風蒼木細辛白芷川芎生地甘草黃芩也喘加杏仁無汗加麻黃有汗加桂枝胸膈滿悶去生地加枳殼桔梗快膈氣也煩渴引飲加知母石膏氣自汗也

十神湯

十神外感寒氣病功在溫經利氣殊升葛芩麻甘芍黃芩附片陳蘇此方即升麻葛根川芎麻黃甘草芍藥香附白芷陳皮蘇葉生薑蔥白也能外發寒邪內舒氣故曰寒氣病較之他劑有溫經利氣之功殊也

人參敗毒散 荆防敗毒散 倉庫散

人參敗毒虛感冒發散時毒疹痢良藥各枳桔芩草共柴前薄荷獨羌時毒減參加翹芩血風時疹入荆防表熱唯加蒼木溫熱各連實硝黃人參敗毒散治氣虛感冒時氣之病即枳殼桔梗川芎茯苓人參甘草柴胡前薄荷獨活羌活也時毒謂受四時不正之氣氣腫兩腮兩頰或咽喉腫痛依本方減人參知母麥冬連翹治之時毒謂初病即有之疹血風謂遍身發疹之疾俱依本方減人參加荆芥防風白芷各別方敗毒散之類也

五積散

內傷生冷外感風寒積于胃中故取桂枳桔歸身芍藥正加附逐逐寒腹痛嘔逆黃芩入有汗除肝桂枝湯加參木陳枳桔婦人經痛又醋煎五積散即蒼木陳皮厚朴甘草半夏茯苓麻黃白桂枳殼桔梗當歸川芎白芍乾薑白芷也表重用桂枝寒肢冷加附子腹滿區逆加吳萸有汗除去麻黃加桂枝枳殼加人參白朮除去枳桔婦人經痛

升麻葛根湯

升葛芍藥表陽明下利斑疹兩收功麻黃太陽無汗入柴令同病少陽經 升麻葛根白芍甘草即升麻葛根湯也陽明邪表不解或數下利及斑疹不透者均宜主之若兼太陽無汗之表證入麻黃若兼少陽口苦且脈寒熱往來半表半裏之證加柴胡黃芩也

加艾葉醋煎服之

一二聖救苦丹

初起時疫溫熱病救苦丹生牛俱全熟蜜百發而百中大黃皂角水為丸 此丹即大黃四兩皂角二兩為末水為丸也每服三錢無根水下弱者老者幼者量減服之此藥施治於初起時疫傷寒溫病熱病熱厥形氣俱實者百發百中服後或汗或吐或下三法俱全其病立解

溫膽湯

傷寒病後津液乾虛煩燥渴不成眠乃是竹葉石膏除痰緩餘熱此方失口舌嘔逆煩躁半苓橘草枳竹前氣虛加參渴去半再加麥粉熟苓連 傷寒病後煩渴虛煩乃竹葉石膏湯證非溫膽湯證詳在傷寒要訣若少陽膽經餘熱則口苦嘔煩驚悸是溫膽證也即半夏茯苓橘皮枳實竹茹也形氣俱虛或因汗吐下後及氣虛者均加人參渴去半夏加麥冬花粉以生津也有熱加黃芩黃連以清熱也

傷寒附法補

錢院使主河間兩解之法利於實熱之病余又繪景岳兩託之法利於虛寒之病正法之外得此兩法治傷寒無餘

編矣

發表無汗病為逆須重陰陽施補益陽虛為逆散如神小建中湯生津復東垣變用益氣湯只緣既能與勞役又有無