

印 5

444

# 梅氏驗方新編

第四集

天虛我生重刊

|                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 催<br>生<br>前<br>陰 | 臨<br>產<br>乳<br>症 | 小<br>產<br>雜<br>治 | 安<br>胎<br>暈<br>厥 | 胎<br>前<br>血<br>塊 | 種<br>子<br>產<br>後 | 調<br>經<br>脈<br>訣 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|



天虛科生重刊

(第四集)

梅氏驗方新編

西湖伊蘭題



中華民國二十三年十月十日重刊初版三千部 計共七集定價三元二角  
 中華民國二十六年八月八日重刊再版二千部 減收每部二元批發七折

梅氏驗方新編

第四集 定價六角

原刊者 梅啓

照氏

重刊者 天虛我生

置版者 利用造紙廠

在無錫惠商橋普濟堂對面電話三五〇

發行者 家庭工業社

在上海南京路望平街口電話九四〇一四至一五

贈送物品 如用此書 最有實益 蓋於平時 必不購買 此種書籍 得此可以 有備無患 不啻千金 肘後方也

階板印刷不論多寡均按頁數統計每二面連紙印訂三厘底面雙算不滿千部者概加一厘單印一集亦可



南京中醫藥大學圖書館版權所有

梅氏驗方新編卷之四 原卷二十

天虛我生重刊

婦科調經門

●行經前 其症血來如胆水五心作熱腰痛并小腹痛面黃色不思飲食乃氣血虛

先退其熱然後調經次月血勝而愈先用黃芩散治之（黃芩散方）黃芩六分川芎八分

當歸 白芍 蒼朮各一錢 甘草三分 知母五分 花粉五分 水煎溫服後用調經丸（調經

丸方）三棱 莪朮 當歸 白芍 生地 熟地各五錢 元胡索 茯苓各一錢 川芎

小茴香 烏藥 大茴香各三錢 砂仁五錢 香附一兩一錢 米糊丸菜豆大不拘時酒服

●行經後 其症經來如漏水頭昏目暗小腹乍痛兼白帶咽中臭如魚腥惡心吐逆

用理經四物湯後用補內當歸丸（理經四物湯）當歸貳錢 川芎八分 生地三錢 柴胡十

分 白朮炒 元胡醋炒 香附各一錢 五分 白芍酒炒一錢 貳分 黃芩酒炒三棱各一錢 水煎臨


臥服（補內當歸丸）當歸 續斷 白芷 阿膠 厚朴 茯苓 菴蓉 蒲黃炒 黑莢

肉各一兩 川芎五錢 熟地一兩五錢 甘草 乾薑各五錢 附子二錢 蜜丸空心溫酒下七八

十粒次月即愈

●經或前或後 論其症因脾土不勝不思飲食由此血衰宜補脾則血旺氣勻自然

應期宜服紫金丸紫（金丸）陳皮五錢 良姜 莪朮各八錢 檳榔 砂仁 紅花各六錢



枳殼 烏藥各八錢 三棱一兩 米糊丸米湯送下八十粒

●經血虛發熱

論其症因婦人性急或行經時房事觸傷腎中結壹塊如雞子大在

左右兩脅月水不行變成五心煩熱頭痛目暗咳嗽生痰若半年壹載不醫肉瘦便泄則難

治矣宜先止熱用逍遙散（逍遙散）當歸 白朮 白芍 川芎 柴胡 花粉各八分

黃芩六分 薄荷四分 地骨皮 石蓮肉各一錢 胆草五分水煎空心服止嗽用紫菀湯（紫

菀湯）杏仁去皮尖一錢五分 阿膠炒研八分煎好入藥白桑皮蜜炙知母炒川貝去心枳

實各一錢 五味五分 桔梗 紫苑 蘇子各八分 款冬花六分水煎臨臥服

●經閉發熱

論其症因行經時及產後食生冷水果血見水則滯故也初起一二月

作寒作熱五心煩燥脾土勝自然經水流通若半年不治變成骨蒸子午面熱肌肉消瘦泄

瀉不止急宜治之病倘重甚急用鴉片三厘調甘草湯送下有起死回生之妙宜服逍遙散

紫苑湯方見上列

●行經氣血作痛

論其症經來一半血未曾盡腹中作痛或變發潮熱或有不熟須

破其餘血熱止痛安宜用紅花散（紅花散）枳殼六分 紅花一錢炒牛膝 當歸 蘇木

赤芍 三棱 莪朮各八分 川芎五分水煎空心服

●經來不止

經來不止有半月之久乃血妄行問其婦曾吃椒薑食物過度否是熱

症宜用金拘散（金拘散）續斷 阿膠炒地榆 當歸 白芷各一錢 黃芩 川芎 芍各八分 熟地二錢 水煎空心服

●經來吊陰痛不可忍 此症兩條筋從陰吊起至乳上疼痛身上發熱宜用川棟湯

貳劑而愈 川棟湯（川棟子）猪苓 澤瀉各八分 麻黃六分 木香三分 小茴香 大茴

香 白朮 烏藥 乳香 元胡各一錢 檳榔八分 薑三片 葱一根 水煎對火服發汗即愈

●經來未盡潮熱氣痛 此症經來壹半覺口渴小腸痛此因傷食生冷血滯不行有

餘血在內不可用補宜用莪朮散熱去經盡痛止（莪朮散）莪朮 三錢 紅花 牛膝

蘇子各一錢 水煎空心服

●經盡作痛 此症手足麻痺乃腹中虛冷氣血衰乏用人參四物湯治之（人參四

物湯）人參 白芍各一錢 當歸二錢 川芎八分 薑三片 棗三個 水煎服即愈

●經來遍身浮腫 此因脾土虛弱不能充變而為腫宜用（木香調胃散）木香

甘草 乾薑各三分 莪朮 木通 山查 大腹皮各八分 砂仁 蒼朮各一錢六分 陳皮

紅花各五分 香附 車前各一錢 草薢三分 水煎空心服

●經來泄瀉 若經動之時五更泄瀉如兒尿此乃腎虛不必治脾用調中湯進三五

劑（調中湯）人參 白朮各八分 五味子 甘草各三分 乾薑五分 生薑三片 水煎服

●八味逍遙散 凡婦人血弱陰虛榮衛不和痰涎潮熱肢體羸瘦或由怒氣傷肝血

少目暗骨蒸勞熱咳嗽血虛勞倦五心煩熱肢體疼痛頭昏心悸頰赤口燥咽乾便澀發熱

盜汗減食嗜臥血熱相搏月水不調臍腹脹痛寒熱如瘧等症均效 當歸 酒芍 焦朮

去蘆 白茯苓去皮 柴胡 炒梔仁 炙草 丹皮各壹錢 煨姜薄荷引水煎服

●栢子仁丸 治經行腹止血少神衰或憂思傷心心傷則不能生血血少則肝無所

養故經閉 栢子仁去油 牛膝酒炒 卷栢各五錢 澤蘭 續斷各貳兩 熟地壹兩

共研末蜜為丸米湯送下

●芎歸六君子湯 治經水後期其來濇少形體肥盛乃因氣虛而痰滯於經絡用此

方服之 人參 川芎 焦白朮 茯苓 陳皮各壹錢 當歸 製半夏各錢半 炙草

五分 姜引水煎服

●連附四物湯 治經水過期紫黑成塊紫血熱也黑熱甚也過期而成塊氣滯也或

風冷乘之若淡白者虛也如豆汁如屋漏水混濁者濕痰也此方皆可用之 川芎壹錢

黃連五分 當歸 白芍 熟地 製香附各貳錢 水煎服

●烏梅丸 治經來嘔吐痰膈柱住米穀不能下胃先用烏梅丸次用九仙奪命散

木香 雄黃各五錢 草薺一個 乳香 沒藥各壹錢共研末用烏梅肉搗為丸如彈子

大每早含化壹丸化痰涎後再用九仙奪命散 豆蔻 厚朴 茯苓 枳殼 木香 山查 陳皮 蒼朮各壹錢 草菓壹個 共研末姜湯調服

●茯苓湯

治經來咳嗽咽中出血乃肺金枯燥先用茯苓湯退其嗽 茯苓 川芎

蘇葉

前胡

製半夏

桔梗

枳實

陳皮

乾姜

桑皮各六分

人參五分

甘草

草叁分

姜引水煎空心服後再用雞蘇丸除其根

蘿蔔子九錢

貝母四兩

共研末

蜜為丸每早空心白湯送下五十丸

●固經丸

治血熱崩漏經行不止及紫黑成塊用之

炙龜板四兩

酒芍

酒炒

黃栢

酒黃芩各叁兩

香附子童便對酒製

炒樗皮各壹兩五錢

共研末酒糊為丸

酒送下

●加減補中益氣湯

治崩漏身熱自汗氣短倦怠懶食由勞傷所致

人參

焦朮

各壹錢

黃芪貳錢

當歸

酒芍各壹錢五分

柴胡

升麻各七分

陳皮

黑梔仁

各八分

炙草五分

姜棗引水煎服

●正氣天香散

治氣滯經阻氣上湊心心胸攻築脅肋刺痛月水不調

製香附八

錢 烏藥

陳皮

蘇葉各壹錢

乾姜五分共研末開水調服

●抑氣散

治氣勝於血變生諸症頭暈膈滿

製香附四兩

陳皮貳兩

茯苓壹

兩 炙草五錢 共研細末每日叁錢用水煎服

●龍骨散 治經來臭如夏月之腐乃血弱身衰新舊血不接則臭譬如溝渠枯涸天

久無雨則臭 龍骨 鰈鮓 牡蠣 生地各壹兩 當歸 川芎 酒芍 白茯苓各八

錢 黃芩六錢 共研末蜜為丸如桐子大每早酒送下壹百丸再服湯藥方 當歸 三

稜 義朮 赤芍 丹皮 焦朮 製香附 黃芩 陳皮 木通各八分 姜引水煎服

●十灰散 治血崩初起 綿絹各壹圍 阿膠五錢 側柏葉 白茅根 棕櫚

艾 百草霜 苧麻根 頭髮各壹錢 各燒灰存性研細末另用 丹皮 茜根 大蓳

小蓳各壹錢同藕煎湯調前十灰散冲服 若小腹痛用加味四物湯 當歸 川芎

烏藥 元胡索各壹錢 白芍 小茴各八分 熟地貳錢 姜棗引水煎空心服 若久

崩者乃虛也用雞子湯 取雞肚內蛋壹副 抱小雞未出壳的蛋叁個 葱叁根 姜壹

兩共搗爛用麻油炒焦冲酒去渣取酒服

### 種子門

●種子丹治男子陽事不舉不能堅久精薄無子並治婦人下元虛弱不能受孕服此

丹自能受孕又能安胎 生地 酒洗擇頂大枝頭 熟地 擇頂大枝頭者用無灰酒九蒸九晒 天冬、

去心 麥冬、去心各三兩 黃栢十二兩勻分作四分酒浸一分人乳浸一分童便浸一分鹽水浸一分各浸一

宿俱炒褐色 鹿茸一對重五六兩者

以上藥味俱忌鐵器為末煉蜜丸桐子大空心鹽湯或酒送服八十丸 鹿茸須擇形如  
茄子色如瑪瑙者看紫潤圓短者為上破之如朽木者良毛瘦枯縐尖長生歧者為下太  
嫩者血氣未足無力酥塗灼去毛微炙用不塗酥則傷茸但不可炙焦有傷氣血之性亦  
有用酒炙者炙後去頂骨用茸 鹿茸不可嗅嗅之有蟲恐入鼻顙 鹿茸麋茸罕能辨  
別大抵其質粗壯腦骨堅厚毛蒼蠶而雜白毛者為麋茸其形差瘦腦骨差薄毛黃澤而  
無白者為鹿茸鹿茸補腎脈之正陽麋茸補腎脈陰中之陽不可不辨

●種子奇方

此藥艱於子者服至百日後擇婦人單歲雙月雙歲單月及經後陽日

子時與婦人交即能受孕兼胎固子壽且久服鬚髮不白顏色如童

當歸分作四分以童便乳

汁酒醋各浸一分浸一宿各晒乾用魚膠各一觔

生地如當歸治法

枸杞

沙苑蒺藜

茯苓各八

兩 人參四兩

右末煉蜜為丸桐子大每服八九十丸空心滾酒吞之

●坎離丸

烏鬚黑髮壯筋骨大有補益精壯則婦人感而受孕其子必壽 黑豆不

拘多少用桑椹汁浸透蒸熟再浸再蒸共五遍

右為末另用紅棗量足配豆未成丸之數蒸熟去皮

核搗如泥和黑豆末為丸或印成餅隨便食

●延嗣酒

大有補益早晚男婦各隨量飲三五杯婦人經不對者自正經正者即受

胎矣 生地酒洗 熟地九蒸九晒 天冬去心 麥冬去心各四兩 仙靈脾八兩飯上蒸

當歸貳兩酒洗 枸杞一兩酒浸 俱切碎絹袋盛入大罈酒內重湯煑自卯至酉為度埋

土內七日取起用

●補益大豆方 此方秘傳固精補腎健脾降火烏鬚黑髮延年服之既久與婦人交

感有孕其胎自固而子多壽 大黑豆三升 何首烏 四兩選大而赤者 茯苓三兩 青鹽

八錢 甘草一兩 剉為片先晚以磁鉢壹箇盛豆入水八碗用絹包藥置內次日以砂鍋

內煑候水乾為度去藥不用取豆略晒用磁瓶收貯每早晚白滾湯不時服

●山精壽子丸 此丸能延己壽而生子又壽無論有病者宜服即無病服之猶妙凡

壯年之男子 種玉無成幼歲之婦從不受孕或受胎而中懷墮落或得正產而又生女匪

男或生而不育或育而夭殤即苟延性命難免多疾病者此皆由正陽不足之故均宜服此

丸 山藥貳兩五錢用心結實者有蛀者勿用如脾虛易泄瀉者可加多用 黃精五兩貳錢取正者另杵膏待用

如能九蒸九晒乾杵末用更好 黑棗七兩五錢擇肥大者去皮核及腐爛者另杵膏待用 懷牛膝一兩五錢

去蘆淨酒拌蒸或觀何首烏蒸晒乾用或竟以牛膝易石斛亦可然須加倍用石斛生六安山中形如蚱蟻臂味甘體

結方真如係孕婦忌用牛膝竟以石斛三兩代之 大何首烏 貳兩五錢或三兩亦可用黑豆湯軟木棒打碎置瓦器

中底注黑豆湯務以豆湯拌溼蒸一炷線香時候冷晒俟水乾又拌蒸如是九次夏月一日三四回蒸晒可也晒極



乾秤準 川杜仲 二兩炒發取淨未秤準

川續斷

二兩酒潤剉淨肉剉晒乾

大熟地

四兩黃熟者氣味

皆失不堪用必須九蒸九晒為妙如陰虛之人可用六兩草覆盆子三兩五錢俗名拍盤葉又名麥泡葉蔓生藤葉

有刺葉面青背白有齒尖開紫花結子聚成覆盆樣子端有芒先綠後黃老熟時紅紫味甘酸可生食四五月熟取七

八分熟者去蒂以酒拌焙乾妍末用（陽萎者多用）有一種木覆盆乃樹上結者只解酒毒不補陽勿用又有一種

蓬萊名稻黃莓其莖粗高結子大八九月熟色紫黑感秋陰所成者亦補陰虛陽虛不可用也又有一種蛇莓蔓生

草藤葉無葉而白毛結子紅三四月熟味淡除解胃熱外餘不堪用沙苑蒺藜二兩五錢其形如豬腰子半截半

大嗅味似菜豆炒用如肝虛滑精者多用川巴戟天二兩酒浸去骨蒸熟晒乾用如相火不足者多加用肉苁蓉

二兩酒洗去泥甲但不可過洗盡滑膩恐傷去肉隔紙烘乾再稱準分兩遠志二兩甘草湯浸去骨仍以甘草湯拌

炒乾用取淨肉秤準兔絲子四兩擇色黑而大者去淨以布袋盛之洗至水清以瓦器蒸開肚皮杵爛做餅晒乾

稱用白茯苓二兩選結白者出六安山中或雲南者佳各處市買切片多有連膜者非為末水漂其膜不能去然

遇水力已減矣或用雲南整塊茯苓自去膜用不令見水蓋不切為片則膜易去山茱肉二兩去核取淨肉準酒

蒸杵爛晒乾如精滑者多用經行多或淋瀝不斷者多用如肝氣抑結者少用遠五味子二兩肝氣抑結肺有熱

者少用甘州枸杞五兩去梗蒂淨右藥共十八味除精棗貳膏餘皆共為細末徐徐上於精棗

膏內杵和極勻加煉蜜為丸小豆大每早空心百沸淡鹽湯順下叁肆錢久服愈好

高益謙曰補陽而專事參附著硫輩驟補其火不惟壯火食氣難免陽長陰消陰不敵陽

而能壽能子又難此方藥性不寒不熱類多平和補陽不致陰消久服長年無疾效過多人筆難罄書相按節慾勝於服藥只用一味獨睡丸可矣

婦科胎前門

●胎前保護法

一婦人懷胎全賴血以養之氣以護之宜時常行動不可過於安逸使其氣血周流胞胎活動自然無病倘若久坐久臥血凝氣滯致多難產常見田家勞苦之婦其產必易此明證也

一宜少食煎炙厚味以及牛羊驢犬蟹鯨諸毒野獸並姜椒辛辣熱毒發物惟紅苋菜馬齒莧最能墮胎切不可食常見槽糠之婦胎前既無胎動不安之虞而臨產從不見有難產之患此明效也

一宜禁止淫慾懷妊兩月即宜分牀不共夫寢所以保養胎氣不獨臨產快利生子無胎毒不生瘡癤且多聰明壽考而善墮胎者更宜戒之試看牛馬犬豕一受孕後絕不交合從無墮落難產之患人畜不同理則一也

一宜戒暴怒口不可出惡言手不可用鞭撻惱怒最傷氣血不能養胎以致易於小產且怒氣入胎生子必多痼疾是以妊娠總宜心性平和可保胎安無病而生子亦多溫厚



一宜少服藥餌妊婦無病不必服藥恐不免顧彼失此之弊卽或胎動必須按照古方平穩之藥斟酌加減服之切不可誤聽無知婦女妄用方藥若亂投安胎破氣開膈之劑為害不小

一忌酒醉無論藥酒燒酒妊娠所當禁戒酒醉心神昏亂以致胎動不安

一忌負重登高負重則氣滯血凝登高則氣搖血動傷胎最易不僅有慮傾跌之患

一忌洗浴凡妊娠將近臨月不可洗頭不可浴身不可濯足最宜嚴戒關係非小

●胎前總論 凡孕婦脾胃健旺氣血充足則胎安產順不必用藥調理惟稟不足而

氣血衰脾胃弱而勞役過致諸症百出不得不資藥力矣昔丹溪先生定補母安胎之方以蘇補氣血為主以順氣清涼為佐參朮黃芩為安胎之聖藥芎歸熟地為補血之良劑加以蘇陳等味定為常服主方至胎成六月茯苓性降不宜多用黃芪肥胎不可常加香附雖快氣疏肝過則耗氣無補砂仁能止嘔定痛多亦動血行胎此誠先賢之法戒後學之準繩也而猶以為未備因分晰胎前諸症擬成數十餘方以便臨期酌用

●胎前症治

●惡阻 凡妊婦壹貳月惡阻嘔逆煩悶嗜臥卽俗所謂病兒也此由婦人本原虛弱

平時喜怒不節寒暑不調中脘宿有停痰積飲受孕經閉飲食相搏氣不宣通以致心下煩

悶頭眩眼花四肢倦怠聞食即吐喜酸嗜鮮多臥少起甚至嘔逆不食法當順氣理血豁痰導水而諸症自除以加味參橘飲治之或半夏茯苓湯及苦柚單方亦效

●加味參橘飲 人參一錢 白朮二錢 砂仁三分 厚朴一錢 橘紅四分 當歸一錢 香附五分 甘草三分 姜三片 竹茹一丸 若無力服參去之亦可 壹方加

半夏麴八分 (半夏茯苓湯) 治妊娠脾胃虛弱飲食不化嘔吐不止 半夏姜汁炒黃 陳皮 砂仁各一錢 茯苓二錢 炙草五分 用姜棗烏梅引水煎服壹貳劑 苦柚單

方 治妊娠惡阻嘔吐不食頭暈不敢行步 苦柚皮不拘多少煎濃湯飲數杯即愈吐甚 兌生姜汁服

胎動不安 凡妊娠二三月胎動不安者蓋因子宮久虛氣血兩弱不能攝元養胎

致令不安欲墮急服安胎飲以保之若先經墮過者可先服大造丸繼服杜仲丸庶無半產

之患 湯氏云半產多在三五七個月如前次在幾個月墮者後必如期復然故當追算前在三

個月墮者須於未墮半月前先服清熱養氣固胎元之藥數劑以補其虛五月七月墮者

亦俱於未墮半月前預先服藥方保平安此據孕後夾熱者而言蓋三五七係陽月緣火

能銷鑠故也

●安胎飲 人參壹錢虛者倍用 當歸貳錢 熟地叁錢 條芩壹錢 川芎七分

白朮貳錢 陳皮四分 紫蘇四分 甘草四分 元棗貳枚 如虛肥人陳皮去白加

川連五分 脾胃澹瀉加連子十粒 砂仁五分 川連炒五分 去熟地黃芩 怒而多

瀉加木香叁分 渴加麥冬貳錢 怔忡驚悸加棗仁貳錢 益智仁壹錢 龍眼肉十個

●大造丸 杞子壹兩 人參壹兩五錢 當歸貳兩 麥冬壹兩叁錢 天冬壹兩

益智壹兩 茯苓貳兩 五味五錢 熟地姜炒貳兩 川膝五錢 山藥八錢 兔絲

子鹽水炒 四兩 川柏鹽水炒 共為末蜜煉丸如桐子大白湯送下五十丸

●安胎萬全飲 如脾胃氣弱不能管束其胎血弱不能滋養其胎不以日月多少而

常墮者此湯主之更兼服杜仲丸胡連丸佳 人參 白朮土炒當歸身酒洗生地 條芩

微炒陳皮 白芍藥酒炒各壹錢 砂仁帶殼搥碎炙草各五分 薑叁片 棗貳枚水煎服（杜仲

丸見一原卷九婦科胎前門

●胡連丸 安胎聖藥與杜仲丸同日服 條芩四兩沉水者 白朮土炒蓮肉去心各貳兩

砂仁微炒炙草各壹兩 共為末山藥五兩 作糊為丸如菜豆大米飲下五十丸

●黑白安胎散 治胎動不安 白朮土炒懷熟地黃九蒸九晒各一兩 水煎服 此方

妙在用白朮以利腰臍熟地以固根本藥品少而用專所以取效神也 白朮用五錢亦可

●加味四物湯

治因房事過度觸動胎氣不安者

歸身酒洗

熟地

阿膠蛤粉炒珠

各一錢

砂仁炒

炙草各五分

竹茹一團

水煎調男子視襠布燒灰一錢

服更禁房事

●四物湯

治七情觸動胎氣不安者以四物為主按證加入各藥

生地酒浸

歸身

酒洗

白芍藥

酒炒各一錢

川芎八分

此四物湯本方薑棗引水煎食前溫服

如因怒傷肝者

加炒黃芩一錢五分

人參柴胡甘草各一錢

因憂悲傷肺者

加炒黃芩炒阿膠蘇葉各一錢

五味子十五粒

炙草五分

因恐傷腎者加製續斷炒黃柏炒杜仲各一錢

五味子十五粒

草炙五分

改生地為熟地

因思慮積久不解傷脾者

加土炒白朮一錢五分

人參陳皮

製香附各一錢

炙草五分

因喜樂太過傷心者

加條芩黃連土炒白朮去心麥冬各一錢

炙草五分

因跌蹶觸動者安胎飲主之

歸身

炒白芍各一錢

土炒白朮黃芩蘇葉各

一錢五分

炙草砂仁各五分

●苓朮安胎飲

妊娠安胎主方加減法開後

白朮

米泔水浸一宿去蘆切片晒乾黃土炒

有如脾脈虛弱細軟緩大無力外證飲食少進惡心嘔吐泄瀉等證用一錢五分或二錢若氣體強壯或氣鬱壅滯胸

腹悶脹滿作痛或素有奔豚積聚上攻者忌用

條芩如脈洪盛有力素多內熱用一錢五分或二錢如氣體虛寒

脾肺脈弱嘔噦泄瀉者忌用

當歸身酒洗一錢五分或二錢如嗽有痰喘嘔噦泄瀉者忌用如止有泄瀉而無別證

以黃土炒用帶殼砂仁微炒五分或七分內熱者三四分生知母一錢素多內熱者或用一錢五分或貳錢如氣