

醫燈續焰卷十四

錢塘後學潘

楫碩甫註

同邑社盟王聖翼佑賢評

葉鼎彝周

門人孫標振宜校

胡靖策我屏

肺癰脉證第七十五

肺癰已成。寸數而實。肺痿之形。數而無力。肺癰色白。

亡津液而虛  
爲肺痿熱迫  
結聚爲肺癰  
二者治自迥  
別

脉宜短澁。不宜浮大唾糊嘔血。

金匱要略問曰。熱在上焦者。因欬爲肺痿。肺痿之病。何從得之。師曰。或從汗出。或從嘔吐。或從消渴。小便利數。或從便難。又被快藥下利。重亡津液。故得之。曰。寸口脉數。其人欬。口中反有濁唾涎沫者何。師曰。爲肺痿之病。若口中辟辟燥。欬卽胸中隱隱痛。脉反滑數。此爲肺癰。欬唾膿血。脉數虛者爲肺痿。數實者爲肺癰。○又問曰。病欬逆。脉之。何以

榮衛之行乃  
肺所主風熱  
通聚而成膿  
肺藏敗而  
榮衛無主矣  
奚可也生

通調水道下  
輸膀胱肺之  
職也熱則閉  
癰聚則遺尿

知此爲肺癰。當有膿血。吐之則死。其脉何類。師曰。  
寸口脉微而數。微則爲風。數則爲熱。微則汗出。數  
則惡寒。風中于衛。呼氣不入。熱過于榮。吸而不出。  
風傷皮毛。熱傷血脉。風舍于衛。其人則欬。口乾喘  
滿。咽燥不渴。時唾濁沫。時時振寒。熱之所過。血爲  
之凝滯。蓄結癰膿。吐如米粥。始萌可救。膿成則死。  
○又云。肺痿吐涎沫而不欬者。其人不渴。必遺尿  
小便數。所以然者。以上虛不能制下故也。此爲肺

要知分曉

鼻乃肺竅藏  
和竅通自然  
之理因竅知  
藏亦自然之  
理

中冷。必眩。多涎唾。甘草乾薑湯以溫之。若服湯已。  
渴者。屬消渴。又云。肺癰喘不得卧。葶蘆大棗瀉  
肺湯主之。又云。欬而胸滿。振寒脉數。咽乾不渴。  
時出濁唾。腥臭。久久吐膿如米粥者。爲肺癰。桔梗  
湯主之。又云。肺癰胸滿脹。一身面目浮腫。鼻塞  
涕出。不聞香臭。酸辛。欬逆上氣。喘鳴迫塞。葶蘆  
大棗瀉肺湯主之。已上數條。金匱要略辯肺痿肺  
癰之所成不同也。其言熱在上焦者。痿癰皆有熱



論其同處則

肺癰肺痿方

無遺情此絕

巧辯法

候脉審症要

如捉賊見賊

必有證據何

俗醫之冒昧

也卽此數端

已已治病之

決凡矣

也。其言欬者。痿癰皆有欬也。其言亡津液者。痿癰皆亡津液也。其言脉數者。痿癰皆脉數也。但痿屬肺氣虛。虛則雖有熱而不烈。熱不烈。則雖亡津液。不至燥涸。故雖欬而口中反有濁唾涎沫。熱雖客肺。亦不至腐。良爲膿。唯肺藏痿萃而已。其脉雖數而必虛。癰則不然。乃肺藏氣壅邪實。實則熱烈。熱烈則津液亡而更加乾涸。故口中辟辟燥。烈熱迫肺。肺將腐傷。故氣逆而欬。欬卽胸中隱痛也。津液

既涸。脉應濇滯。而反滑數者。蓄熱腐化。挾有膿血  
之象。卽謂之數實。亦可。次條云。寸口脉微而數者。  
以衛踈故微。邪鬱故數。衛踈邪鬱。故汗出表熱。而  
且惡寒也。此言風之初襲。邪猶在表。不入于裏。唯  
隨呼出。中于衛而外。傷皮毛。鬱而爲熱。其熱則不  
出于外。唯隨吸入。過於榮。而內傷血脉。夫衛者。主  
表。主皮毛。陽也。風客之。則內關于肺。肺氣壅逆。故  
欬而喘滿。衛主氣。肺亦主氣。口咽爲氣之門戶。氣

不通調則津液不周布故口乾咽燥或有時反

濁沫以熱不在胃故不渴衛疎邪客時爲振寒

皆風中於衛激動肺氣之證驗也榮主裏主血脈

陰也熱迫之則內及于脉肺朝百脉而行榮衛况

邪自皮毛始皮毛者肺之合由合入肺肺受其熱

血爲之凝結久則腐敗爲膿隨吐而出如米粥此

皆熱過于榮敗傷肺體之證驗也始萌則在陽在

衛屬氣分故云可救久則入陰傷血脉傷藏體故

肺癰亦是急  
症膿成則藏  
體已傷豈得  
不死

肺受命于脾  
補母者所以  
治其源也

云膿成則死。三條所云肺痿者。虛寒之痿。痿之變也。肺虛而寒。則液不流布。故亦吐涎沫。無熱迫肺。則肺氣不逆。故不欬。無熱。故不渴。肺居最上。爲諸氣之總司。而通調水道。下輸膀胱。遺尿小便數者。肺氣虛冷。有失通調之職。所謂不能制下也。氣虛于上。故眩。治以甘艸乾薑湯者。薑以溫冷。艸以補虛。艸補土而不補金者。虛則補其母耳。服此溫劑而渴者。肺中必熱。是知遺尿便數。非痿證。乃消渴。



也。卽氣厥論所謂飲一溲二。肺消之屬。下四條所載。已成癰。未成癰。皆肺氣壅塞之有餘者。前二條論中。頗悉其義。而阜角。葶藶。桔梗。輩亦皆下氣瀉壅開結之藥。以方合證。理可想見。故不重解也。本文云。肺癰已成。寸數而實者。卽要略所謂脉數實者。爲肺癰。肺痿之形。數而無力者。卽要略所謂脉數虛者。爲肺痿。必候于寸者。以肺居最上也。肺癰色白。脉宜短濇者。言其面色白。爲肺色。短濇。爲肺

脉色脉與證相符故宜也。若脉浮大是爲火象。唾如米糊。嘔見膿血。是火尅金。肺藏已傷。宜乎。

附方

金匱甘艸乾薑湯

甘艸 四兩

乾薑 二兩

右咬咀。以水三升。煮取一升五合。去滓。分溫再服。

金匱葶藶大棗瀉肺湯 治肺癰喘欬。不得卧。或

鼻塞清涕。不聞香臭。酸辛。上氣迫塞。服此湯可。

先服小青龍湯一劑。乃進此

見第十六

亭  
壑

熬令黃色搗丸如彈子大

大棗

枚十二

右先以水三升。煮棗取二升。去棗。內葶藶煮取

桔梗湯亦治血痺。今人用此爲咽喉諸證要藥。

見第三十二

灸甘艸湯

見第三十三

千金甘艸湯 治同桔梗湯。

甘艸

右一味。以水三升。煮減半。分溫三服。

千金生薑甘艸湯 治肺痿欬唾涎沫不止。咽燥

而渴。

生薑

五兩

人參

三兩

甘艸

四兩

大棗

十五枚

右四味。以水七升。煮三升。分溫再服。

千金桂枝去芍藥。加皂莢湯。治肺痿吐涎沫。

桂枝

生薑

各三兩

甘草

二兩

大棗

十枚

皂莢

一枚去皮  
子炙焦

右五味。以水七升。微微火煮。取三升。分溫三服。

外臺桔梗白散。治欬而胸滿。振寒脉數。咽乾不

渴。時出濁唾腥臭。久久吐膿如米粥者。為肺癰。

桔梗

去蘆

貝母

去心各三分

巴豆

一分去皮熬

右三味為散。強人飲服半錢七。羸者減之。病在



佑賢曰瓜辦  
須用苦絲瓜  
辦

膈上者吐膿血。膈下者瀉出。若下多不止。飲冷

水一杯則定。

千金葦莖湯 治欬有微熱。煩滿。胸中甲錯。是爲

肺癰。

葦莖

升二

薏苡仁

升半

桃仁

粒五十

瓜辦

升半

右四味。以水一斗。先煮葦莖得五升。去滓。內諸

藥。煮取二升。服一升。再服。當吐如膿。

瀉白散 治肺癰

桑白皮 炒二錢

地骨皮 去骨

甘草 炙

貝母 去心

紫苑

桔梗 炒

當歸 酒拌各一錢

瓜蒌仁 一錢半

作一劑。水一鍾。薑三片。煎八分。食遠服。

立齋云。此方乃瀉肺邪消毒之劑也。若喘咳唾

痰沫。肺脉浮數者。用之有效。

四物湯 治肺癰吐膿。五心煩熱。壅悶欬嗽。

佐賢曰。治肺癰多用桔梗者。以此藥開通肺氣故也。

貝母

去心

紫苑

去苗土

桔梗

炒各一兩

甘艸

炙半兩

右搗篩。每服三錢。水一盞。煎五七沸。去滓。不拘時。稍冷服。如咳嗽甚。加去皮尖杏仁三枚同煎。小兒量減。

### 肺壅神方

用薏苡米爲末。糯米飲調下。或入粥內煮喫亦可。一方用水煎服。當下膿血便愈。

俗賢曰治肺  
癰大法先開  
通解散次清  
涼後補養二  
方乃後局藥  
也

佑賢曰用藥  
有先後不可  
不知有用白  
芩一味治此  
亦妙

濟生排膿散 治肺癰。得吐膿後。以此排膿補肺。

生綿黃耆二兩。細末每二錢。水一盞。煎五分服。

排膿散

黃耆

鹽水拌炒

白芷

五味子

炒杵

人參

各等分

爲細末。每服三錢。食後蜜湯調下。

肺癰收口方

肺癰收斂瘡口。止有合歡樹皮。或白欬煎湯飲。