

亥22

4-126

精校
張氏醫通

上海錦章書局
出版



婦人門下

產後諸禁

血暈 三衝 三急 三審 嘔吐 頭振 死逆 傷風 飽悶 瀕語 痢 如見鬼神 虛煩 驚悸 多汗

寒熱 中風 欬嗽 發喘 惡痰 瀉 浮腫 諸血 大小便諸強 諸痛 諸淋 諸瀉 乳汁

經曰。乳子而病熱。脈懸小。手足溫。則生。寒則死。

乳子中風熱。喘鳴肩息者。脈實大。而緩則生。急則死。

實大者。以產後新虛故也。設脈雖懸小。而見手足逆冷。又為脾氣衰絕。陰氣暴逆之候。亦主死也。下條言產後中

風熱。而至喘鳴肩息。以風熱逆於陽位。其脈必不能懸小。但須實大之中。而往來和緩。則脾胃之氣在其中矣。設

見急疾胃氣已絕。安得不死。後世以乳子二字誤認為小兒。如張介賓之明。亦不加察。且因此而謂小兒不當視

虎口三關。即宜診兩手六部。非智者之一失歟。

金匱云。問曰。新產婦人有三病。一者病瘧。二者病鬱冒。三者大便難。何謂也。師曰。新產血虛多汗。出善中風。故令病

瘧。亡血復汗。寒多。故令鬱冒。亡津液。胃燥。故大便難。產婦鬱冒。其脈微弱。嘔不能食。大便反堅。但頭汗出。所以然者。

血虛而厥。厥而必冒。冒家欲解。必大汗出。以血虛下厥。孤陽上出。故頭汗出。所以產婦善汗出者。亡陰血虛。陽氣獨

盛。故當汗出。陰陽乃復。大便堅。嘔不能食。小柴胡湯主之。

病解能食。七八日更發熱者。此為胃實。大承氣湯主之。產後氣血俱虛。汗下皆禁。獨此一證。用大承氣者。乃證治

之變。不當以尋常例測也。以其病解之後。尚有餘熱之胃。所以能食。食入既多。至七八日更加發熱者。此必復傷

飲食之故。故知胃有實結。恐其煎迫津液。故以急下救陰為務。然必年體強旺。脈證俱實。且時日既久。與新產大

便難不同。是可議下。設遇胃虛之人。雖能食而所食不多。即有發熱便秘。亦屬血虛急宜調養。氣血斷非承氣所

宜。不可恣行攻擊也。

產後腹中疔痛。當歸生薑羊肉湯主之。并治腹中寒疝。虛勞不足。若寒多者。加生薑。成一斤。痛多而嘔者。加橘皮一

張氏醫通卷十一 婦人門下 產後

兩。白朮一兩。產後腹中疝痛乃寒積厥陰衝脈。故用辛溫以散血中之寒。助以血肉之性。大補精血。較諸補劑。功效懸殊。若腹痛兼嘔。而所嘔皆是稀痰。是知脾虛濁氣上逆。故加橘皮以宣散其氣。白朮以固護其脾。倘見血逆而嘔。所嘔渾是清水。腹脹滿急。則加桃仁肉桂。具見言外矣。至於寒疝虛勞。少腹結痛。總是下焦寒結。亦不越是方也。

產後腹痛。煩滿不得卧。枳實芍藥散主之。并主癰膿。以麥粥下之。仲景凡治腹痛。多用芍藥。以其能收陰氣之散也。以其能除血痹之痛也。以其能緩中而止急痛也。本草謂主邪氣腹痛。故多用之。蓋五氣之邪。莫如厥陰肝木之性急暴。一有不平。則曲直作痛也。此方治疝痛。用芍藥為主。佐以枳實炒黑。入血破積聚。收陰緩中。遂便致新。麥粥補血下氣。而壯血脈也。

師曰。產婦腹痛。法當以枳實芍藥散。假令不愈者。此為腹中有乾血著臍下。宜下瘀血湯主之。亦主經水不利。煩服之。新血下如豚肝。血之燥乾凝著者。非芍藥枳實可能治。須用大黃桃仁蟅蟲。下其血閉。更加蜜以緩大黃之急也。

產後七八日。無太陽證。少腹堅痛。此惡露未盡。不大便。煩躁發熱。切脈微實。再倍。發熱日晡時。煩躁者不食。食則讞語。至夜即愈。宜大承氣湯主之。熱在於裏。結在膀胱也。太陽為表。膀胱為裏。七八日表證入裏。故曰無太陽證。惡露已為病氣所鬱。不能盡去。因入裏與惡露相搏。結在膀胱。而作少腹堅痛。下焦熱證。故不大便。煩躁發熱。更切其脈微實。再倍。其發熱在日晡時。而煩躁不食。熱邪又攻於胃。胃熱則不食。食入則穀氣之熱更助。兩熱相併。故讞語。至夜即愈者。產後血虛。熱邪易入血室。入血室則夜如見鬼狀。言此以明其熱不在血室。而在膀胱與胃。故用大承氣湯也。

產後風續之數十日不解。頭微痛。惡寒。時時有熱。心下悶。乾嘔。汗出雖久。陽旦證續在者。可與陽旦湯。舉此與上文承氣湯為表裏之例。

產後中風發熱。面正赤。喘而頭痛。竹葉湯主之。溫覆使汗出。頸項強。用大附子一枚。破之。如豆。入前藥。湯去沫。嘔者加半夏半升洗。此證太陽上行至頭。表陽明脈過膈。上循於面。二經合病。多加葛根。以葛根為陽明解肌藥也。防

風佐桂枝去二經之風竹葉桔梗主氣上喘參草和中氣薑棗行營衛穀氣行則上下交濟而汗出解矣附子恐是方後所加治頸項強者以邪在太陽禁固其筋脈不得屈伸故用附子溫經散寒揚去沫者不使辛熱上浮之氣助其虛陽上逆也若邪在胸而嘔加半夏治之上言破之如豆入前藥舊本作如豆大今如徐忠可駁正婦人乳中虛煩亂嘔逆安中益氣竹皮大圓主之有熱者倍白薇煩喘者加柏實一分乳中虛言乳哺而乳汁去多則陰血乏而胃中亦虛陰乏則火撓而神昏亂胃虛則嘔逆用甘草瀉心火石膏療煩亂竹皮主嘔逆桂枝和營氣又宣導諸藥使無扞格之逆煩喘者為心虛火動故加柏實以安之

產婦下利虛極白頭翁加甘草阿膠湯主之傷寒厥陰證熱利下重者用白頭翁湯苦寒治熱以堅腸胃此產後

氣血兩虛故加阿膠甘草然下利血滯也古人云血行則利自止此方豈獨治產後哉

婦人在草蓐自發露得風四肢苦煩熱頭痛者與小柴胡湯頭不痛但煩者千金三物黃芩湯自發露謂自發未

露體得風非邪外傷者故不為自汗風病蓋產時天機開發雖微風亦得入之外感之風內應之火合化淫於四末而作四肢苦煩熱上至於頭作頭痛病在表裏之間故用小柴胡湯主治少陽若頭不痛是無表也惟肝膽風

熱內動上膈作煩故用黃芩退熱苦參養肝熟地補血而益腎水則肝膽之火寧矣

婦人產後虛羸不足腹中刺痛不止吸吸少氣或苦少腹中急摩痛引腰背不能食飲千金內補當歸建中湯產後

一月日得服四五劑為善令人強壯若大虛加飴糖六兩湯成內之於火上煖令飴消若去血過多崩傷內動不止

加地黃六兩阿膠二兩合八味湯成內阿膠產後血去營衛俱虛內不充於五臟肝木妄動作腹中刺痛上不充

於臍中遂吸吸少氣下不濟於腎故少腹急引外連腰脊六府不和則不能食用此以益營衛伐肝邪補中和內

○按此即黃耆建中之變法彼用黃耆以助外衛之陽此用當歸以調內營之血然助外則用桂枝調中則宜肉

桂兩不移易之定法也

千金二字義見中風方千金三黃湯下

諸禁○一禁臥二禁酒三禁浴四禁寒五禁汗六禁下七禁利小便八禁寒涼藥九禁起動作勞蓋初產血氣未定

遽臥則惡血上升故分婉之後須高卧仰倚切不可即臥三朝始可稍去其簾尚宜高枕七日後如無他病方可安

枕多有半月後未能貼席者酒能助火亂經誤用不無動血之虞至如難子猪腎一切滯氣堅韌難化物及生令臍

滑皆不可食。即砂仁湯亦能動血。咸在禁例。浴能升動惡露。雖當夏月。亦須禁之。曾有產數日後。因浴於血上衝而斃者。亦有因浴動血。誤用寒涼。瘀結不行。血化為水。喘滿腫脹而死者。不可不慎也。新產驟盛最忌寒。寒則血氣凝滯。諸變冗生。每至飲食不化。腹痛作瀉。禍患莫測。欲去其瘀。則正氣并脫。欲止其瀉。則瘀結不行。惟薑桂苓朮平溫峻補。庶幾血行瀉止。故冬月一座。即宜重綿兜護其腹。在夏月亦當覆巾裹之。機要云。胎產之病。從厥陰無犯胃氣。及上中二焦。為之三禁。不可汗。不可下。不可利。小便制劑之法。能不犯三禁。則營衛自和。而寒熱止矣。故產後雖有表證。一切風藥皆不可用。以其性升。不特載血上行。令人發暈。抑且令人亡陽。多致汗脫而死。不特風藥當禁。即佛手散中芎藭皆為散用。恐湯能發汗也。至於下藥。尤為切禁。非特硝黃難於輕試。即沒使數難者。只宜調養元氣。若車前澤瀉之類。咸非所宜。以產後百脈空疎。自裏至表。無一不虛。虛則諸寒皆禁。即芍藥亦難輕用。以其酸寒伐生發之氣也。地黃皆當慎用。以純陰之味。能令作瀉也。黃芩能凝滯瘀血。令人惡露不行。為害不淺。然皆產後常禁。設有表裏客邪。又不當拘於上說也。試觀金匱產後例中。陽旦湯之用芩芍。以其中有桂也。辟按八珍十全之用熟地芍藥。以其中有參朮及桂也。宜復拘於此例哉。況乎大承氣小柴胡三物黃芩下瘀血等方。皆產後治例。此聖人臨證如日。大轉回天之力。非尋常下士可得而測識也。迨夫早起作勞。不避風寒。不禁飲食。往往致成大病者。皆自作之孽耳。○凡產後之脈。寸口洪疾不調者死。沉微附骨不絕者生。緩滑沉小者吉。實大弦急者危。牢革結代及澹滯不調者不治。

血暈○產後元氣虧損。惡露來虛上攻。眼花頭暈。或心下滿悶。神昏口噤。或痰涎壅盛者。急用熱童便主之。若下血多而暈。或神昏煩亂者。芎歸湯加人參三五錢。澤蘭葉一握。童便半盞。兼補而散之。痰合二陳加烏梅薑汁。并用鐵秤鏈燒令赤。以醋沃之。或燒漆器并亂髮。以烟熏之。產後因虛火載血上行而暈。用鹿茸灰為細末。好酒童便灌下一呷。即醒。行血極快。產後昏暈嘔逆不能飲食。此胃虛挾痰所致。以抵聖散去赤芍。加炮薑茯苓。慎不可用芎歸血藥膩膈。其嘔逆愈不能止矣。○初產血暈。速與扶起。勿卧。用韭菜一握。切碎。入有膏磁瓶中。將醋煎滾。澆入瓶內。急蓋瓶口。以嘴向婦鼻孔。令氣透入鼻中。即蘇。若惡露未盡。多昏悶不省人事。須問先因感氣而下胎者。以二陳加芎歸香附桃仁。小查薑汁。切不可作中風治。產後口眼喎斜等證。當大補氣血。十全大補下黑龍丹。肥人佐以痰藥。如

星半木香之類。若作中風治。而用小續命必殆。若腹中刺痛者。嚴氏清魂散。血暈語言顛倒健忘失志。此血入心包。宜失笑散加鬱金。或用血竭沒藥等分為末。熱酒和童便調下二錢。良久再服。惡血自下。

三衝○敗血上衝有三。或歌舞談笑。或怒罵坐卧。甚者踰牆上屋。口咬拳打。山腔野調。號佛名神。此敗血衝心。多方書用龍齒清魂散。然用之多不應。不若花藥石散最捷。琥珀黑龍丹亦效。如雖悶亂不致顛狂者。失笑散加鬱金。若飽悶嘔惡。腹滿脹痛者。曰衝胃。古法用五積散。余嘗用平胃加薑桂。往往獲効。不應送來復丹。嘔逆腹脹。血化為水者。金匱下瘀血湯。若面赤嘔逆欲死。曰衝肺。二味參蘇飲。甚則加芒硝蕩滌之。大抵衝心者。十難救。一衝胃者。五死。五生。衝肺者。十全一二。○產後口鼻起黑色而鼻衄者。是胃氣虛敗而血滯也。急用二味參蘇飲。稍遲不救。三急○產後諸病。惟嘔吐盜汗泄瀉為急。三者並見必危。疾閉心數。抵聖散去芍藥。加炮薑茯苓。多汗加烏梅。慎不可用浮麥。傷胃耗氣。棗仁膩滑作瀉。芍藥五味酸收。皆能阻滯惡露也。

三審○凡診新產婦。先審少腹痛與不痛。以徵惡露之有無。次審大便通與不通。以徵津液之或衰。再審乳汁行與不行。及乎飲食多少。以徵胃氣之充餒。必先審此三者。以脈參證。以證合脈。脈證相符。雖異尋常。治之必愈。脈證相反。縱無危候。必多變端。即如產後惡露。常以滿月為期。然間有六七朝即淨者。又未可一概論也。此雖產母稟質不同。而胎之所稟亦異。如胎息壯盛。則氣血盡歸其子。瘀血自少。胎息孱弱。則氣血涵養有餘。瘀血必多。亦有產時去多。產後必少。產時去少。產後必多。勢使然也。曾見一婦。難產異常。三朝下一血塊。大小形色與茄無異。此後絕無瘀血。惟小便如皂莢汁。其少腹略無痛楚。良由難產過傷子宮。闕閉廢弛。不能收斂。故其塊得下。世俗名兒枕者是也。大抵常產之婦。開闔有權。既產之後。子宮即閉。兒枕隨氣攻注。碎作小塊。續續而下。所以綿延日期。則此全塊頓出。自無淋漓之患。即有餘血。盡歸洩便矣。此後屢見數婦。證雖大異尋常。以意逆之。其理自若也。產後血脫津傷。大便自應艱澀。每至五七日始通。無足怪也。其有發熱譫語。脈滑實者。又當急攻。以救津液。若兼少腹鞭痛。又當破瘀。為先。產後三朝。每有寒熱蒸乳。寒熱後。乳汁大行。此胃氣乎化。雖有餘病。必無他慮。如無寒熱而乳汁充然。者血氣本旺也。若不寒熱無乳汁。此營衛不調。總無所苦。急宜當歸內補建中湯。頻與調之。否則滿月後。漸見寒熱膏蒸。而為蓐勞之患矣。

嘔吐○嘔吐惡露不行。二陳加當歸、蓮肉、桂、乾薑、胸腹脹滿，多是傷食。二陳加丁香，不應加人參、炮薑、澤蘭、蒼香，或抵聖散亦佳。如寒理中湯加藿香。

呃逆○呃逆者，胃寒所生。產後氣血俱虛，風冷搏氣而逆上，乃胃氣虛寒之極，最為惡候。理中加丁香，古方以丁香、豆蔻、伏龍肝為末，用桃仁、吳茱萸煎湯調下一錢，是如人行五里再服，未應急投參附。遲則不救。

飽悶○產後飽悶，惡露不行，多因血逆。宜行瘀血為主，如有塊上升，飽悶欲吐者，二陳湯加薑、桂、香附、地、查、蓬、枳、塊，不散，積久愈堅，琥珀、黑龍丹，若惡露已淨而飽悶，受氣也。沉香降氣散，若敗血傷於脾胃，而腹脹嘔吐者，抵聖散加鱗、鯉、甲、肉、桂。孕婦服安胎藥過多，或正產或半產後，經一兩月惡露未淨，此非敗血之比，宜導氣行血，若用止截誤矣。飲食停滯，六君子加木香、厚朴。大凡傷其脾胃者，當節飲食為主。

識語○識語多有血滯，亦有血虛者。風而痰鬱者，不可專以痰斷，亦不可認為血逆。其發識語，必脈大有力。始與證合。然又與產後不宜，故多難治。去血少者，血滯也。實則桃仁承氣下瘀血湯。虛則龍齒清魂散，或四烏湯用赤芍歸尾加桃仁薑汁。去血多者，血虛也。蓋血虛則心神失守，故識語。必先養血，不可用參朮峻補。當歸內補建中湯。當歸芍藥散、膠艾湯選用。若風兼痰鬱者，心經虛，故用痰客之導痰湯加鈎藤、鈎薄荷。又方益母草為末，薄荷湯為丸，童便服之，專治產後識語。

如見鬼神○產後傷耗血脈，心氣虛則敗血停積，上干於心，遂至心中煩躁，卧起不安。如見鬼神，言語顛錯，誤作風治，必殆。虛則四物湯換生地加桂心、炮薑、生蒲黃、石菖蒲。實則四烏湯加川連、煎成入龍腦一捻。服後得睡即安。心悸恍惚，語言錯亂者，千金遠志湯。如內虛敗血攻心，狂言亂語者，龍齒清魂散。瘀積不行，腹脹喘急者，急用下瘀血湯攻之。庶或可救。稍遲必難挽回。此證多有脾血少者，宜八珍加炮薑，則痰清神自安矣。

不語○產後不語，多因停積敗血閉於心竅，神志不能明了。嚴氏清魂加蘇木、丹參。若因心腎氣虛而不能通於舌，則舌強不語。辰砂七珍散，或人參、石菖蒲等分。不時煎服。腎虛風熱，地黃飲子。肝木太過，柴胡清肝散。或小柴胡加鈎藤、脾受木侮。六君子加升麻、鈎藤。氣血俱虛，八珍湯加菖蒲、遠志。不應獨參湯加附子一片。峻補其氣，而血自生。若竟用血藥，則誤矣。

發瘧○產後發瘧因去血過多元氣虧極或外邪相搏或陰火內動所致故傷寒汗下過多潰瘍膿血大泄多患此證須大補氣血或保無虞若攻風邪必死其證牙關緊急腰背反張四肢抽搐兩目連劄十全大補有汗加炮薑多汗加附子不應并加薑附倍人參多服始應嘗治大虛之證服參耆數斤附子數枚方應若汗拭不及兩手摸空者不治

發熱○婦人產後血虛陽無所依而浮散於外故多發熱治宜四物補陰而以炮薑之苦溫從治收其浮散使歸於陰若氣血俱虛惡寒發熱煩躁作渴十全大補湯若熱愈甚急加桂附若血虛至夜發熱小腹腰脇作痛四物加黃耆五錢肉桂一錢若作渴面赤當歸補血湯若誤認為火證投以涼藥禍在反掌然產後脾胃多虛有過於飲食傷滯而發熱者慎勿誤作血虛治但遇產後發熱若胸膈飽悶噯氣惡食泄瀉等證只作傷食治之若發熱而飲食自調者方用補血正法○產後大發熱必用炮薑同茯苓淡滲其熱一應苦寒并發表之藥皆不可用凡產後發熱惡寒皆屬血虛此熱非有餘之熱乃陰虛生內熱耳故以補陰藥加炮薑大劑服之且炮薑能入肺胃散虛熱入肝脾引血藥生血然不可多用獨用必與補陰藥同用此造化自然之妙也惡寒發熱腹痛者當去惡血○產後脈洪數胎前脈瀯弱多外懷孕者脈宜滑數已產而滑數不改者雖未必死多費調理

寒熱○產後因氣血虛弱脾胃虧損而發寒熱皆不足證經云陽虛則惡寒陰虛則寒熱若兼大便不通尤屬氣血枯槁切禁發表降火若寸口脈微為陽氣不足陰氣上入陽中而惡寒補中益氣湯加薑棗發越之尺部脈弦為陰氣不足陽氣下陷陰中而發熱六味凡加肉桂以收攝之若肌熱大渴引飲目赤面紅此血虛發熱當歸補血湯不可誤認客邪而用表散藥○下血過多寒熱而小腹不痛者此營衛虧損陰陽不和屬虛增損四物湯若惡露未淨傷滯胞絡寒熱而小腹痛者屬實輕則四烏湯重則醋煎散產後卧不如法敗血流入經絡骨節間寒熱腰股腫熱痛不可拊局方調經散有食消食頭痛骨疼寒熱者外感風寒也參蘇飲增損柴胡湯柴胡四物湯選用或兼瀉及吐者五積散○胸膈飽悶前後心痛寒熱者傷氣與食也指迷七氣湯虛人局方七氣合沉香降氣散如飽滿寒熱兼腹痛腰疼者四烏湯○熱而不寒胸煩自汗與大病後虛煩相似此去血過多血虛生熱也逍遙散若臍下熱非熱地不能治如大熱必用炮薑日晡轉甚者非柴胡不能治不應必用肉桂○新產蒸乳發熱不必服藥

中風○產後類中風證。大多血虛非真中也。或挾風。或挾痰。或挾氣證。雖不一治。法莫要於行血。芎歸湯加荆芥穗。淋黑豆酒煎服。亦治角弓反張手足攣。脈來虛浮者。血暈四肢強直。芎歸湯加重便。或用荆芥穗微焙為末。豆淋酒調下二錢。或重便服之。口噤則挾齒灌之。斷噤則灌入鼻中。即齦手足癱瘓。敗血入經絡也。用五積散。又有形氣虛。產後痿廢不起者。但當補氣藥中。兼行氣為主。朝用香砂六君子。暮用越鞠丸。久服自效。

欬嗽○產後欬嗽。多因腠理不密。外邪所感。而致。若因風寒所感。桔梗湯加葱白香豉生薑。或小建中湯。虛用異功散。去朮加山藥細辛桂枝。陰虛兼感客邪者。六味丸去萸加桂枝細辛。陰虛水不制火而嗽。六味丸加麥冬五味乾咳內熱不寒。桔梗湯加萎蕤麥冬丹皮蜜煎薑橘之類。蓋乾欬一證。有小兒食乳易治。無則成勞。

發喘○喘而痰聲大作。此痰犯肺金也。豁其痰喘自定。風則金匱旋覆花湯。加甘草桔梗。惡露未淨。加炮薑丹參。有食加厚朴陳皮。不嗽而喘。此肺為火迫乃真喘也。難治。若肺虛熱生。脈散為主藥。肺胃氣虛異功散。加桔梗。兼外邪加細辛。中氣虛寒前方加炮薑肉桂。陽氣虛脫更加附子。腎虛不能納氣。歸元都氣丸。作湯送靈砂丹。兼氣虛者。與異功散兼進。大抵產後發喘。加以脈之虛大急疾。皆不可治。

瘕癥○產後陰血去多。陽火熾盛。筋失營養。虛極生風。而成此證。若見脣青肉冷。汗出目眩神昏。命在須臾。四君子加芎歸丹皮鉤藤。蓋血生於至陰。至陰者脾土也。若肝經血虛。逍遙散加鉤藤。陽氣虛敗。十全大補加薑附鉤藤。鉤經云。脾之榮在脣。心之液為汗。若心脾二藏虛極。而脣白多汗。急用參附救之。若無力抽搐。戴眼反折。汗出如珠。不流者。皆不可治。

顫振○產後顫振。乃氣血虧損。虛火熾盛。而生風也。切不可用風為治。急用十全大補。溫補氣血為主。如小產後半身肉顫。半身汗出。亦宜上法。若產後不省人事。口吐涎沫。而顫振。或瘕癥者。當歸補血湯加荆芥穗。豆淋酒煎服。婦人胎前產後顫振。瘕癥。逍遙歸脾小柴胡補中。皆可選用。

傷風○產後傷風。須問惡露淨否。而後用藥。若未淨而小腹疼痛者。以行血理氣為先。金匱旋覆花湯。四烏湯。選用。若惡露已淨。小腹不疼。但頭痛身熱足冷。自汗欬嗽。黃耆建中湯。頭重。香蘇散。若風寒併傷。營衛俱病。遍體痛無汗。敗毒散。虛甚者。風者。不可發散。逍遙去朮加桂枝。得效雖遲。無失。

傷寒○產後傷寒不可遽用小柴胡蓋有黃芩在內停滯惡血也宜小建中湯增損柴胡湯時疫柴胡四物湯香蘇散伏氣發溫蔥白香豉湯感冒氣食香蘇散產後得熱病四肢暖而脈息和平者生四肢冷而脈沉瀉煩熱甚而脈洪或香皆亢證也

瘧○產後瘧瘧在初產時絕少即胎前久瘧淹纏產後裏氣通達無不霍然間有微寒食熱不止者此衛氣向虛營血驟傷之故但與內補當歸建中湯熱多倍芍藥寒多加黃耆夜投一倍當歸三倍黃耆不應加生何首烏虛熱不止大便不實加炮薑茯苓惡露不行小腹結痛另用炮黑山查熬枯黑糖伏龍肝湯煎服或有產後一月半月感犯風暑而瘧小柴胡補中益氣選用風加羌活紫蘇暑加香需厚朴隨證裁酌但黃芩苦寒無論惡露淨與未淨皆非所宜

痢○產後下痢有三一者因胎前患痢產後不止昔人以為七日必死之候若元氣未敗脈有胃氣可進粥食者伏龍肝湯丸隨證加減多有得生者一者因產後臍腹受冷飲食不化腹痛惡露不行理中湯為主白加吳茱萸木香赤加桂心茯苓一者因產後誤食生冷或臨產飲食過度產後泄瀉下痢亦宜理中湯白加枳實茯苓厚朴木香赤加香附炮查熬糖虛加人參肉桂間有熱痢下重白頭翁加甘草阿膠湯清理之惡露已淨痢久不止腹痛後重補中益氣升舉之大劑產後下痢惟宜顧慮元神調和血氣則積滯自下惡露自行非若妊娠之有胎息難於照顧也

蓐勞○蓐勞者因產理不順疲極筋力憂勞心慮或將養失宜虛風客之致令虛羸喘乏寒熱如瘧百節煩疼頭痛自汗肢體倦怠咳嗽痰逆腹中絞刺當扶正氣為主六君子加當歸若脾肺氣虛咳嗽口乾異功散加麥冬五味氣虛頭暈補中益氣倍用歸耆肝經血虛肢體作痛四物加參苓朮桂肝腎虛弱自汗盜汗往來寒熱六味丸加五味子脾虛血弱腹痛月經不調歸脾湯倍木香血虛有熱增損柴胡湯骨蒸勞熱嗽痰有紅者異功散去朮加山藥丹皮五味阿膠重便熱而無痰乾痰逍遙散用蜜煎薑橘蜜蒸白朮產後虛損不時寒熱或經一二載元神不復月事不轉先與千金當歸芍藥湯後與烏骨雞丸調補大抵此證多因脾胃虛弱飲食減少以致疲憊而成當補脾胃進飲食則諸藏有所倚賴病自愈矣

虛煩○產後虛煩皆氣血虧損虛火上泛所致千金治產後內虛煩熱短氣用甘竹茹湯產後乍寒乍熱手足身溫

心胸煩滿。用知母湯。產後虛煩頭痛短氣悶亂不解。用淡竹茹湯。產後煩滿不安。用人參當歸湯。俱孫真人法也。
驚悸。○產後心悸。皆心虛所致。千金治產後衝悸。志意恍惚。言語錯亂。用茯神湯。虛熱口燥。加麥門冬。虛加人參。善忘。加遠志。麥門冬。產後大虛心悸。志意不安。恍惚恐畏。虛煩不眠。少氣。人參圓。吸吸乏氣。善忘。本方去薯蕷。加遠志。亦孫真人法也。

多汗。○產後血虛。身熱自汗。逍遙散加熟棗仁烏梅。不可用補氣藥。古方用麥煎散。治產後盜汗自汗。為言不可勝數。因外感而汗者。黃耆建中湯。氣血俱虛。十全大補湯。不應加附子。若汗多不止。必發柔痙。尤當煎藥。若頭汗者。或因濕熱。或因瘀血。當審虛實治之。半身汗出。昔人用二陳合四物。治多不效。以血藥助陰。閉滯經絡也。此屬氣血不充。而有寒痰留滯。非大補氣血。兼行經絡。痰不効。宜十全大補人參養營加星半川烏。肥人多加豁痰行氣藥。瘦人氣血本枯。天之徵也。

麻督。○產後麻督。宜生血補氣。十全大補湯。去血過多。手足發麻。小腹大痛。則遍體麻痺。欲死。此非惡露凝滯。乃虛中挾痰。六君子加炮薑香附當歸。曾治一婦。產後右半身麻督而昏。不省人事。發即胸膈痞悶。下體重著。或時心神蕩搖。若無心肺之狀。頃則周身冷汗如澆。大吐痰涎而蘇。此產後經脈空虛。痰飲乘虛襲入之故。因與四君子加歸耆肉桂隨手而效。復有一婦。產後左半身麻督昏暈。不省人事。發則周身大痛。筋脈痙攣。肌肉瞤動。或時頭面赤熱。或時腿上振振動搖。頃則蒸蒸汗出而蘇。此產後營血大虧。虛風襲入之故。用十全大補湯治之。諸證悉平。但麻督不止。後與地黃飲子而安。

大小便諸證。○產後去血過多。大腸乾澀。每至三五日後。甚至五七日而大便秘通者。皆其常也。或血虛火燥。不可計其日期。必待腹滿。覺脹欲去而不能者。乃結在直腸。宜用導法。蜜煎導。或荆藎薑醬瓜。皆可為導。惟猪膽汁導禁。用。以其苦寒。誤用每致發呃也。若用苦寒藥攻通。反傷中焦元氣。或愈結難通。或通瀉不止。必成敗證。若屬血虛火燥。四物加鮮何首烏。潤下之。氣血俱虛之人。雖數日不通。飲食如常。腹中如故者。八珍加桃仁蘇子熟蜜。若多日不解。躁悶異常。不得已用人參當歸枳殼煎服。亦權宜之術。耳。古人用玉燭散治之。反致危殆者多矣。至治產後日久。病外感熱結。有實邪燥屎者。急用承氣大柴胡下之。又不當拘於此例也。○小便不通。腹脹如鼓。用炒鹽加麝半

字填臍中外用葱白十餘莖作一束切如半指厚直鹽麝上將艾炙之覺熱氣入腹難忍方止小便即通此惟氣閉者宜之若氣虛源涸與夫熱結膀胱者皆不可用產母但覺小水少此即是病便宜調治如大小便俱秘惡露不行先通惡露四烏湯加蓬朮山查如惡露不行大便泄小便難五苓散倍肉桂加桃仁不可服胃苓湯以蒼朮龍止血也○產後小便數乃氣虛不能制水補中益氣加車前茯苓若膀胱陰虛而小便淋瀝生料六味合生脈散滋其化源須大劑煎成隔湯頓熱續續進之○產後遺尿不知乃氣虛不能統血也補中益氣湯若新產廷孔未斂溺出不知此恒有之至六七朝自止不必治也○婦人產後水道中出肉線一條長三四尺動之則痛欲絕先服失笑散數服次用帶皮薑三斤研爛入清油二斤煎油乾為度用絹兜起肉線屈曲於水道邊以前薑熏之冷則熨之一日夜即縮二日即盡再服芎歸湯調理如肉線斷則不可救矣○產婦尿胞損破致病淋瀝者當與峻補丹溪云難產多是氣虛產後氣血尤虛當以參耆為君芎歸為臣桃仁陳皮為佐同猪羊脬煎湯時時飲之勿令間斷使氣血驟長匝月其脬自完若稍緩則難成功矣○產間傷動脬破終日不小便但淋濕不乾用天然黃絲二兩不用染者牡丹皮白朮人參各一錢水煎至絲爛如錫服服勿作聲作聲則泄氣無效名補胞飲經月常服有效○產後損尿胞而淋瀝參耆朮草熟膏猪羊胞煎湯饑時調服月餘胞長淋止○產後陰戶著風癢四物湯加藁本防風不應有瘀傷也加血餘龜版灰肉桂陰頰脫下氣血俱虛不能收斂者八珍加升麻黃芪○陰戶腫痛濕熱也用枯礬荊芥白芷當歸桃仁細辛川椒五倍子等分入葱三莖煎湯熏洗即愈

諸痛○產後遍身疼痛氣虛百節開張惡露乘虛流入經絡骨節之間謂之敗血流經或流於腰脰或流入髀股痛不可捫痛處熱腫流注日深漸致身面浮腫局方調經散最當琥珀地黃丸亦宜若因虛風所侵以致肢體沉重不利筋脈引急發熱頭痛局方用五積散去蒼朮加陵裡甲用生漆塗煨尤良或四神散加桂枝薑棗和營止痛最捷若誤作傷寒發汗致經脈抽搐手足厥冷而變為瘕又當十全大補為主若以手按而痛益甚者是瘀滯也四烏加陵裡甲桂枝薑棗以散之按而痛稍緩者此血虛也四物加香附炮薑人參白朮甘草以養之如皮肉痛者外感也如月內惡露未淨者香蘇散加肉桂陵裡甲產後五藏皆虛胃氣虧損飲食不充則令虛熱陽氣不守上凌於頭則令頭痛補中益氣加川芎香附子不應加附子一片若血虛四物加參朮有產後敗血上衝頭痛非琥珀黑龍丹不

效。又方。治產後敗血作梗頭痛諸藥不效。用大附子一枚。藏醋一碗。用火四畔炙透。鹽醋令盡。去皮臍。加川芎等分。並為末。每服錢半。或二錢。茶清調下。○偏正頭風作痛。川芎茶調散。去白芷。加細辛。黑豆。淋酒煎。乘熱熏患處。候溫服之。如左半邊惡寒。腦後掣痛者。本方去白芷。加歸芍。右半邊畏寒。兩太陽引痛者。本方去白芷。加參耆。千金治產後中風。頭痛手臂逆冷。白朮三兩。附子一枚。獨活一兩。生薑三兩。豆淋酒煎。服婦人患頭風者。常居其半。每發必掉眩。如在車船上。皆因血虛風邪運動其疾。二陳加當歸。黃芩。羌活。防風。不應加烏頭石膏。挾氣虛者。必加黃耆。然痛傷產後吐血。衄血。並令人眩暈。當隨所因而治。○感氣而胃口作痛。養胃湯。因氣而心腹痛。降氣散。感寒而痛。甘草乾薑湯。加焦白朮。桂枝。有食。枳實理中。加炮黑山查。○產後惡血上攻。心痛。為陰血虧損。隨火上衝。心絡。名心胞絡痛。宜理中加當歸。產後惡露未淨。胸腹作痛。或小便不利。琥珀地黃丸。溫散之。產後心痛大寒。嘔逆不食。千金蜀椒湯。產後心痛乾嘔吐涎沫。大岩蜜湯。若真心痛。旦發夕死。夕發旦死。瘀血上衝。用失笑散一錢。童便調下。即定。血既散而仍痛。增損四物湯調補之。○脇痛。宜分左右。蓋左屬血。血藏於肝。肝傷有死血。故痛。小柴胡去芩。加丹皮。香附。薄桂。當歸。童便。右屬脾。脾有痰積於脇。則痛。補中益氣。去升麻。加葛根。半夏。茯苓。枳殼。生薑。左右俱痛者。屬虛。補中益氣。加桂下六味丸。○腹痛。惡露已淨者。下焦虛寒也。六味丸加桂。如痛定於一邊。及小腹者。此是側臥。敗血留滯。所致。四烏湯。加蓬朮。有產後腹痛。服上藥不應。而喜溫喜按者。屬虛。屬寒。寒則理中。加肉桂。當歸。虛則金匱當歸生薑羊肉湯。隨證加減。神驗。產後三日腹痛。補中益氣。藏強力。消血。羊肉生地黃湯。若腹中疝痛。畏寒少食。大劑人參。阿膠。生薑煎服。效。此即仲景當歸生薑羊肉湯之變法也。若痛而惡心。或欲作嘔。六君子加炮薑。有瘀加莪。茂。桃仁。炮黑山查。若泄瀉腹痛。後重。補中益氣。加木香。炮薑。若胸膈飽脹。或惡食吞酸。或停惡露。至夜發熱。識語。腹痛。手不可按。此是飲食所致。當用二陳加枳朮。查肉。虛人枳實理中。加肉桂。炮查。發熱腹痛。按之痛甚。不惡食。不吞酸。此是瘀血停滯。四烏湯加蓬朮。肉桂。若止是發熱頭痛。或兼腹痛。按之却不痛。此是血虛。四物加艾附。香桂。若腹痛脇脹。此氣寒不能溫養肝血。當歸乾薑香附肉桂丹皮茯苓。入鹽少許。熱服。產後下血不盡。腹內堅痛。不可忍者。甘草乾薑當歸芍藥桂心桃仁山查煎服。○產後少腹作痛。俗名兒枕塊。古法用失笑散。及四物加莪。茂。山查。產後崩中去血。赤白相兼。或如豆汁。千金伏龍肝湯。能溫脾胃。涼肝血。其效如神。若惡露既去而仍痛。四神散調補之。小腹痛。當視

去血多少。如敗血凝滯有塊而痛者醋煎散無塊者四烏湯須看人虛實酌用。○產後臍腹作痛冷氣來虛也內補當歸建中湯。○產後腰痛者因產勞傷腎所致十全大補湯加附子。產後惡露漸少忽然不來腰中重痛下注兩股痛如錐刺入骨此由敗血流滯經絡不即通之必發癰疽局方調經散加陵鯉甲水煎日三服以痛止為度琥珀地黃丸亦宜下瘀血湯代抵當丸皆可取用切勿誤用五積散等辛溫之藥丹溪云局方五積散治產後瘀血作痛以蒼朮為君麻黃為臣厚朴枳殼為使雖有歸芍之補血僅及蒼朮三分之一不思產後之婦有何寒邪血氣未充似難發汗不過借藥性溫和可以推陳致新豈可用麻黃之悍蒼朮厚朴之燥乎虛而又虛禍不旋踵矣

泄瀉○產後泄瀉其因有五。一者因胎前泄利未止產後尤甚。一者因臨產過傷飲食產後滑脫。一者因新產驟食肥腥不能尅運。一者因新產煩渴恣飲水穀混亂。一者因新產失護臍腹藏府受冷其致瀉之由雖異一皆中氣虛寒傳化失職之患並宜理中湯為主食加枳實山楂水加桂心茯苓虛加桂附倍參寒加桂附倍薑久瀉腎虛加桂心熟附瘀結不行加炮查歸身若見完穀不化色白如糜此脾胃大虛元氣虛脫之候十有九死惟猛進溫補之劑庶可挽回即有煩躁發熱面赤脈來數大皆虛火上炎之故當并進桂附人參甘薑苓朮之類伏龍肝煮湯代水煎服仍得收功若小便混濁如泔或大便中有白沫如腸垢者乃元氣下陷之故並宜補中益氣加桂苓炮薑升舉之或臭水不止加新艾香附吳茱萸若兼瘀結不通腹脹喘急神丹不能復圖也

浮腫○腫脹腹大筋青小便不利必食生冷傷滯瘀血也若用利水藥病必轉劇理中湯加木香肉桂蓬朮身腫或腹大如鼓四七湯加木香嗽者忌木香用炮薑灰面腫下不腫屬風宜發散紫蘇飲加防風下腫上不腫屬濕宜利小便紫蘇飲加木通四肢與頭面腫甚氣食也紫蘇飲加消導藥有血兼破血藥停血不散腹腫喘滿夜甚於晝四烏湯加蓬朮若足忽腫者乃濕熱注病恐成腳氣當歸拈痛湯若紅腫而痛恐生腫毒則以膏熱與不熱為辨。○產後敗血乘虛停滯循經流入腿脇留滯日深故令面目四肢浮腫宜調血為玉醫者不識便作水治治以導水之藥必危夫產後既虛又以藥虛之是謂重虛往往多致夭枉但多服局方調經散或四神散加蓬朮桃仁肉桂穿山甲血行腫消則愈陳無擇云若風邪乘於氣分皮膚腫而浮虛乃邪氣有餘也若皮膚腫其形色如熟李者乃水也水腫者宜利小便氣腫者宜發汗

諸血○產後鼻衄。乃氣血逆行所致。紫蘇飲入童便荊芥灰。如口鼻黑氣起而衄者難治。初產時。口中血溢出暴或吐血嗽血。名血氣衝心。四物加延胡木香炮薑。產久惡露已淨。吐咯瘀血者。治與平人同。產後血崩。因經脈未復而勞碌惱怒。或犯房事多成。此候若小腹滿痛。肝經已傷。最為難治。若血滯小腹脹滿。四烏湯加達木肉桂。血少小腹空痛。四物加丁香膠艾。肝火迫血妄行。加味道遙散。脾鬱不能統血。加味歸脾湯。脾虛不能攝血。補中益氣湯。厚味積熱傷血。清胃散加炮查。風熱相搏傷血。四君子加防風枳殼惡寒嘔吐。大便頻瀉。六君子加炮薑。下焦虛寒不能統血。漏下色晦及瘀淡不止。千金芎藭湯鹿茸散選用。

月水不通○乳子週歲。而乳母經行。是其常也。若兒半歲而母經行。有血盛血熱之分。血熱者宜治血。四物加續斷條芩。不乳者不在此例。若兒二三歲。其母經不行而無疾。不必服藥。若肢體倦怠。食少內熱。是血少也。宜道遙散加參耆。以健脾胃。若以藥通之則誤矣。若脾胃虛弱。六君子湯加當歸。若兼鬱火傷脾。歸脾湯加丹皮山梔。若怒火傷血。柴胡四物湯。氣血俱虛。八珍湯加丹皮。

諸淋○淋因熱客於脬。虛則頻數。熱則澀痛。氣血兼熱。血入胞中。則血隨小便出而為血淋也。若膀胱虛熱。六味丸若陰虛而陽無以化。腎氣丸。蓋土生金。金生水。當滋化源。若少壯元氣實。強者用滑石通草車前葵子瞿麥蒲黃。漿水煎服。

乳汁○產後三朝。五更發寒熱。名曰蒸乳。若產後乳雖腫而舉作者。須服清利之藥。則乳自行。仍以美臈引之。○產後乳汁自出不止。乃胃氣虛。宜服五味異功散。加黃耆五味以攝之。若乳多滿急痛者。用溫帛熨之。○新產兒未能吮乳。乳汁蓄結。與血氣相搏。而壯熱大渴。通乳脹硬掣痛。名曰妬乳。當以手搗去宿乳。或吮去尤妙。并以貝母枯薑實甘草節木通煎服。初因產子不育。蒸乳而發寒熱作痛者。俗名乳膨。用斷乳法。以四烏湯加炒麥芽一兩。即止。不然。恐內結成癰。多致潰膿。亦有乳囊潰而成危候者。不可不知。○若有子而乳不下者。通草八錢煮猪蹄湯飲之。白蝦汁亦妙。乳母氣血虛而不能蒸乳。八珍湯加黃耆參冬。脾胃虛寒而乳不通者。千金鍾乳湯。寒熱不均。氣道阻逆。而乳不通者。參朮冬散。有熱去鍾乳加漏蘆。因怒火者。道遙散加參耆參冬之類。凡產不蒸乳者。後必有變。須預言之。元氣壯實者。不在此例。○吮乳腫痛。速用枯薑實一枚連襖搗爛。甘草節一寸。乳香一錢。煎成加溫酒服。服後側

卧於床令藥氣行外以天南星生末醋調敷以手揉之自散

瘡瘍瘰癧 結核 陰瘡

金匱云少陽脈滑而數者陰中生瘡陰中蝕瘡爛者狼牙湯洗之○少陰脈滑而數熱結下部也治用狼牙煮湯浸著如蘭浸滲陰中日四遍以解毒殺蟲但用一味以取專功蓋此證多患於瘰癧證必欲逆經閉骨蒸寒熱凡見頰赤中有白斑下脣紅中白點皆陰蝕之候雖用上法及服降火滋陰藥終歸必亡此情志之病非藥可治故仲景但用外法絕不及於湯藥厥有旨哉

胃氣下泄陰吹而正喧此穀氣之實也豬膏髮煎導之○導之者服之使病從小便而出非外用導引之謂詳陰吹正喧婦人恒有之疾然多隱忍不言以故方書不載醫不加察金匱明言胃氣不清穀氣之實所以腹中喧響則氣從前陰吹出如失氣之狀第用豬膏髮煎之治難於推測余治一僕人之婦經閉三月少腹痛貫徹心而見前證不已與夫笑散一服瘀血大下遂不復作又治一貴顯之媳小產後寒熱腹痛亦有前證與炮黑槿肉熬焦黑糖為丸用伏龍肝煮水澄清煎獨參湯送三錢一服結糞大下再進瘀血續行而前證頓止始悟豬膏髮煎皆為逐瘀而設雖皆未用其方而實不離金匱之法也

瘰癧○婦人瘰癧多因憂鬱怒傷損肝脾累累然如貫珠多生於耳之前後項側胸脇間若寒熱腫痛乃肝經氣鬱而為病不可峻用痰藥加味逍遙散若寒熱既止而核不消乃肝經之血亦病四物湯加白朮茯苓柴胡丹皮若飲食減少經事不調為脾胃虧損六君子加香附丹皮柴胡當歸若初生如豆粒附著於筋肉色不變而後漸大腫痛內熱口乾精神倦怠久不消瘡乃肝脾虧損逍遙散歸脾湯健脾土培肝木切不可輕用散堅追毒之劑誤下之必犯病禁經禁若久潰脈浮大邪火盛也面色皎白金起木也皆難治○凡風木之病但壯脾土則木自不能尅矣若行伐肝則脾胃先傷而木反來侮土矣

結核○婦人結核皆因鬱怒虧損肝脾觸動肝火所致非但婦人多鬱患此則小兒胎中受母氣之鬱生後至七八歲外往往有之多結於項側耳前後或發寒熱屬膽經風熱怒火柴胡清肝散加鈎藤山梔以清肝火若結於肉裏其色不變暗熱內熱屬肝火血虛加味逍遙散或結於肢節或累累如貫珠其色不變亦肝火血燥而筋攣急小柴

胡加鈞藤佐以六味丸若時消時作此氣滯而痰結也用歸脾六君二湯以調和脾胃之氣外用一味香附末唾調作餅艾炙乾即易之勿令傷肉常灸自消丹方治痰核用貝母全蠍連皮胡桃肉各百枚同搗蜜丸空心日服彈子大二三丸効又方用羯羊角磁片刮下為末或舊明角琉璃刮下為末尤良每斤入貝母四兩全蠍二兩蜜丸空服服三錢外用皂莢肉入鯽魚腹中煨灰存性蜜和醋調塗大効若潰而肉不腐或肉不生或膿水清稀肌寒肉冷自汗盜汗寒熱內熱面色痿黃食少體倦便利不調者五藏皆虛也但用補中六君益氣養營等湯調補脾胃則各證自退故經云氣傷痛形傷腫慎不可輕用行氣破血之劑

流注○婦人流注多因憂思鬱怒虧損肝脾以致營氣不從逆於肉裏或因腠理不密外邪客之或濕痰流注或跌撲血滯或產後惡露凝積蓋氣流而注血注而凝或生於四肢關節或留於胸腹腰腎或結塊或漫腫皆屬鬱火急用葱熨法內服益氣養營湯未成自消已成自潰須久服無間自然收功若久而腫起作痛肢體倦怠病氣有餘形氣不足尚可調治若漫腫微痛屬形氣病氣俱不足最為難治或不作膿或膿成不潰氣血虛也人參養營湯憎寒畏寒陽氣虛也十全大補湯暈熱內熱陰血虛也四物加參朮作嘔欲嘔胃氣虛也六君子加炮薑食少體倦脾氣虛也補中益氣加茯苓半夏四肢逆冷小便頻數命門火衰也八味丸小便頻數痰盛作渴腎水虧損也六味丸加麥門冬月經過期多日不止肝脾虛也八珍加柴胡丹皮凡潰而氣血虛弱不斂者十全大補煎膏服之久潰而寒邪凝滯不斂者豆豉餅祛散之其潰而內有膿管不斂者用藥腐化之若不補氣血不節飲食不慎起居不戒七情或用寒涼剋伐俱不治

乳癰乳巖○婦人乳癰有內吹外吹上逆下順之異總屬膽胃二經熱毒氣血凝滯故初起腫痛發於肌表肉色焮赤其人表熱發熱或發寒熱或憎寒熱頭痛煩渴引飲加味逍遙散加枯薑霜若至數日之間膿成滿窠稠膿湧出膿盡自愈若氣血虛弱或誤用敗毒久不收斂膿清脈大非大劑開鬱理氣溫補氣血不能收功○丹方治乳癰初起用蒲公英草搗汁和陳酒服以滓敷腫處即消然此施於藜藿之人輒効若高梁七情內鬱所致者良非所宜當用鹿角磁鋒刮屑加麝香溫酒調服若肥或多痰鬱滯者用橘皮摘碎如豆大湯泡淨以飛羅麴拌炒去麴為末黑糖調二錢醇酒服之又方用蟹殼煨存性醇酒服三錢又乳房炊腫用貝母枯薑實甘草節各三錢煎服效已潰加忍