

S 25148

4443

寒温条辨



文祖正訂寒溫條辨卷三

頭痛

太陰少陰有身熱而無頭痛、蓋二經皆不上頭故也、厥陰有頭痛而無身熱、蓋厥陰與太陽會於巔也、若身熱又頭痛、皆屬三陽經也、傷寒太陽頭痛發熱惡寒無汗、麻黃湯頭痛發熱惡寒有汗、桂枝湯陽明頭痛不惡寒反惡熱、白虎湯不大便、調胃承氣湯頭痛甚者必衄、葛根湯去大棗加蔥、白少陽頭痛、頭角痛、或耳中痛、或口苦發熱、或往來寒熱、脈弦數、並宜小柴胡湯、厥陰頭痛嘔而吐沫、吳茱萸湯、又厥陰頭痛脈微浮、爲欲愈、如不愈、小建中湯、若溫病頭痛、或頭脹痛、乃邪

熱鬱結於內上攻頭面三陽斷不可發表輕則神解散清化湯治之重則增損雙解散升降散合內外而治之裏氣一通頭痛自止不可拘傷寒頭痛當解表不可攻裏之例也

麻黃湯 方見裏證門

桂枝湯 方見裏證門

白虎湯 方見裏證門

調胃承氣湯 方見裏證門

葛根湯 方見裏證門

小柴胡湯 方見裏證門

吳茱萸湯 厥陰頭痛嘔而吐沫少陰犯真寒吐利手足厥

煩燥欲死及寒邪入陽明食穀欲嘔者並此方主之

吳茱萸

三錢
揀淨

生薑

三錢

大棗

三枚

人參

一錢

水煎

溫服

厥陰肝也寒邪內格故嘔而吐沫厥陰與督脈會於顛故頭痛少陰腎也腎藏中寒則上格乎陽而為嘔吐經云腎主便腎寒則大便不禁而為利下手足得陽氣而溫內有真寒故令手足厥冷煩燥者陰盛格陽故令陽煩陰燥其證多危故曰欲死吳茱萸辛熱而氣厚專司開豁胸中逆氣經曰氣為陽氣厚為陽中之陽故能走下焦而溫厥陰少陰也臣以生薑散其寒也佐以參棗補中虛也

小建中湯 傷寒三四日心悸而煩及少陰惡寒腹中急痛

此方主之加黃耆蜜炙三錢名黃耆建中湯

白芍

四錢酒炒

桂枝二錢

甘草二錢炙

生薑二錢

大棗二枚

飴糖

三錢

水煎去渣入飴糖溶化服

醫方考曰小建中湯宜用肉桂枝則味薄故用之以解肌桂則味厚故用之以建中也愚按開後人補中益氣無窮之法門此方是也

續論曰桂枝湯中白芍桂枝等分用白芍佐桂枝以治衛氣

小建中湯中白芍

四錢

桂枝二錢

用桂枝佐白芍以治榮氣

更加飴糖以緩其皮故名之曰建中則其功用大有不同耳

神解散

方見發熱門

清化湯

溫病壯熱憎寒體重舌燥口乾上氣喘吸咽喉不

利頭面猝腫目不能開者此方主之

白殭蠶

三錢酒炒

蟬退

十個

金銀花

二錢

澤蘭葉

二錢

廣皮

入分

黃芩

二錢

炒梔

一錢

連翹

一錢

龍胆草

一錢

酒炒元

參一錢

桔梗

一錢

白附子

五分

甘草

五分

大便秘

加酒大黃

四錢

咽痛

加牛旁子

炒研

錢

頭面不腫

去白附

子水煎去渣入蜜酒冷服

其方名清化者以清邪中於上焦而能化之以散其毒也

連翹清心肺之火元參橘甘清氣分之火胆草清肝膽之

火而且沉陰下行以瀉下焦之濕熱殭蠶蟬退散腫消毒定



喘出音，能使清陽上升，銀花清熱解毒，澤蘭行氣消毒，白附散頭面風毒，桔梗清咽利膈，爲藥之舟楫，蜜潤藏府，酒性大熱而散，能引諸涼藥至熱處，以行內外上下，亦火就燥之意也。其中君明臣良，而佐使同心，引導協力，自使諸證悉平矣。

增損雙解散

方見陽毒陰毒目

升降散

方見陰證似陽目

身痛

凡傷寒太陽病，身體痛，骨節痛，若惡寒無汗，脈浮緊者，麻黃湯主之。若脈浮緩，惡風自汗者，桂枝湯和之。若風寒並中，脈浮緊而緩者，大青龍發之。少陰病，身體痛，骨節痛，手足厥脈

沉者附子湯主之然此陰陽二證一般身痛用藥則相去霄

壤浮沉之脈要在指下辨識若誤發少陰經汗必動其血或

從口鼻出或從目出

少陰脈入肺絡心太陽脈起目內眥

則爲下厥上竭而死

或可以當歸四逆湯救之凡一身盡痛發熱發黃頭上汗出

背強小便不利者濕也茵陳蒿湯凡發汗後身疼痛脈沉遲

者桂枝新加湯凡身痛下利清穀者表裏俱寒也原文先救

裏四逆湯次救表桂枝湯若溫病雜氣熱鬱三焦表裏阻隔

陰陽不通身體痛骨節痛以及頭痛項強發熱惡寒惡風目

痛鼻乾不眠脇痛耳聾寒熱而嘔一切表證狀類傷寒實非

風寒外感之邪通宜清熱解鬱以疏利之如神解散芳香散

升降散加味涼膈散增損雙解散之類隨其輕重酌量用之
裏氣一清表氣自透而外證悉平矣故溫病凡見表證者裏
證鬱滯浮越於外也不知者一見身痛頭痛發熱惡寒等證
便以爲傷寒而用麻黃青龍以發其汗則壞病蜂起矣此卽
所謂前一節治法大有天淵之別也王劉兩公其先覺乎

麻黃湯

方見表證門

桂枝湯

方見裏證門

大青龍湯

方見裏證門

附子湯

方見陰證門

當歸四逆湯

手足厥寒陽邪陷內四肢逆冷脈細欲絕陰

盛陽衰此方主之

當歸 二錢

白芍 二錢

桂枝 二錢

細辛 一錢

通草 一錢

甘草

草

一錢四分

大棗

二枚

水煎溫服

加吳茱萸

二錢

生薑

二錢

酒煎名當歸四逆加吳茱萸生薑湯治前証內

有久寒者

手足厥寒脈細欲絕似乎陰證之極蓋由陽邪傳入厥陰榮

分以本虛不能作熱故厥而脈細欲絕也此為陰

陰是指
厥陰經

陽邪故用桂枝細辛以解表白芍甘草以瀉熱當歸以和厥

陰之榮血通草以通太陽之本府使陽邪得從外解原非治

陰寒四逆之藥也故藥宜歸芍以濟陰不宜薑附以劫其陰



也是證也。自表入裏。雖曰傳至厥陰。始終只是陽證。與陰寒
直中三陰不同。故不用四逆湯。而用桂枝湯。加當歸。細辛。這
草耳。明者自知之。

按昔人云。人有陰血虧於陽分。不能盛辛熱者。更宜此湯。主
之。殊不知此惟有陽邪者宜之。若無陽邪而見此證。則是陰
血太虧矣。投之禍不旋踵。蓋細辛爲少陰中表藥。隨桂枝湯
以解肌。加當歸以和榮血。至於通草。甘淡微寒。能瀉丙丁。能
通水道。爲虛寒者禁用。此湯治法。本是和榮血以緩脈。使陽
邪得從肌表而散。或從膀胱而泄也。若循其名以治陰虧寒
中之四逆。則謬甚矣。觀於傷寒論曰。若其人素有久寒者。宜

當歸四逆湯加吳茱萸生薑主之正如四逆散本以散傳經之熱邪腹中痛者方加附子則當歸四逆湯非治陰寒四逆之藥也明矣更有一等固守王道之醫辨證不明遇有厥逆脈細之證不敢用四逆湯但曰用當歸四逆湯極爲穩當不知此湯乃桂枝湯加當歸細辛通草耳細辛隨桂枝湯止能解表通草又能疏通最有力之藥當歸一味果足以治陰寒四逆耶藥不對證果可謂之穩當耶甚矣其不明於製方之理而以外錯誤病也予前所云用方貴明其所以然者正謂此也

茵陳蒿湯方見裏證門

桂枝新加湯

汗後身痛脈沉遲者此方主之以桂枝湯解

汗後之風邪加參芍益不足之血脈亦兩解表裏安

攘外之一法曰新加者因發汗新虛明非桂枝湯中

舊法也

桂枝 三錢 白芍 四錢 甘草 二錢 人參 一錢 生薑 三錢 大

棗 二枚 水煎溫服

四逆湯 方見陰證門

神解散 方見惡寒門

芳香散 方見惡風門

升降散 方見陰證似陽門

加味涼膈散 方見裏證門

增損雙解散 方見陽毒陰毒門

不眠

陽盛陰虛、則晝夜不得臥、陰盛陽虛、則嗜臥不欲起、蓋夜以陰爲主、陰氣盛、則目閉而臥安、若陰爲陽擾、故煩燥而不眠也、溫病熱鬱三焦、陰不敵陽、大渴引飲、煩燥不眠、輕則增損大柴胡湯、重則增損雙解散、兩解表裏之熱毒以治之、若太陽傷寒、脈浮數、身痛無汗、煩燥不眠、大青龍湯、或桂枝麻黃各半湯、若發汗後不眠、脈浮數微熱、煩渴、小便不利、五苓散、若大汗後、胃中乾燥不眠、煩渴欲飲水者、少少與之愈、脈數

大者、白虎湯或竹葉石膏湯不用五苓、又太陽傷寒、脈浮以
火劫汗、亡陽驚狂、起臥不安、桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨
救逆湯、陽明經病、目痛鼻乾不眠、葛根湯、內熱多加黃芩、知
母、若自汗、脈洪數、經府俱熱、煩渴舌燥不眠、白虎湯、若大熱
錯語、呻吟乾嘔不眠、黃連解毒湯、少陽病往來寒熱、口苦心
煩不眠、脈弦數、小柴胡湯、加黃連、梔子、若虛弱人、津液不足、
加酸棗仁、五味子、麥冬、少陰病、得之二三日以上、心煩不眠、
黃連阿膠湯、生雞子黃、凡汗吐下後、煩渴不眠、劇者、懊憹不
眠、此邪熱乘虛、客於胸中、煩熱鬱悶而不得散也、梔子豉湯
凡下後虛煩不眠、參胡溫膽湯、加味溫膽

增損大柴胡湯 方見表裏兼證門

增損雙解散 方見陽毒陰毒門

大青龍湯 方見裏證門

桂枝麻黃各半湯 方見裏證門

五苓散 方見裏證門

白虎湯 方見裏證門

竹葉石膏湯 陽明汗多而渴、衄血、渴飲水、水入即吐、及

傷寒瘥後、虛羸少氣、氣逆欲吐、並此方主之、

竹葉 二錢

石膏 四錢

麥冬 去心

二錢

半夏 二錢

人參 一錢

炙

草 一錢

生薑 二錢

粳米 二錢

水煎溫服

本方去

不眠

八



石膏半夏薑米加柴胡黃芩名人參竹葉湯治汗下後煩熱口渴虛羸少氣之證

竹葉石膏之辛寒以止喘促散餘熱參草粳麥之甘平以益肺胃生津液生薑半夏之辛溫以豁痰飲去嘔逆此虛羸熱逆之良方也

桂枝

回陽定驚

去白芍

恐其損陽

加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

太陽傷寒脈浮

此風寒兩傷也

醫以火迫劫之亡陽

此大汗驚不止也

狂

神乃陽之靈陽衰則亂矣

起臥不安者

煩燥不甯此皆停飲上逆凌心也飲去則心神定矣

此方主之

桂枝

三錢

蜀漆

去腳三錢

龍骨

四錢

牡蠣粉

五錢

炙草

二錢