

金鑑幼科雜病心法

12

雜病 驚風 痢症 疳症 吐症  
瀉症 感冒 痘疫 暑症 霍亂

痢疾 瘧疾 咳嗽 喘症 痰症 疳症 淋症  
肚痛 腹痛 黃疸 水腫 腹脹

○

刪補名醫方論卷七目錄

大承氣湯

小承氣湯

調胃承氣湯

更衣丸

麻仁丸

桃仁承氣湯

抵當湯丸

梔子豉湯

梔子豉加甘草湯

梔子豉加生薑湯

梔子厚朴湯

梔子乾薑湯

瓜蒂散

小陷胸湯

大陷胸湯丸

三物白散

大黃黃連瀉心湯

附子瀉心湯

甘草瀉心湯

生薑瀉心湯

半夏瀉心湯

旋覆代赭石湯

麻黃連軹赤小豆湯

梔子蘘皮湯

茵陳蒿湯

御纂醫宗金鑑卷三十三

刪補名醫方論卷八目錄

小柴胡湯

大柴胡湯

柴胡桂枝湯

黃芩湯

黃連湯

黃連阿膠湯

理中湯丸

乾薑附子湯

茯苓四逆湯

附子湯

四逆湯

通脈四逆湯

白通湯

白通加豬膽汁湯

真武湯

當歸四逆湯

當歸四逆加吳茱萸生薑湯

吳茱萸湯

烏梅丸

赤石脂禹餘糧湯

白頭翁湯

初生門下

目爛○兒生兩目痛難睜胞邊赤爛胎熱攻內用地黃湯清熱外點真金目即明註目爛者胞邊赤爛痛癢難睜因胎中溫熱生夜毒熱上攻於目故有是證內服地黃湯以清熱外用真金散以點目其證自愈

生地黃湯方見目不開

真金散

黃連生

黃蘗生

當歸

赤芍藥各一

杏仁五分炒

右到散乳汁浸一宿晒乾為極細末用生地黃汁調一起頓頓貼服即愈

胎毒○胎上腫起號懸癰皆因胎毒熱上冲法當刺破鹽湯拭如聖一字搽之靈註凡喉裏上膠腫起如蘆撐盛水狀者名曰懸癰蘆撐者蘆

戶也此胎毒上攻須以綿纏長針留鋒刺之瀉去青黃赤汁未消者來日再刺刺後以鹽湯拭口用如聖散或一字搽之

如聖散

鉛霜錢一

真牛黃錢一

太陰元精石

硃砂各二錢五分

龍腦分五

右為極細末每用一字搽患處

一字散

硃砂水飛

硼砂各五分

龍腦

朴硝各一

右為極細末用蜜調少許鵝翎搽口內

重齟○重齟胎熱胃中蓄牙根腫脹痛難禁刺破一字散敷上繼進清胃散如神註重齟者因小兒在胎有熱蓄於胃中故牙根腫如水泡故

曰重齟治法用鐵刺破以鹽湯拭淨外敷一字散內服清胃散其腫自消○一字散方見懸癰

清胃散

生地

丹皮

黃連

當歸

升麻

石膏煨

引用燈心水煎服

方清胃散治胃熱重生地黃連當歸身丹皮升麻石膏煨臨

煎須要入燈心

鵝口○鵝口白屑滿舌心脾溫熱本胎原清熱瀉脾保命少遲糜爛治難痊註鵝口者白屑生滿口舌如鵝之口也由在胎中受母飲食

熱毒之氣蘊於心脾二經故生後遂發於口舌之間治法以清熱瀉脾散主之外用髮蘸井水拭口搽以保命散日敷三次白退自安倘治之

稍遲必口舌糜爛吮乳不得則難痊矣

清熱瀉脾散

山梔炒

石膏煨

黃連炒

生地

黃芩

赤苓

引用燈心水煎服

方清熱瀉脾治鵝口石膏生地赤苓煎苓連梔

子合戒劑加入燈心病即安

保命散

白礬燒灰

硃砂各二錢五分

馬牙硝五錢

右研末以白鵝糞水攪取汁塗舌與口角上

吐舌○吐長收緩名吐舌皆是心經有熱成面紅煩渴赤瀉瀉心導赤服即寧註吐舌者伸長而收緩也因心經有熱所致故面紅煩燥口

湯尿赤宜瀉心導赤湯主之

瀉心導赤湯

木通

生地

黃連

甘草生

引用燈心水煎服

方瀉心導赤湯最良心熱吐舌即堪當木通生地黃連草燈心加入服

弄舌○弄舌時時口內搖心脾熱發口唇焦燥熱舌乾大便穢濁黃導赤並能療兒熱口中搖動者因心脾有熱以致唇焦舌乾煩熱便穢先用瀉黃散次服瀉心導赤湯

瀉黃散 藿香葉 山梔子 石膏 防風 甘草 生 引用燈心水煎服 方弄舌瀉黃散最神藿香葉配山梔仁甘草防風石膏煎

臨時煎服入燈心○瀉心導赤湯方見吐舌

重舌○舌下腫突似舌形心脾積熱上攻衝內服宜以清熱飲外敷涼心功最靈 註重舌者因舌下近舌根處其腫形如舌故名重舌此心脾

之熱宜服清熱飲外吹涼心散

清熱飲 黃連 生地 木通 甘草 生 連翹 去心 蓮子 引用淡竹葉水煎服時時灌入口中 方清熱飲內用黃連生地蓮子不

通甘連翹更加淡竹葉一同煎服自然安

涼心散 青黛 硼砂 黃蘗 黃連 人乳 拌晒 人中白 各二錢 風化硝 錢 冰片 二分 右為極細末吹之甚效

木舌○木舌心脾積熱成腫脹木硬證多凶外用川硝散舌上內服瀉心導赤靈驗木舌一證皆因心脾積熱而成蓋脾之脈絡在舌下又舌

為心苗遇火上沖令兒舌腫滿木硬不能轉動故名木舌外用川硝散敷舌上內用瀉心導赤湯若不急治必致難救

川硝散 朴硝 五分 真紫雪 分 鹽 分 右為細末以竹瀝調敷舌上○瀉心導赤湯方見吐舌

嘔乳○嘔乳之候非一端傷乳停痰胃熱寒熱宜和中清熱飲寒用溫中止吐煎傷乳平胃散最妙停痰二陳湯可痊若是滿而自溢者常須

節乳自能安 註小兒嘔乳證非一端有宿乳停痰胃寒胃熱之分不可一例而治如面色多赤二便微秘手足指熱此為熱嘔也宜和中清熱

飲主之面色青白真青多沫手足指冷此因寒而嘔也宜溫中止吐湯主之口熱唇乾夜臥不寧手足心熱此為傷乳而嘔也宜平胃散主之

胸膈膨脹嘔吐痰涎此因停痰而嘔也宜枳桔二陳湯主之若吃乳過多滿而自溢者不須服藥惟節乳則嘔自止矣

和中清熱飲 黃連 薑炒 半夏 薑製 陳皮 茯苓 藿香 砂仁 引用薑水煎服 方和中清熱飲黃連半夏陳皮茯苓藿香砂仁

合成劑水煎徐服可安全

溫中止吐湯 白豆蔻 研 茯苓 半夏 薑製 生薑 水煎沖磨沉香汁服 方溫中止吐白豆蔻茯苓半夏共生薑臨服沉香汁加入專

治嘔乳自寒傷

平胃散 蒼朮 炒 陳皮 厚朴 炒 甘草 炙 麥芽 炒 砂仁 研 引用薑水煎服 方小兒傷乳多吐嘔平胃調和功可見蒼陳厚朴甘

草倍加入麥炒薑一片

枳桔二陳湯 枳殼 炒 桔梗 陳皮 半夏 薑製 茯苓 甘草 炙 引用薑水煎服 方停痰嘔乳不能安枳殼二陳湯最先枳桔陳半苓

甘草生薑加入即時痊

鈎藤飲 川芎 白當歸 茯神 白芍炒 茯苓 甘草 木香煨 鈎藤鈎  
 引用紅棗水煎服 方夜啼之證因脾寒須服鈎藤飲可痊

鈎藤鈎 引用紅棗水煎服 歌<sup>方</sup>夜啼之證因脾寒須服鈎藤飲可痊

胎黃○兒生偏體色如金溼熱重蒸胎受深法當溼兼清熱地黃犀角二方神註胎黃者偏體面目皆黃其色如金乃孕婦溼熱太盛小兒

生地黃湯 生地黃 赤芍藥 川芎 當歸 天花粉 赤茯苓 澤瀉 猪苓 甘草 茵陳蒿 引用燈心水煎服 歌胎黃須用

澤瀉 猪苓 甘草生 茵陳蒿 引用燈心水煎服 歌胎黃須用

犀角散 犀角鎔 茵陳蒿 枳實根 升麻 甘草生 龍胆草 生地 寒水石煅 水煎不拘時服 歌方胎黃又有犀角散甘草犀角

與茵陳升麻胆草生地共寒水石同梧蔓根

胎赤胎中受毒發生後復體老丹毒清熱解毒湯最妙新氏化毒以效殊言胎赤者因孕婦過食辛熱之物以致毒熱凝結蘊於胎中

清熱解毒湯 生也 黃連 金銀花 薄荷 桑葉 連翹 赤芍 木通 甘草 生 川芎 燈心 水 送下 豆 通 月 骨 骨 老 丹 毒 名 目 月 骨 骨 以 汗 毒 解 毒 湯 主 之 熱 盛 傳 邪 未 病 以 什 毒 丹 主 之 遠 今 小 兒 生 下 豆 通 月 骨 骨 老 丹 毒 名 目 月 骨 骨 以 汗 毒 解 毒 湯 主 之 熱 盛 傳 邪 未 病 以 什 毒 丹 主 之

建金銀花薄荷建翹桑芍藥木通甘草燈心加  
正氣

犀角 黃連 桔梗 元參 薄荷

赤游風○赤游胎中熱毒成皮膚赤腫偏身行頭面四肢皆可治若歸心腹命難生內服犀角散葉散外用之去敷神力百日之內忌發血貼

塗二法可安寧註小兒赤游風證多由胎中毒熱而成或生後過於溫暖毒熱蒸發於外以致皮膚赤熱而腫也若塗丹游走不定行於偏身

故名曰赤遊風多發於頭面四肢之間若內歸心腹則死治法當服犀角解毒飲如不愈繼以藍葉散外用砭法刺出毒漿甚者數以神功散

毒輕者不用敷藥在百日內者小兒忌破血以其肌肉難住也須用猪肉貼法或以赤小豆末雞子清調塗之甚效

犀角解毒飲 牛蒡子炒 犀角 荊芥穗 防風 連翹去心 金銀花 赤芍藥 生甘草 川黃連 生地黃 引用燈心水煎服

犀角解毒藥最良牛蒡犀角合荆防連翹銀花赤芍藥甘草川連生地黃

藍葉散 藍葉錢五 黃芩 犀角屑 川大黃剉微炒 柴胡 梔子各二錢生 川升麻錢一 石膏錢 生甘草錢 右為粗末每服一錢水一小

杯煎五分去渣兌竹瀝一酒杯煎三兩沸放溫量兒大小用之氣怯弱者可去大黃

砒血法 口吮毒血各聚一處用細磁器擊碎取鋒芒者將箸頭磨開夾住用線縛定兩指輕撮筋稍令磁鋒對聚血處再用筋一根頻擊刺

出毒血砒後毒甚者以神功散敷之毒輕者砒後不可用恐皮膚既破草烏能作痛也如患在頭者不用砒法祇宜卧針倒挑患處出則愈

神功散 黃藥炒 草烏生 右各為末等分用救口水調敷頻以救口水潤之

猪肉貼法 用生猪肉切片貼於赤腫處數更換

塗法 生赤小豆不拘多少研為細末用雞子清調塗患處乾則再塗

初生無皮○兒生無皮有二端父母梅毒道染傳或因未足月生早無皮亦爛痛難堪梅毒換肌消毒散胎怯當歸飲能痊外敷清涼鵝黃粉

毒解形完膚自堅註嬰兒生下無皮其證有二或因父母素有楊梅結毒傳染胎中故生下或上半身赤爛或下半身赤爛甚至色帶紫黑又

有因月分未足生育太早偏體浸漬紅嫩而光二證俱屬惡症遺毒者內服換肌消毒散外用清涼膏或鵝黃散敷之胎元不足者內服當歸

飲外用稻米粉撲之毒解形完者謂解去毒氣其皮自漸漸生完而堅實矣

換肌消毒散 當歸 生地黃 赤芍藥 川芎 皂刺 土茯苓 金銀花 連翹去 甘草生 白芷 苦參 白鮮皮 防風 引用

燈心水煎服 無皮換肌消毒治四物皂刺土茯苓銀花連翹草白芷苦參白鮮皮共防風

當歸飲 何首烏製 白鮮皮 白蒺藜 甘草 當歸 生地黃 白芍藥 人參 黃耆 川芎 水煎服 當歸飲治兒無皮面白

肢冷服最宜首烏鮮皮白蒺藜甘草四物共參看

清涼膏 石灰四兩未經水濕成塊者 用水泡之沒指半許露一宿面上有浮起如雲片者輕輕取之微帶清水視其多寡對小磨香油亦如之以順

攪成膏為度用雞翎搽之自愈

鵝黃散 黃藥生 石膏各等 共研為細末撲之溼則乾撲乾則用猪苦胆調搽

撲粉法 早稻白米作粉時時撲之其皮漸生神效

變蒸○萬物春生夏熟長兒生同此變形神三十二天為一變六十四日為一蒸變長百骸生藏府蒸增智慧發聰明十八五百七十六變蒸

既畢形神咸變蒸之狀身微熱耳尻骨冷無病情註天地生化萬物必以春溫夏熱兒之初生變生形神亦同此理自生之日至三十二日曰

一變至六十四日曰一蒸變則長其百骸生其藏府蒸則增其智慧發其聰明也曰十八五百七十六者謂十變五蒸之外又有三大蒸合計

五百七十六日也變蒸既畢形神具足此後不復變蒸矣然每變蒸之時其狀惟身微熱耳冷尻骨冷而無他病情狀蓋以陰陽和變生化形

神故無他病情狀也身微熱者以陰陽氣盛之氣變蒸而然也耳尻冷者耳尻屬陰以陽不勝陰而與陰和之象故不熱也 按變蒸既曰生五

臟六腑次序又曰包絡三焦二經俱無形狀故不變不蒸夫胞絡乃周身脂膜聯絡百骸藏腑者三焦乃軀殼內氣充滿百骸藏腑者變蒸時宜

獨不及之則其說不經細閱靈素自知所辨以偽諸者

驚風門

驚風總括○心主驚分肝主風心熱肝風作急驚素虛藥峻因成慢吐瀉後起慢脾風急驚陽症有實象慢脾陰症有虛形慢驚半陰半陽證虛實寒證要詳明註心藏神心病故主驚也肝屬木肝病故主風也凡小兒心熱肝盛一觸驚受風則風火相搏必作急驚之證也若素稟不足或因急驚用藥過峻暴傷元氣每致變成慢驚之證更有因吐瀉既久中氣大虛脾土衰弱肝木乘虛而內生驚風者名曰慢脾風也三者致病之因既不同故所現之證亦各異急驚屬陽必有陽熱有餘等實象也慢脾屬陰必有陰冷不足等虛象也至於慢驚初得之時陰陽尚未過損或因急驚傳變而成其中常有夾痰夾熱等證故屬半陰半陽不比慢脾純陰之病也治者須詳分虛實寒熱以治之庶不致誤矣

驚風八候○驚風八候搐搦掣顛反引竄視之名肘臂伸縮名為搐十指開合搦狀成勢若相撲謂之掣顛則頭筋動搖鈴反張身仰頭向後引後兩手若開弓竄則目直而似怒視則覩物不轉睛內外左右分順逆須識急慢證皆同八候謂搐搦掣顛反引竄視是也搐謂肘臂伸縮搦謂十指開合掣謂肩頭相撲顛謂手足動搖反者身仰向後引者手若開弓竄則目直而似怒視則睛露而不活其搐以男左手女右手男大指在外女大指在內為順反是為逆此候急驚慢驚同皆見之虛實無所具焉治者宜切記之

通關急救法○驚風搐搦神昏憤痰壅氣塞在心胸急用通關吹入鼻無嚏則死有嚏生註驚風搐搦必神氣昏憤痰壅氣塞結胸中而致急用通關散入鼻內無嚏者不治有嚏者審其表裏虛實隨證治之

通關散 半夏生 皂角 細辛 薄荷各等 共為細末用筆管吹入鼻內少許

急驚風○急驚觸異心驚熱或因風鬱火生風暴發痰盛或熱極壯熱煩急面唇紅赤痰涎壅氣促牙關緊急二便秘瀉脈數洪驚用鎮驚風至寶牛黃攻痰涼膈清平治羌活瀉青等化痰導赤共涼驚註急驚風一證有因目觸異物耳聞異聲神散氣亂而生者有因心肝火盛外為風寒鬱閉不得宣通而生者有因痰盛熱極而內動風者然證多暴發壯熱煩急面唇紅赤亦痰壅氣促牙關緊急二便秘瀉脈急者當緊急不能開也二便秘瀉者大便秘結而小便澀難也脈洪數者主陽熱也觸異致驚者清熱鎮驚湯安神鎮驚丸主之火鬱生風者至寶丹主之痰盛生驚者牛黃丸攻下之熱極生風者涼膈散清解之病不甚者則用平治之法風熱者羌活散主之肝熱者瀉青丸主之痰兼熱者清熱化痰湯主之心經熱者導赤散涼驚丸主之惟在臨證者審而用之

清熱鎮驚湯 柴胡 薄荷 麥冬法 梔子 川黃連 龍胆草 茯神 鉤藤鈎 甘草生 木通 引加燈心竹葉調硃砂末服 歌方

清熱鎮驚治外驚藥胡薄荷麥冬法 梔子黃連龍胆草茯神鉤藤草木通

安神鎮驚丸 天竺黃 茯神各五 胆星 桑仁炒 麥冬法 赤芍 當歸各三 薄荷葉 黃連 辰砂 牛黃 梔子 木通 龍

骨各三 錢 青黛一錢 右為細末煉蜜丸如菜豆大赤金箔為衣量兒大小與之淡薑湯化下

生  
滑石 全蠍去毒 細辛 天麻 白附子 羌活 殭蠶炒 川連 獨活 黃蘗名等分 右共為細末煉蜜為丸每丸重五分量兒

牛黃丸 黑牽牛 白牽牛各七錢半 胆星 枳殼炒 半夏各五錢 薑製 牙皂二錢 去皮 大黃半兩 右研細末煉蜜為丸每丸重五分量兒

涼膈散 黃芩 大黃 連翹 心去 芒硝 甘草 生 梔子 薄荷 引用竹葉生蜜煎服 無汗者加防風羌活 歌涼膈散治膈熱盛梔

羌活散 羌活 防風 川芎 薄荷 天麻 殭蠶炒 甘草生 川黃連 柴胡 前胡 枳殼炒 桔梗 引用生薑水煎服

瀉青丸  
龍胆草炒  
梔子  
大黃煨  
羌活  
防風各一錢  
川芎半錢  
右研末煉蜜為丸如梧桐子大竹葉薄荷湯調下

清熱化痰有橘紅麥冬半頁赤茯苓黃芩竹茹生甘草川連枳桔胆南星○瀉心導赤湯方見本舌

急驚後調理法○急驚之後尚未清痰熱琥珀抱龍靈神虛氣弱痰兼熱清心滌痰大有功註急驚多用寒涼之藥亦急則治標之法但得痰

琥珀抱龍丸  
人參  
琥珀  
茯神錢各五  
山藥炒一兩  
甘草四兩  
檀香錢三  
天竺黃  
枳殼炒  
枳實錢各五  
辰砂錢三  
胆星錢五  
赤

清心瀉痰湯 竹茹 橘紅 半夏薑製 茯苓 枳實炒 甘草生 麥冬心 棗仁炒 人參 菖蒲 南星 川黃連 引用生薑水煎

慢驚風○慢驚多緣稟賦弱或因藥峻損而成緩緩搐搦時作止面白青身則溫昏睡眼合睛或露胎遲神慘大便青氣虛痰疾醒脾效脾

色淡黃或青白相兼身必溫和昏睡眼合或睡臥露睛脈來遲緩神氣慘慘大便秘青色此乃脾胃虛弱治宜培補元氣為主虛而夾痰者醒脾

湯主之脾虛肝旺者緩肝理脾湯主之

醒脾湯 人參 白朮<sub>炒土</sub> 茯苓 天麻 半夏<sub>製薑</sub> 橘紅 全蠍<sub>去毒</sub> 殭蠶<sub>炒</sub> 甘草<sub>炙</sub> 木香 倉米 胆南星 引用生薑水煎服

經肝脾虛緩肝湯桂枝參苓芍藥良陳皮山藥扁豆草煎服之時入棗薑

火熱夾痰慢驚○慢驚火熱或夾痰身熱心煩口溢涎宜以清心滌痰治白丸柴芍六君煎  
涎上泛咽喉氣粗身熱心煩所謂虛火痰熱是也痰熱相兼者清心滌痰湯主之脾虛肝旺痰盛者青州白丸  
清心滌痰湯方見急驚後調理法

青州白丸 生川烏五錢去 生半夏七兩 南星三兩 白附子二兩 右為末盛生絹袋內用井花水攪出粉末盡再攪以粉盡為度

置磁盆內日晒夜露每早撒去舊水別用新水攪春五日夏三日秋七日冬十日去水晒乾研為細末用糯米粉煎粥清丸柴芍大每服三

五丸薄荷湯送下

柴芍六君子湯 人參 白朮炒 茯苓 陳皮 半夏製 甘草炙 柴胡 白芍炒 鈎藤鈎 引用薑水煎服 歌脾虛木旺風痰盛

四君人參朮苓痰盛陳半因加入肝風更用柴芍藤

慢脾風○肝盛脾衰金氣弱金失承制木生風每因吐瀉傷脾胃閉目搖頭面唇青額汗昏睡身肢冷古短聲啞嘔澄清溫中補脾為主刺固

真理中隨證從 慢脾風一證多緣吐瀉既久脾氣大傷以致土虛不能生金金弱不能制木肝木強盛惟脾是尅故曰脾風閉目搖頭面唇

青額汗昏睡四肢厥冷古短聲啞嘔清水此乃純陰無陽之症逐風則無風可逐治驚則無驚可治惟宜大補脾土生胃回陽為主吐瀉

無陽者溫中補脾湯主之大病後成者固真湯主之四肢厥冷者理中湯加附子主之

溫中補脾湯 人參 黃耆炙 白朮炒 乾薑 附子製 半夏製 陳皮 茯苓 砂仁 肉桂去粗 白芍炒 甘草炙 丁香 引用

煨薑水煎服 歌慢脾溫中補脾湯參耆白朮共乾薑陳半附苓縮砂桂白芍甘草共丁香

固真湯 人參 白朮炒 肉桂去粗 白茯苓 山藥炒 黃耆炙 甘草炙 附子去皮 引用薑水煎服 歌固真湯治慢

脾風人參白朮桂苓山藥黃耆煨甘草附子浸泡最宜精○理中湯方見不乳

痢證門

痢證總括○小兒痢證類應發時皆倒搐延聲食頃即甦如無病陰陽驚熱痰食風 註痢證類乎驚風瘧風者謂時皆倒抽搐痰涎壅盛氣

促作聲驚鬱二證相似也但四體柔軟一食之頃即醒依然如無病之人非若瘧風一身強硬終日不醒也陰者陰痢也見藏陰證陽者陽

痢也見府陽證驚痢因驚熱痰痢因痰食痢因食風痢因風其證不一治亦不同臨證宜詳辨之

陰痢○陰痢屬肢厥厥冷偃卧拘急面白青吐沫聲微脉沉細醒脾固真定痢靈 註陰痢屬陰藏寒之病也多因慢驚之後痰入心包而得發

和藥醫宗示人參白茯苓白芍藥白朮炒陳皮山藥扁豆研甘草 引用煨薑大棗水煎服

時手足厥冷僵卧拘急面色青白口吐涎沫聲微小脉來沉細輕者醒脾湯甚者固真湯病退調理用定癇丹主之  
醒脾湯方見慢驚門○固真湯方見慢脾風

定癇丹 人參<sup>三錢</sup> 當歸<sup>三錢</sup> 白芍<sup>三錢</sup> 茯神<sup>各五錢</sup> 棗仁<sup>各五錢</sup> 遠志<sup>三錢</sup> 琥珀<sup>三錢</sup> 天竺黃<sup>四錢</sup> 白朮<sup>五錢</sup> 橘紅<sup>半</sup> 半夏<sup>製</sup> 天麻<sup>各</sup>

鈎藤<sup>鈎四錢</sup> 甘草<sup>二錢</sup> 右共為細末煉蜜丸如梧子大每服一丸淡薑湯化服

陽癇○陽癇屬府身熱汗仰面赤脉數洪急啼叫吐涎沫龍胆瀉青與抱龍<sup>註陽癇屬陽府熱之病也多因急驚去風下痰不淨久而致成此證發時身熱自汗仰面赤脉洪數牙關緊急或啼叫不已口吐涎沫如風兼熱者用龍胆湯肝經熱者用瀉青丸痰涎壅者用四製抱龍丸主之○龍胆湯方見慢脾風○瀉青丸方見急驚風</sup>

四製抱龍丸 天竺黃<sup>五錢</sup> 辰砂<sup>二錢</sup> 胆星<sup>一兩</sup> 雄黃<sup>二錢</sup> 麝香<sup>一分</sup> 右為極細末另用麻黃款冬花甘草各五錢煎湯去渣滓漫火熬成膏

合樂末為丸如芡實大每服一丸薄荷湯化下

驚癇○驚癇觸異驚神氣吐舌急叫面白紅發作如人將捕狀安神大青鎮驚靈<sup>註小兒心肝熱盛偶被驚邪所觸因而神氣潰散遂成癇證發時吐舌急叫面色乍紅乍白悚惕不安如人將捕之狀先服大青膏次服鎮驚丸則癇自定矣</sup>

大青膏 天麻<sup>三錢</sup> 白附子<sup>二錢</sup> 青黛<sup>一錢</sup> 蠅尾<sup>一錢</sup> 硃砂<sup>一錢</sup> 天竺黃<sup>二錢</sup> 麝香<sup>分三</sup> 烏梢蛇肉<sup>一錢</sup> 酒<sup>浸焙乾</sup> 右同研細煉蜜和膏每服大兒五分小兒三分薄荷湯化服

鎮驚丸 茯神<sup>各五錢</sup> 麥冬<sup>各五錢</sup> 辰砂<sup>二錢</sup> 遠志<sup>二錢</sup> 石菖蒲<sup>各三錢</sup> 棗仁<sup>各三錢</sup> 牛黃<sup>一錢</sup> 川黃連<sup>三錢</sup> 鈎藤<sup>鈎五錢</sup> 胆星<sup>五錢</sup> 天竺黃<sup>五錢</sup> 珍珠<sup>五錢</sup>

錢二 犀角<sup>錢三</sup> 甘草<sup>生二錢</sup> 右共研細末煉蜜為丸每丸重五分量兒與之用淡薑湯下

痰癇○痰癇平素自多痰發時痰壅在喉間氣促昏倒吐痰沫一捻金與滾痰丸<sup>註痰癇者因小兒平素痰壅或偶因驚熱遂致成癇發時痰涎壅塞喉間氣促昏倒口吐痰沫宜先服一捻金以急下其痰次服硃衣滾痰丸則氣順痰清而癇自止矣○一捻金方見不乳</sup>

硃衣滾痰丸 礞石<sup>一兩</sup> 沉香<sup>五錢</sup> 黃芩<sup>七錢</sup> 大黃<sup>一兩</sup> 右為細末水浸為丸硃砂為衣多寔量兒大小白滾水化服

食癇○食癇食過積中腕一時痰熱使之然面黃腹滿吐痢臭妙聖滾痰和胃安<sup>註食癇者其病在脾因小兒乳食過度停結中腕乘一時痰熱壅塞遂致成癇其初面黃腹滿吐痢酸臭後變時時發搐宜用妙聖丹主之痰盛者硃衣滾痰丸主之後用清熱和胃丸調理則積滯清而驚癇定矣</sup>

驚癇定矣

妙聖丹 雄黃<sup>一錢</sup> 蜈蚣<sup>一錢</sup> 硃砂<sup>各一錢</sup> 代赭石<sup>各一錢</sup> 巴豆<sup>三個</sup> 杏仁<sup>一錢</sup> 右共為細末蒸棗肉丸如桐子大每服三五丸木香煎湯化服○硃衣滾痰丸方見痰癇

清熱和胃丸 川連<sup>五錢</sup> 梔子<sup>五錢</sup> 竹茹<sup>四錢</sup> 麥冬<sup>五錢</sup> 連翹<sup>四錢</sup> 山楂<sup>一兩</sup> 神曲<sup>一兩</sup> 陳皮<sup>一兩</sup> 枳實<sup>一兩</sup> 黃芩<sup>一兩</sup> 甘草<sup>一兩</sup> 右共為細末煉蜜和膏每服大兒五分小兒三分薄荷湯化下

清熱和胃丸 川連<sup>五錢</sup> 梔子<sup>五錢</sup> 竹茹<sup>四錢</sup> 麥冬<sup>五錢</sup> 連翹<sup>四錢</sup> 山楂<sup>一兩</sup> 神曲<sup>一兩</sup> 陳皮<sup>一兩</sup> 枳實<sup>一兩</sup> 黃芩<sup>一兩</sup> 甘草<sup>一兩</sup> 右共為細末煉蜜和膏每服大兒五分小兒三分薄荷湯化下

清熱和胃丸 川連<sup>五錢</sup> 梔子<sup>五錢</sup> 竹茹<sup>四錢</sup> 麥冬<sup>五錢</sup> 連翹<sup>四錢</sup> 山楂<sup>一兩</sup> 神曲<sup>一兩</sup> 陳皮<sup>一兩</sup> 枳實<sup>一兩</sup> 黃芩<sup>一兩</sup> 甘草<sup>一兩</sup> 右共為細末煉蜜和膏每服大兒五分小兒三分薄荷湯化下

清熱和胃丸 川連<sup>五錢</sup> 梔子<sup>五錢</sup> 竹茹<sup>四錢</sup> 麥冬<sup>五錢</sup> 連翹<sup>四錢</sup> 山楂<sup>一兩</sup> 神曲<sup>一兩</sup> 陳皮<sup>一兩</sup> 枳實<sup>一兩</sup> 黃芩<sup>一兩</sup> 甘草<sup>一兩</sup> 右共為細末煉蜜和膏每服大兒五分小兒三分薄荷湯化下

清熱和胃丸 川連<sup>五錢</sup> 梔子<sup>五錢</sup> 竹茹<sup>四錢</sup> 麥冬<sup>五錢</sup> 連翹<sup>四錢</sup> 山楂<sup>一兩</sup> 神曲<sup>一兩</sup> 陳皮<sup>一兩</sup> 枳實<sup>一兩</sup> 黃芩<sup>一兩</sup> 甘草<sup>一兩</sup> 右共為細末煉蜜和膏每服大兒五分小兒三分薄荷湯化下

風癰○風癰出風囊經二目青點面淡紅十指屈伸如數物化風是活年黃丸主之  
紅手如數物治法先宜疎風解表輕則化風丹主之重則羌活桂枝湯主之風兼痰者半黃丸主之

化風丹 胆星錢 羌活 獨活 天麻 防風 甘草生 荆芥穗 人參 川芎各一錢 右共為細末煉蜜丸皇子大每服一丸薄荷湯

化開服

羌活桂枝湯 羌活 防風 麻黃 桂枝 天麻 大黃 甘草生 引用生薑水煎服 羌活桂枝治風癰疎風瀉熱妙難言羌防麻

桂天麻草大黃煎服自然安

牛黃丸 胆星 全蠍各二錢 蟬退錢半 防風 牛黃 白附子生 僵蠶炒 天麻各一錢 麝香研 右為細末煎藥去核皮取肉和丸

如茶豆大每服三五丸生薑湯化服

卷五十二

編輯幼科雜症心法要訣

疳證門

疳證總括○大人為勞小兒疳乳食傷脾是病原甘肥失節生積熱氣血津液被熱煎初患尿汗潮熱日久青筋肚大堅面色青黃肌肉瘦  
皮毛憔悴眼睛腫大人者十五歲以上也病則為勞若十五歲以下者皆名為疳緣所稟之氣血虛弱藏府嬌嫩易於受傷或因乳食過飽或  
因肥甘無節停滯中脘傳化邊滯腸胃漸傷則生積熱熱盛成疳則消耗氣血煎灼津液凡疳病初起尿如米泔午後潮熱日久失治令青筋  
暴露肚大堅硬面色青黃肌肉消瘦皮毛憔悴眼睛發腫而疳證成矣然當分其所屬而治之庶不致有誤也

脾疳○脾疳面黃肌消瘦身熱困倦喜睡眠心下痞硬滿腫脹卧冷食泥腹痛堅頭大頸細食懶進吐瀉煩渴便腥黏攻積消疳肥兒治補脾  
參苓白朮先註脾屬土色黃主肌肉故脾疳則見面黃肌肉消瘦身體發熱困倦喜睡心下痞硬乳食懶進睡卧喜冷好食泥土肚腹堅硬疼  
痛頭大頸細有時吐瀉口乾煩渴大便腥黏之證也宜先攻其積用消肝理脾湯肥兒丸主之積退然後調理其脾以參苓白朮散主之

消肝理脾湯 蘇莢 三棱 莪朮 青皮炒 陳皮 蘆薈 枳榔 使君子肉 甘草生 川黃連 胡黃連 麥芽炒 神麴炒 引

用燈心水煎服 歌消疳理脾用無義三棱莪朮青陳皮蘆薈枳榔使君子肉連黃連麥芽麴

肥兒丸 人參半錢 白朮五錢 茯苓錢 黃連二錢 胡黃連五錢 史君子肉四錢 神麴炒 麥芽炒 山查肉各三錢 甘草錢半 蘆薈

右為末黃米糊丸如黍米大每服二三十九米湯化下

參苓白朮散 人參錢 白朮炒 茯苓錢 扁豆炒 薏米炒 山藥各五錢 陳皮錢 縮砂 桔梗各二錢 甘草一錢 建連子五錢 右共

為細末每服一錢老米湯調服

痢瀉○痢疾傷脾因作瀉先清後補為妙初宜清熱和中湯久瀉參苓白朮提註痢瀉之證多緣積熱傷脾以致水穀不分頻頻作瀉法宜清熱參瀉以清熱和中湯主之若瀉久不愈當漸為調理參苓白朮散主之

清熱和中湯 白朮<sup>炒</sup> 陳皮 厚朴<sup>炒</sup> 赤苓 黃連 神麴<sup>炒</sup> 穀芽<sup>炒</sup> 使君子 生甘草 澤瀉 引用燈心水煎服 痢久泄瀉名痢瀉清熱和中功甚捷白朮陳厚亦各連神麴史君草澤瀉

參苓白朮散 方見脾病 痢腫脹○痢疾腫脹面浮光傳化失宜脾肺傷氣逆喘咳胸膈滿御苑勻氣服最良註痢疾腫脹之證多因傳化失宜以致脾肺兩傷現證氣逆喘咳胸膈滿御苑勻氣服最良註痢疾腫脹之證多因傳化失宜以致脾肺兩傷現證氣

逆喘咳胸膈滿御苑勻氣服最良註痢疾腫脹之證多因傳化失宜以致脾肺兩傷現證氣逆喘咳胸膈滿御苑勻氣服最良註痢疾腫脹之證多因傳化失宜以致脾肺兩傷現證氣逆喘咳胸膈滿御苑勻氣服最良註痢疾腫脹之證多因傳化失宜以致脾肺兩傷現證氣

御苑勻氣散 桑皮<sup>炒</sup> 桔梗 赤苓 甘草<sup>生</sup> 藿香 陳皮 木通 引用薑皮燈心水煎服 痢久脾虛腫脹生御苑勻氣有奇功 桑皮桔梗亦各草藿香陳皮木通

痢痢○痢疾日久頻下痢多緣腸胃熱凝滯或赤或白腹窘急香連導滯為妙劑註痢痢之由皆因熱結腸胃所致故痢時或赤或白腹中窘痛急用香連導滯湯治之其痢自愈 香連導滯湯 青皮<sup>炒</sup> 陳皮 厚朴<sup>製</sup> 生甘草 川黃連<sup>炒</sup> 山查 神麴<sup>炒</sup> 木香<sup>煨</sup> 檳榔 大黃 引用燈心水煎服 痢久

下痢名痢痢者連導滯功最良青陳厚朴川連草薤白香枳大黃 肝痢○肝痢面目赤甲青眼生眵淚澀難睜搖頭揉目合面卧耳流膿水濕瘡生腹大青筋身羸弱燥渴煩急蓋需青清熱柴胡同蘆會調養道連抑肝靈註肝屬木色青主筋助肝則見面目赤甲青眼生眵淚澀難睜搖頭揉目合面卧耳流膿水濕瘡生腹大青筋身羸弱燥渴煩急蓋需青清熱柴胡同蘆會調

燥渴煩急蓋需青清熱柴胡同蘆會調 燥渴煩急蓋需青清熱柴胡同蘆會調 燥渴煩急蓋需青清熱柴胡同蘆會調 燥渴煩急蓋需青清熱柴胡同蘆會調 燥渴煩急蓋需青清熱柴胡同蘆會調

柴胡清肝散 銀柴胡 梔子<sup>炒</sup> 連翹<sup>心</sup> 生地黃 胡黃連 赤芍 龍胆草 青皮<sup>炒</sup> 甘草<sup>生</sup> 引用燈心竹葉水煎服 痢柴胡清肝治肝痢銀柴梔子翹胡連生地赤芍龍胆草青皮甘草一同煎

蘆會肥兒丸 五穀蟲<sup>炒</sup> 蘆會<sup>生</sup> 胡黃連<sup>炒</sup> 川黃連<sup>各一兩</sup> 銀柴胡<sup>一兩二錢</sup> 扁豆<sup>炒</sup> 山藥<sup>各二兩</sup> 南山查<sup>二兩</sup> 蛇蛻<sup>四個</sup> 肉豆蔻<sup>七錢</sup> 枳榔<sup>五錢</sup> 使君子<sup>二錢</sup> 神麴<sup>二兩</sup> 麥芽<sup>一兩六錢</sup> 鶴虱<sup>八錢</sup> 燕莢<sup>一兩</sup> 硃砂<sup>二錢</sup> 麝香<sup>二錢</sup> 共研細末醋糊為丸

如黍米大每服一錢米飲下 加味逍遙散 茯苓 白朮<sup>炒</sup> 當歸 白芍<sup>炒</sup> 柴胡 薄荷 炙甘草 丹皮 梔子<sup>炒</sup> 引用薑棗水煎服 痢加味逍遙散如神茯苓

白朮當歸芍藥散 茯苓 白朮<sup>炒</sup> 當歸 白芍<sup>炒</sup> 柴胡 薄荷 炙甘草 丹皮 梔子<sup>炒</sup> 引用薑棗水煎服 痢加味逍遙散如神茯苓

白朮當歸芍藥散 茯苓 白朮<sup>炒</sup> 當歸 白芍<sup>炒</sup> 柴胡 薄荷 炙甘草 丹皮 梔子<sup>炒</sup> 引用薑棗水煎服 痢加味逍遙散如神茯苓