

丹溪心法卷之四

新安吳勉學校

痿五十六

口痿病斷不可作風治而用風藥

有濕熱

濕疫

氣虛

血虛

瘀血

濕熱

東垣

健步丸

加燥

濕降

陰火蒼朮黃芩黃柏牛膝之類

濕疫二陳湯加蒼

朮

米白朮黃芩黃柏竹瀝姜汁

氣虛四君子湯加黃

芩黃柏蒼朮之類

血虛四物湯加黃柏蒼朮煎送

補陰丸

亦有食積死血妨碍不得下降者大率屬

熱用參朮四物湯黃柏之類



丹溪心法卷之四

新安吳勉學校

痿五十六

口痿病斷不可作風治而用風藥 有濕熱 濕疫

氣虛 血虛 瘀血 濕熱東垣健步丸加燥濕降

陰火蒼朮黃芩黃柏牛膝之類 濕疫二陳湯加蒼

朮白朮黃芩黃柏竹瀝姜汁 氣虛四君子湯加黃

芩黃柏蒼朮之類 血虛四物湯加黃柏蒼朮煎送

補陰丸 亦有食積死血妨碍不得下降者大率屬

熱用參朮四物湯黃柏之類



附錄謹按五癆等証特立篇目所論致詳後代諸
方獨於此証蓋多缺略取其由皆因混入中風條
內故也丹溪先生痛千古之弊憫世之罹此疾者
多誤于庸醫之手有忘之士必當究其心焉夫陳
無澤謂癆因內藏不足所致誠得之矣然癆之所
不足乃陰血也而方悉是補陽補氣之劑寧免實
實虛虛之患乎且無擇以三因立方可謂諸方之
冠其餘此証尤且未明况求於他者乎

附方 健步丸 東垣方

切乙酒洗

羌活

柴胡

滑石炒

甘草

瓜蒌根

酒洗各半

澤瀉

防風

苦參

酒洗

川烏

各一肉桂

五

右為末酒糊為丸梧桐子大每服七十九丸葱白煎

愈風湯下

見中風類

補陰丸

見諸虛類

清燥湯

治濕熱成痿以燥金受濕熱之邪是紀寒

水生化之源源絕則腎虧痿厥之病大作腰已下

痿軟癱瘓不能動

黃芪

五

蒼朮

一

白朮

橘皮

澤瀉

各半

人參

白茯苓

升麻

各三



麥門冬

歸身

生下 曲末

猪苓 各二分

酒栢

柴胡 黃連 各

五味子

大箇

甘草 炙二分

右每服半兩水煎空心服

厥五十七

附手足十指麻木

口厥逆也手足因血氣逆而冷也

因氣虛為主

有因血虛

氣虛脉細

血虛脉大

熱厥脉數

外感脉沉實

有痙脉弦

因痙者用白朮竹瀝

氣虛四君子

血虛四物

熱厥用承氣

外感用

雙解加姜汁酒

有陰厥陽厥陰衰於下則熱陽衰



於下膿或下血大脹有虛火加人參益氣湯

○手足麻者屬氣虛 手足木者有濕痰死血

指麻木是胃中有濕痰死血

得錄厥者甚也逆也手足逆冷也其証不一
散之方書者甚多今姑錄大概且如寒熱厥逆者
則為陰陽二厥也陽厥者是熱深則厥蓋陽極則
發厥也不可作陰証而用熱藥治之精魂絕而死
矣思宜大小承氣湯隨其輕重治之所謂陰厥者
始得之身冷脉沉四肢逆足踡卧唇口青或自利
不渴小便色白此其候也治之以四逆理中之輩

仍速失關元百壯 又尸厥飛尸卒厥此即中惡
以得因冒犯不正之氣忽然手足逆冷肌膚栗起
頭面青黃色神不守或錯言妄語牙緊口噤或昏
不知人頭旋暈倒此是卒厥客許飛尸鬼擊吊死
問喪人朝登塚多有此病以蘇合丸灌之候稍甦
以調氣散和平胃散服名調氣平胃散 疫厥者
有寒疫迷悶四肢逆冷宜姜附湯以生附湯以生
附代熱附 虻厥者乃胃寒所生經曰虻者長蟲
也胃中冷即吐虻蟲宜理中湯加炒川椒五粒檳
榔山查菁皮 川芎 故芷白水下

者與中風相似何以別之風中是溫氣中身冷以
八味順氣散或調氣散如有痰以四知湯導痰湯
服之

附方 八味順氣散見中風類

調氣散

白豆蔻

丁香

檀香

木香

藿香

甘草炙

砂仁

四不

右為末每服二錢入鹽少許沸湯點服

平胃散

蒼朮

五淋浸

厚朴

姜制

陳皮

各三

甘草

炙二



右為末每服五錢姜三片棗一箇煎服入鹽一掬
沸湯點服亦得

四七湯

厚朴 二兩

茯苓 四兩

半夏五兩 紫蘇二

右每服四錢水一鍾姜七片棗一箇煎服

承氣湯

痢類

四逆湯

理中湯

姜附湯並見中寒類

烏梅丸

見心痛類

道痰湯

見痰類

症五十八



○瘥切不可作風治兼用風藥 大率與癰病相似
比癰為甚為虛宜帶補 多是氣虛有火兼疫瘥用
人參竹瀝之類

附錄古方風瘥曰瘥也經云諸瘥項強皆屬於濕
土是太陽傷濕也又云諸暴強直皆屬於風是陽
明內鬱而陰行於外又曰陽瘥曰剛無汗陰瘥曰
柔有汗亢則害承乃制故濕過極反兼風化制之
然兼化者虛象實非風也

附方

葛根湯 治瘥病無汗而小便少反惡寒者名剛瘥

葛根 四錢

麻黃 三錢

桂枝 二錢

芍藥 二錢

甘草 三錢 炙

右以咀水二鍾生薑三片棗一枚煎服覆取微汗

桂枝加葛根湯 治瘧病有汗不惡寒者服之此方

柔瘧

葛根 四錢

生薑 三錢

桂枝

芍藥

甘草 二錢

右作一服水二鍾棗一箇煎服 二瘧皆可用小

續命湯加底服若胸滿口噤咳逆脚攣臥不着床

者以大承氣湯下之無疑矣



小續命湯見中風類

大承氣湯見痢類

痢五十九

口驚與疫宜吐

大率行疫為主用黃連南星瓜蒌

半夏尋火尋疫分多分少治之無不愈者

小疫與

熱有熱者以涼藥清其心有疫者必用吐藥

後用東垣安神丸

大法宜吐吐後用平肝之劑青

黛藥胡川芎之類龍會丸正宜服之且如痢因驚

而得驚則神不守舍舍空而疫聚也

戴云痢者俗曰猪癩風者是也



中國醫藥大學圖書館藏書

附錄癰症有五馬牛雞猪羊且如馬癰張口搖頭
馬鳴牛癰目正直視腹脹雞癰搖頭反折喜驚
癰喜揚目吐舌猪癰喜吐沫以其病狀偶類之耳
非無疫涎壅塞迷悶孔竅發則頭旋顛倒手足搐
搦口眼相引胃背強直叫吼吐沫食頃乃甦宜早
香散加全蝎三箇

附方

續命湯 主癰發頓悶無知口吐沫出四體角弓反
張目反上口噤不得言

竹瀝二合 生薑汁一升 龍齒末 生薑

防風

石膏

麻黃

桂

防已

附子

二兩

右十味水一斗煮取三升分三服有氣加紫蘇

皮各半兩

○但小兒癰千金有風食驚三種本事方又有

陽癰慢脾風三証慢脾即食癰宜醒脾丸人參散

古方三癰丸治小兒百二十種驚癰

荊芥穗二兩白礬生半兩

右為末麪糊為丸黍米大朱砂為衣姜湯下二十

丸如慢驚用來復丹烏驚三癰丸食癰醒脾丸可

也

本事人參散 治慢脾風神昏痰盛

人參 半兩 圓白大南星 一兩切片以生薑名半兩隨性

右為末每服一錢水一盞姜三片冬瓜

許同煎取半盞作兩三次灌下

寧神丹 清熱養氣血不時潮作者可服

天麻

人參

陳皮

貝

歸身

茯神

荊芥

殭蠶

獨活

遠志 去心

犀角

麥門冬 吟

酸棗仁 炒

長砂 各半兩 半夏

南星



石膏兩各一

甘草炙

白附子

川芎

鬱金

牛黃各三錢

珍珠三錢

生薑

黃連各半兩

金箔三十片

一右為末酒糊丸空心服五十九丸白湯下

東垣安神丸

黃連

分一木五

朱砂

分一木

酒生薑

歸身

炙甘草

各五分

右除朱砂水飛外四味搗為末和勻湯浸蒸餅丸

如黍米大每服十五丸食後津燕下

星香散見中風類



顛狂六十

○顛屬陰狂屬陽顛多喜而狂多怒脈虛者可滋陰則死大率多因痰結於心胸間治當鎮心轉開痰結亦有中邪而成此疾者則以治邪法治之原病式論元精蓋為世所謂重陰者顛重陽者狂是也大概是熱 顛者神不守舍狂言如有所見經年不愈心經有損是為真病如心經蓄熱當清心除熱如痰迷心竅當下痰寧志若顛哭呻吟為邪所憑非狂也燒蠶絲酒水下方寸匕 卒狂言鬼語針大撝指甲下即止 風顛引脇痛發則耳鳴用天門冬去心口乾