

東醫寶鑑

十五

東醫寶鑑雜病篇卷之七

御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

痲瘧

瘧病之源內經曰夏傷於暑秋為痲瘧○夏暑汗不出

盡形弱而氣燄穴俞以閉發為風瘧○風氣盛於皮膚為寒熱又曰因於露風乃生寒熱○風氣盛於皮膚為瘧之熱而內名曰寒熱○夏傷於暑秋必病瘧蓋則熱而悶曰寒熱○夏傷於暑秋必病瘧蓋傷之淺者近而暴傷之重者遠而深瘧瘧也○是知夏傷於暑濕熱閉藏而後發泄于外邪氣內行至秋而發為瘧也○瘧之風寒所傷而後發亦非暑于榮衛之間得秋之風寒所傷而後發亦非暑因風寒感冒而得之者在於陽則發熱在於陰則發寒并則病作離則病止作止故有時在氣則發早在血則發晏淺則日作深則間日或在頭項或在背脊或在腰脊雖上下遠近之不同在太陽則

腰脊俱痛此邪氣入於內也單寒戰俱已內中外皆熱寒

曰溫瘧。其但熱而不寒者，陰氣先絕，陽氣獨發，則少氣煩冤，手足熱而欲嘔，名曰瘧。瘧謂熱也。

寒熱往來，病有酒瘕。惡寒而復發，熱者何也？曰：陰脈不足，陽脈中則酒。

足假令寸脈微，名曰陽不足，陰氣上入陽中，則發熱。下陷，大抵陰中則發熱也。熱者何也？曰：陽微則惡寒，陰微則發熱。大抵陰中則發熱也。

氣下陷，大抵陰中則發熱也。熱者何也？曰：陽微則惡寒，陰微則發熱。大抵陰中則發熱也。

則發熱。大抵陰中則發熱也。熱者何也？曰：陽微則惡寒，陰微則發熱。大抵陰中則發熱也。

不足則陰往乘之，故陰氣上入陽中，則惡寒。熱者何也？曰：陽微則惡寒，陰微則發熱。大抵陰中則發熱也。

邪入而王，氣不與之爭，則但熱而無寒矣。陽不足，若邪入而王，氣不與之爭，則但熱而無寒矣。陽不足，若邪入而王，氣不與之爭，則但熱而無寒矣。

明者大陽金燥也。少陽之邪，水寒也。身近後，膀胱水。明者大陽金燥也。少陽之邪，水寒也。身近後，膀胱水。

則惡寒近前陽明燥則發熱故為往來寒熱也
○甚者內外失守真邪不分陰陽迭勝寒熱互起
則休作無定時矣

瘧發

曰數多少之夏傷於暑熱氣盛藏於皮膚之內腸胃

於陰此氣得陽而外出得陰而內薄內行於陽夜行

以日作○衛氣與邪相并則病作與邪相離則病休其并於陰則寒并於陽則熱離於陰則寒已

○離其間日發者由邪氣內薄於五藏合則復發也

其道遠其行遲不能與衛氣俱行不得皆出故間

日乃作也○納○時有間二日或至數日發或渴或

府而渴其故何也○日其間日者邪氣與衛氣容於六

陰陽更勝也或甚或不甚故或渴或不渴○三
日發者受病一月二年間日一發者受病半年連日
也又曰三日一月一發陰經受病也最重○血俱受病

東醫寶鑑卷之九
瘧疾篇
三

東醫圖書集成卷之七

邪淺與榮衛並行一日一發
募原不能與正氣並行故間二蓄積乃發或三橫連

必為瘡母門

瘡發有晝夜早晏之異使然岐伯曰日晏與日早者何氣

一節而故其作也晏此先客於脊背也每至於風府下

則滕理開腠理開則邪氣入邪氣入則病作以日此

作日稍益晏也其出於風府日下一節二五其

下至骶骨二十六日入於脊內注於伏膂其

氣上行九日出于缺盆之中其氣日高故作日蓋

早也○陰為夜發邪深榮衛夜行胃與腹故也○陽為

子時至巳陰為午時至亥如發寅卯而退於未申

或發未申而退於子丑皆謂之陰陽不分須用藥

在內也從卯至午發者邪在外也從午至酉發者邪

寅發者知邪在血分也

六經瘧

夏傷於暑秋必病瘧初不知何經受病隨其受

氣其證各殊在太陽經者謂之寒瘧治多汗之在

陽明經者謂之熱瘧治多下之在少陽經者謂之

風瘧治多和之此三陽受病皆謂暴瘧發在夏至

後處暑前此乃傷之淺者近而暴也○在陰經者

則不分三陰皆謂之溫瘧其發在處暑後冬至前

此乃傷之重者遠而深也瘧者老瘧也故謂之

久瘧○傷寒餘熱未淨重感於寒而變瘧名曰

溫瘧亦曰風瘧此為傷寒壞病其證先熱後寒門

傷○瘧屬三陽宜汗宜吐瘧屬三陰宜下宜和宜溫

桂枝羌活湯治太陽瘧自汗頭痛腰脊強桂枝羌

活湯治太陰瘧自汗頭痛腰脊強桂枝羌活湯

治少陽瘧自汗頭痛腰脊強桂枝羌活湯

治太陰瘧自汗頭痛腰脊強桂枝羌活湯

治少陽瘧自汗頭痛腰脊強桂枝羌活湯

治太陰瘧自汗頭痛腰脊強桂枝羌活湯

治少陽瘧自汗頭痛腰脊強桂枝羌活湯

治太陰瘧自汗頭痛腰脊強桂枝羌活湯

治少陽瘧自汗頭痛腰脊強桂枝羌活湯

治太陰瘧自汗頭痛腰脊強桂枝羌活湯

治少陽瘧自汗頭痛腰脊強桂枝羌活湯

煎服

麻黃羌活湯

治太陽瘧無汗即前方去桂枝如麻黃也劑法服法同上

柴胡桂枝湯

治少陽瘧寒熱乍往乍來柴胡二錢桂枝黃芩人參芍藥半夏各一錢甘草五

分右剉一貼入薑三棗二水煎服

柴胡加桂湯

治少陽瘧往來寒熱極驗柴胡三錢黃芩桂枝各二錢半夏一錢甘草四分右

剉作一貼入薑三棗二水煎服

白虎桂枝湯

溫瘧者其脈如平身無寒但熱骨節煩疼時便難朝發暮解甚發朝解此藥主

之石膏四錢知母二錢桂枝甘草各一錢粳米一合右剉作一貼水煎服

麻黃白朮湯

治風瘧麻黃桂枝皮青皮陳皮川芎白芷

檳榔甘草各七分右剉作一貼入薑三棗二水煎服

柴胡四物湯治三陰經溫瘧或夜發者柴胡生乾地黃各二錢人參半夏黃芩甘草川芎當

一貼赤芍藥各一錢二右生作

桂枝芍藥湯治大瘧寒熱作此太陽陽明合病也謂

世經曰汗出不愈知為熱也不治則恐久而傳入陰經宜用此桂枝一錢赤芍藥知母石膏黃芩各

二錢右剉作一貼水煎服命

桂枝石膏湯治太陽陽明合病間日瘧熱多寒少石

剉作一貼水煎服之

桂枝黃芩湯服桂枝芍藥湯後寒熱轉甚者知太陽

錢石膏知母各一錢半黃芩一人參半夏甘草各一錢二分桂枝一錢右剉作一貼水煎服命

瘧晝發夜發宜分治益氣虛晝發宜六君子湯勸門福虛

麻黃黃芩湯

受貼
邪水
則煎
肝臨
氣肝
燥服
經○
所補
謂仁
肝味
苦苦
急甘
急辛
食肝
甘者
以血
緩之
之海
挑血

有仁散血緩肝謂邪氣深遠而入血中故夜發乃陰
邪此麻黃黃芩湯乃發散血中風寒之劑也

柴胡芎歸湯

治夜發陰瘡引出血分而散後服人參
截瘡飲止之柴胡乾葛川芎各一錢

梗當歸赤芍藥人參厚朴白朮茯苓陳皮各七分
紅花甘草各三分剉作一貼入薑三棗二梅一

服水
春煎

諸瘡證治

瘡有風瘡寒瘡熱瘡溫瘡庚瘡食瘡
勞瘡鬼瘡疫瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡

風瘡

自感風而得先熱後寒宜麻黃白
無汗則宜散邪湯有汗則宜正氣湯

寒瘧

自感寒而得寒多熱少宜人參養胃湯
飲果附湯草果飲柴胡桂薑湯
肥瘠

熱瘧因暑勝熱多得之一名瘧瘧亦曰暑瘧宜人參白

明

濕瘧因冒襲雨濕汗出澤浴得之寒熱相半小便

痰瘧因外感內傷鬱聚成痰頭痛肉跳吐食嘔注喜則

常以二陳湯飲之參縮砂倍用白豆蔻進一

二貼自然寒熱不作蓋白豆蔻能消

食瘧一名胃瘧因飲食失節飢飽有傷所致寒已復熱

名曰寒熱善飢而不能食食已支滿腹脹病以神

湯加青皮或清脾飲小清脾湯又二陳

勞瘧即久瘧也寒熱微寒中有熱熱中有寒最難

羌活
蒼朮
湯
痺
疔

者老瘡也以其隔三日一發纏綿不去也
日一作邪入於三陰經也作於子午卯酉日者

散邪湯

治風瘧初起川芎白芷麻黃白芍藥防風荆芥紫蘇葉羌活各一錢甘草五分右剉作一

貼入薑三葱白三薑煎

正氣湯

治同上柴胡前胡川芎白芷半夏麥門冬檳榔草果青皮赤茯苓各一錢桂枝甘草各五

分右剉作一貼入薑三棗二水煎服

交解飲

治寒瘧即雙解飲子也防見

果附湯

治脾寒瘧疾面青振寒草果附子炮各二錢半右剉作一貼入薑七棗二水煎服

草果飲

治寒瘧草果白芷良薑青皮川芎紫蘇葉甘草各一錢右剉作一貼水煎服

柴胡桂薑湯

治邪在半表裏寒熱往來極驗柴胡三錢桂枝牡蠣各一錢半天花粉黃芩各

一錢乾薑甘草各八分右剉作一貼水煎服

柴胡知母湯

治熱瘧及瘴瘧柴胡知母各一錢半蒼朮黃芩乾葛陳皮半夏川芎各一錢甘

草灸七分右剉作一貼入薑三梅二水煎
清晨服午前一服久瘡加入參當歸

爭功散

治熱瘡多效知母貝母柴胡常山梔子檳榔
地骨皮甘草各一錢蟬退二七箇右剉作二

貼入桃柳枝各五寸煎服未效
加過路葛藤五寸同煎服

龍虎湯

治熱瘡火盛舌卷唇焦鼻如烟熏六脉洪緊
石膏二錢半柴胡黃連各一錢半黃芩知母

黃栢各一錢梔子八分半夏七分粳米百
粒右剉作一貼入薑三棗二水煎服

柴陳湯

治痰瘡柴胡半夏各二錢人參黃芩陳皮赤
茯苓各一錢甘草五分古剉作一貼薑三棗

二水煎服

四獸飲

治七情聚痰五藏氣虛瘡久不已入參白朮
白茯苓陳皮半夏草果甘草烏梅生薑大棗

各一錢右剉作一貼拌鹽少許淹食頃以皮紙包
罌水浸濕慢火煨香熟取出水煎服未發前連進

數貼即效

冷附湯

五更疾無過是痰實而脾胃弱停于胃實也所以

子一箇炮去皮臍右切片二分二貼每貼入

露薑飲

治痰癰生薑四兩連皮搗爛止取自然汁約

初澄者一上飲之或有痰吐任之即安

平陳湯

治食癰蒼朮半夏各二錢厚朴陳皮赤茯苓

煎棗二水

清脾飲

治食癰柴胡半夏黃芩草果白朮赤茯苓厚

三棗二水煎服○此方乃小柴胡平胃二陳合而

為一也一方加常山二錢煎之露服五更截癰令

小清脾湯

治胃癰厚朴二錢烏梅肉半夏青皮良薑

一名清脾湯○