

眼科大全

民國三年仲槐
海陵張蔚山題

十

羞明怕日眼



偏正頭風



紅腫疼痛



此症乃暴痛在路迎風串入眼中血不就舍肝不攝
血觀燈則泪出見日則酸淚痛難開宜刺指竹合
谷小骨空二間不愈再刺睛明行間

此症乃痰飲停滯胸膈賊風串入腦戶偏正頭風
來連半邊皮肉疼痛或手足沈冷久而不治變為癱
患亦分陰陽針之或針力未到故不効也此症宜先
針風池合谷絲竹空後可針三里瀉之以去其風針
後穴前穴絲竹空難帶

此症因傷寒未解却有房事上感下虛氣血壅上或
頭風不早治則血滯腫人或暴赤腫痛或起氣傷肝
房事傷腎脾胃二經飲食不節飢飽醉勞皆有此症
心火炎上故不散及婦人熱氣傷肝產期未滿滯一
時可療漸而為之無不効也宜先刺睛明臨泣合谷
不愈再刺風池太陽行間

主治頭項強急額上痛

臨泣

主治目上入髮際五分中五時辰之○足太陽少陽陽明三脈之會○刺三分留七呼

足三里

主治胃氣上逆嘔吐泄瀉○足陽明所入為合○刺五分留六呼灸三壯千金云灸二百壯至五百壯○一云小兒忌

生痰○秋月不宜出風惡心下虛

風池

主治頭眩目赤○風熱氣街巨虛上下廉同泰承祖曰膝腋痠痛目不明外台明

絲竹空

主治頭痛目赤○風熱氣街巨虛上下廉同泰承祖曰膝腋痠痛目不明外台明

人中

主治中風口噤○人中二壯至七壯如小麥然灸不及針

承漿

主治口不開○承漿一名天池一名懸壺在頤前下唇後陷中○足陽明任脈之會○刺三分留五呼灸三

迎香

主治鼻塞不通○迎香一名鼻淵在鼻翼旁○刺三分留五呼灸五

客主人

主治耳鳴耳聾○客主人一名客主人耳中○刺一分留七呼灸三壯甲乙經曰刺上聞不得深下聞不得久

角孫

主治耳中風○角孫一名耳中風在耳前○刺一分留七呼灸三壯甲乙經曰刺上聞不得深下聞不得久

耳中

主治耳中風○耳中一名耳中風在耳中○刺一分留七呼灸三壯甲乙經曰刺上聞不得深下聞不得久

耳前

主治耳前風○耳前一名耳前風在耳前○刺一分留七呼灸三壯甲乙經曰刺上聞不得深下聞不得久

耳後

主治耳後風○耳後一名耳後風在耳後○刺一分留七呼灸三壯甲乙經曰刺上聞不得深下聞不得久

耳內

主治耳內風○耳內一名耳內風在耳內○刺一分留七呼灸三壯甲乙經曰刺上聞不得深下聞不得久

耳下

主治耳下風○耳下一名耳下風在耳下○刺一分留七呼灸三壯甲乙經曰刺上聞不得深下聞不得久

耳上

主治耳上風○耳上一名耳上風在耳上○刺一分留七呼灸三壯甲乙經曰刺上聞不得深下聞不得久

耳中

主治耳中風○耳中一名耳中風在耳中○刺一分留七呼灸三壯甲乙經曰刺上聞不得深下聞不得久

耳前

主治耳前風○耳前一名耳前風在耳前○刺一分留七呼灸三壯甲乙經曰刺上聞不得深下聞不得久

耳後

主治耳後風○耳後一名耳後風在耳後○刺一分留七呼灸三壯甲乙經曰刺上聞不得深下聞不得久

耳內

主治耳內風○耳內一名耳內風在耳內○刺一分留七呼灸三壯甲乙經曰刺上聞不得深下聞不得久

光明

主治目生翳高腫不

在外眼上五寸○足少陽絡走

地五

主治熱病赤眼云云○光明治眼赤痛

主治去火小一寸○光明治眼赤痛

式鍼毫

針長一寸六分治寒凝痛痺在絡

六如蚊蟲嘴取法於毫毛長一寸六分治寒凝痛痺在絡

解鈴

一名針帶在衛陽後三寸五分足腕上繫針帶處陷中一日在足大指直上跗上陷者腕腕中刺

五呼

主治風氣面浮頭痛目眩生翳神疲

豐隆

主治風氣面浮頭痛目眩生翳神疲

主治風氣面浮頭痛目眩生翳神疲

將竹

主治風氣面浮頭痛目眩生翳神疲

睛明

主治風氣面浮頭痛目眩生翳神疲

巨膠

主治風氣面浮頭痛目眩生翳神疲

巨膠

主治風氣面浮頭痛目眩生翳神疲

主治瘰癧瘡唇頰腫痛口噤目瘵背脊無見
連稅說說面風鼻頰腫痛氣喘腫痛
大骨空 在手大指前二節前尖上屈
主治黃疸瘡中尖二七壯禁針

小骨空 在手小指第二指前尖上屈
主治瘰癧瘡中尖二七壯禁針
痛及吐瀉

後谿 在手小指末節後外側指紋上以中節手筋裏取之一云在手腕前外側
主治手足骨節冷痺中尖二七壯禁針
上治瘰癧瘡中尖二七壯禁針
下治瘰癧瘡中尖二七壯禁針

行間 在足大指間動脈應手脈中一云在足大指次指岐骨間上下有筋則後有小骨
主治中風口喎四逆濕熱頭痛不眠視目
中治中風口喎四逆濕熱頭痛不眠視目
一名間谷在食指末節前內側中○汗氣
陽明所過為榮○刺三分留六呼灸五壯
主治目黃口乾口眼喎斜
通玄賦云治目昏不見

二間 在足大指間動脈應手脈中一云在足大指次指岐骨間上下有筋則後有小骨
主治中風口喎四逆濕熱頭痛不眠視目
中治中風口喎四逆濕熱頭痛不眠視目
一名間谷在食指末節前內側中○汗氣
陽明所過為榮○刺三分留六呼灸五壯
主治目黃口乾口眼喎斜
通玄賦云治目昏不見

穴問曰：睛明迎香承泣絲竹空等穴皆禁灸何也？曰：穴近日目畏火故禁灸也。以是推之，則知睛明不可灸矣。凡灸頭面之穴，宜小麥大，不宜多灸。蓋頭面為諸陽之首，故也。若四肢壯稍大，背腹則又大，不妨多灸。四肢

古人又云：住火便用洗法，以赤皮蔥薄切葉煎湯溫洗瘡週圍，約一時久。今驅逐風散於瘡口，出更令經脈往來不滯，自然疾愈。若火退痂後，用東南桃枝青嫩皮煎湯溫洗，能護瘡中諸風。若瘡內黑爛，加胡荽煎洗，若瘡不可忍，加黃連煎洗神效。

若瘡不可忍，加黃連煎洗神效。

古人貼艾瘡不用藥，要得膿水出多而疾除。資生云：春用柳絮，夏用竹膜，秋用新棉，冬用兔腹下白細毛，或貓腹細毛。今人多以膏貼之，日兩三易，欲其速愈。此非治疾之本意也。但今貼膏藥，意在避風，亦取其便，惟久久貼之可也。

鍼灸避人神論

千金云：欲行鍼灸，先知年宜忌及人神所在，不與禁忌相犯即可。故男忌除，女忌破。男忌戌，女忌巳。有日神忌，有每月忌，有十二時忌，有四季人神，有十二部位人神，九部旁通人神，有難忌，有通人神，有血支血忌之類。凡醫者不能知此避忌，若逢病人危，會男女氣怯，下手至困，通人達士，豈為此哉？若遇辛暴急患，實不拘忌，許布云：辛暴之疾，須速灸瘡，一日之間，止忌一時是也。千金云：癰疽疔腫喉痺客忤，尤為急切。凡作湯藥，宜速不拘忌避。又曰：凡辛暴急症，年中風卒仆，痰厥等症，即用針灸治療，若論忌神，少緩則不可救。此所以不可拘泥也。若平居從容治病於未形，選吉日避人神可也。

取十二建人神之忌時

建日在足禁胸時

除日在眼禁口入

滿日在腹禁黃昏

平日在背禁人定

定日在心禁半夜

執日在手禁鵲鳴

破日在面禁平旦

危日在耳禁日出

成日在唇禁食時

收日在頭禁宮時

開日在耳禁午時

閉日在目禁日昃

附前賢治目醫案補遺諸方

十全大補湯 治諸虛百損，禁斷不和，形體羸瘦，面色痿黃，胸膝酸疼，腰脊痠痛，頭眩耳重，口苦舌乾，骨蒸熱，內煩，動氣，血虛，此藥。白茯苓，白木，肉桂，川芎，當歸，人參，黃芪，白芍，熟地，黃，甘。右剉劑，水二鍾，生姜三片，黑棗一枚，煎至八分，去滓溫服，不拘時候。

按經曰：氣主煦之，血主濡之。故用人參、白朮、黃芪、茯苓、甘草、甘溫之品以補氣，氣盛則能充實於肌肉矣。用當歸、川芎、芍藥、地黃、肉桂、味厚之品以補血，血生則能潤澤其枯矣。

七厘丸 治風氣結聚，宿食不消，原石七厘，在腹中及積年癰疽，痛冷如冰，石脚氣，衝心煩，煩悶，吐衄，時時動，身重，心煩，神 錦紋大黃 十五兩 甘草 四兩 柴胡 六兩 訶梨勒皮 枳實 木香 各五兩

桃仁 治去皮六兩 右為細末，煉蜜為丸，如梧桐子大，每服二三十丸，食遠，臨臥米飲送下，漸增至四五十丸。

取宜利為度。覺病勢漸愈，則止服。不問男女老少，並宜服之。量虛實增減。

神功丸 治三焦氣結，心腹痞悶，六腑不調，大便不通，腰膝痠痛，手足重痛，頭痛，火麻仁 另批 人參 去蘆 各二兩 而熱口苦，舌乾，心動，煩躁，難以安及治，解其毒，有風人，大便結，燥，如梧桐子大，每服二三十丸。

錦紋大黃 治腹中結聚，心腹痞悶，六腑不調，大便不通，腰膝痠痛，手足重痛，頭痛，火麻仁 另批 人參 去蘆 各二兩 訶梨勒皮 枳實 木香 各五兩 右為細末，另入麻仁，骨擦勻，加煉蜜為丸，如梧桐子大，每服二三十丸。

潔白湯或溫酒米飲皆可送下。食遠，臨臥時服，如大便不通，可倍尤數，以通利為度。

小柴胡湯 治傷寒，邪熱，身熱惡風，頭痛，煩躁，渴，寒熱往來，身重，黃小，便不利，大便秘，通時及產後，服之 柴胡 半斤 人參 去蘆 甘草 炙 黃芩 各三兩 半夏 洗，切，乾，二兩五錢 右粗剉，或為粗末，每服

三五錢，水二鍾，生薑三片，棗一枚，去核，同煎七分，去滓，溫服，不拘時候。小兒分作二服，量其大小，多寡。

按邪在表則惡寒，邪在裏則發熱。邪在半表半裏，則惡寒且熱。故今寒熱往來，少陽之脈行於兩脇，故令脇

痛。其經屬於膽，膽汁上溢，故口苦。膽者肝之腑，在五行為木，有榮枝之象，故脈弦。柴胡性辛溫，辛者金之味，

故用之以平木。溫者春之氣，故用之以入少陽。黃芩性苦而味苦，枯則能浮，苦則降。君以柴胡，則入少陽矣。

然邪之傷人，常乘其虛。用人參、甘草者，欲中氣不虛，邪不得從傳入裏耳。是以中氣不虛之人，雖有柴胡證，

而人參在可去也。邪初入表，裏氣逆而煩嘔，故用半夏之辛以除嘔逆。半夏主裡則亦衛事，故用黃芪之辛

甘以和榮衛。

二陳湯 治痰飲為患或嘔吐惡心或頭眩心悸或中 半夏 湯洗七次 廣陳皮 湯洗去白 甘草 炙 白

茯苓 一 右剉劑水二鍾生薑三片烏梅一個同煎至六分去滓不拘時溫服

按水穀入胃無非溫也脾土旺則能運化水穀上歸於肺下達膀胱無濕氣之可留也惟夫脾弱不能制濕

則積而為痰飲半夏之辛能燥濕茯苓之淡能滲濕甘草之甘能健脾陳皮之辛能利氣脾健則足以制濕

氣利則積飲能行東南之人多有濕飲之疾

故丹溪恒主之其曰如升提之劑者亦清氣升而濁氣自降之謂

按此湯乃治一身之痰如管之要藥也欲下行加引下藥黃柏木通防己之類欲上行加引上藥升麻柴胡

防風之類又曰二陳加升降之藥能使大便潤而小便長

溫白丸 治心腹積聚久積痼疾大如磁石黃連酒食稠起嘔吐肚滿上氣時時腹脹心下堅結上受諸心等

及發一切諸風身軀頑痺不痛或半身不遂或筋骨疼痛及癱瘓七十二種風三十六種瘧疾一切諸症

或婦人諸症年深月久不愈用此藥或川烏頭心慈惠思慮不樂飲食無味月水不調及腹中一切諸症

或如鬼所使諸症此藥治之無不除愈 川烏頭 治去皮 紫苑 治去根 柴胡 治去葉 石菖蒲 治去根 厚朴 治去皮

桔梗 皂角 治去皮 炙甘草 治去根 乾姜 治去根 黃連 人參 白茯苓 肉桂 治去根 巴豆 治去皮 蜀

花椒 治去目及開口者 右為細末另入巴豆拌勻煉蜜為丸如梧桐子大每服三九姜湯送下食後臨卧

服漸加至五九七九通利則止再縮減回服

川芎茶調散 治男婦小兒諸風上攻頭目昏重偏正頭痛鼻寒聲重傷風壯熱肢體 蘇薄荷 治去根 羌活 治去根 白芷 治去根 川芎 治去根 荆芥 治去根 右為細末每服二錢食

後茶清調下或姜蔥煎服亦可 一方加菊花燈臺燂退名曰菊花茶調散常服清目

四物湯 治男婦氣血虧損血虛血弱治諸虛損月水不調調經止痛崩中漏下血虛塊硬癥瘕痞痛結核瘰癧冷精

當歸身去積酒 白芍藥酒 川芎酒 乾熟地酒 右剉劑。白水二鍾煎至八分去滓溫服。

按是方治血分之聖藥也。用當歸引血歸肝。經川芎引血歸肺。經芍藥引血歸脾。經地黃引血歸腎。經心

生血。肝納血。脾統血。肺行血。腎藏血。男子化而為精。女子化而為月。水血有形之物。屬乎陰。故名曰四物湯。

經云。氣血人身之二儀也。天地之道。陽常有餘。陰常不足。人與天地相似。故陰血難盛而易虧。是方也。當歸

芍藥地黃。味厚者也。味厚為陰中之陰。故能生血。川芎味薄而氣清。為陰中之陽。故能行血。中之氣。然草木

無情。何以便能生血。所以謂其生血者。以當歸芍藥地黃能養五臟之陰。川芎能調榮衛中之氣。五臟和而

血自生耳。若曰四物便能生血。則未也。師云。血不足者。以此方調之。則可。若上下失血太多。氣息微微之際。

則四物禁勿與之。所以然者。四物皆陰。陰者天地閉塞之令。非所以生萬物者也。故曰禁勿與之。

涼膈散治男婦小兒腦熱煩燥多渴而熱頭昏目眩舌乾口苦 黃芩酒 梔子炒 蘇薄荷各三 連翹四 大黃酒 甘草炙 玄明粉各二 右為粗末。每服四錢。白

水二鍾煎至八分。去滓食後服。

按是方。黃芩梔子。味苦而氣涼。故瀉火於中。連翹薄荷。味薄而氣薄。故清熱於上。大黃礞石。酸寒而味厚。故

諸實皆瀉。用甘草者。取其性緩而戀膈也。不作湯液而作散者。取其泥膈而成功於上也。

三黃丸治三焦積熱上攻目赤腫小便赤澀大便 川黃連 黃芩 黃蘗俱用酒潤 右為細末。煉蜜為

丸。如梧桐子大。每服三錢。空心白滾湯送下。忌煎炒椒姜辛辣等熱物。

按少火之火。無物不生。壯火之火。無物不耗。經曰。壯火食氣是也。故少火宜升。壯火宜降。今以三物降其三

焦之壯火。則氣得其生。血得其養。而三焦皆安。蓋黃芩苦而枯。故清熱於上。黃連苦而實。故瀉火於中。黃

蘗苦而潤。故瀉火於下。雖然。火有虛實。是丸但可以治實火。若虛者用之。則火反感。謂降多亡陰也。丹溪曰。

虛火宜補則虛實之辨。若天淵矣。明者當求之證焉。

一名三補丸。三補云何以黃連黃芩黃蘗三黃能

按是方乃瀉中之補。非補中之補也。若真以為補。是向病人說夢也。汪晨泉曰。人皆知補之為補。而不知瀉

之為補。知瀉之為瀉。而不知補之為瀉。真知言哉。

四季三黃湯心丸。治男婦三焦積熱。上焦有熱。攻衝服。日吞腫。頭項疼痛。口舌生瘡。中焦有熱。心膈煩燥。不美

鮮血小兒積。飲食下焦有熱。小便赤澀。大便乾結。五臟俱熱。即生瘡。瘡發及治。五臟府疾。實門。或下

或用水盪為丸。亦可。如梧桐子。大每服二三錢。滾白湯送下。

按味之苦者。皆能降火。黃芩味苦而質枯。黃連味苦而氣燥。大黃苦寒而味厚。質枯則上燥。故能瀉火於肺。

氣燥則就火。故能瀉火於心。味厚則喜水。故能瀉邪攻實。此天地親上親下之通。水流濕。火就燥之義也。

青州白丸子。治男婦半身不遂。手足頑屈。口眼喎斜。痰涎壅塞。及一切風化。兼

半夏。以水浸洗。過白。川烏頭。去皮。生用。右為細末。以生絹袋盛。用井華水攪。未出者。更以手揉。令出。如

有滓。更研。再入絹袋。濾淨。為度。放磁盆中。日晒夜露。至晚棄水。別用井華水攪。又晒。至來日。早再換新水攪。

如此。春五日。夏三日。秋七日。冬十日。去水。晒乾。後如玉片。研。以糯米粉煎粥。清為丸。如菜豆大。初服五丸。

服至十五丸。生薑湯送下。不計時候。如癰癰。風以溫酒下。二十丸。日進三服。至三日後。當有汗。便能舒展。服

經三五日。漸愈。如痰壅。膈上。欲用土法。右共為細末。每服三錢。用薑汁調服。吐痰為度。

大承氣湯。治民明。胃經積熱。此日其脈洪實。時時腹痛。腹運紅腫。生惡露。發熱。久服寒涼之劑。錦紋大黃

酒洗。芒硝。各三。厚樸。去皮。枳實。二錢。右為劑。水四錢。先煮厚樸。枳實。至二鍾。入大黃。煎二三鍾。入

硝。煎溫。服。取利為度。如未利。再投一服。

按經云燥淫所勝以苦下之大黃之苦寒以瀉實熱枳實之苦辛溫攻腸胃滯滯潤燥除熱又燥淫於內治以苦溫厚樸之苦辛溫破腹中結燥又曰熱淫所勝治以鹹寒芒硝之鹹以攻熱之堅痞

白通湯

治少陰腎水虛寒自利宜通陽氣溫中散寒

葱白四

乾姜二

附子三錢

水二鍾煎服本方加

人尿

猪胆汁苦寒使熱藥不為寒藥所格乃內經所謂甚者從治之法是也

十棗湯

治傷寒邪熱內結伏飲以致頭眩心下痞滿引脇下痛乾嘔氣逆宜陰熱連飲為當經云半

甘遂

如大戟

大棗六

共為一劑白二鍾先煎大棗至八分入前三味同煎或共為細末每服二

錢用薑汁調服吐痰高受

除痰湯

治風痰

半夏二

廣陳皮

枳實

赤茯苓

甘草

胆南星

右剉剉白水二鍾

生薑三片

煎至八分去滓溫服

按風痰者濕土生痰痰生風也半夏陳皮茯苓甘草前之二陳湯耳加南星以治風痰入枳實去痰

如倒壁

保命集當歸湯

治婦人

當歸身

黃芩

赤芍藥

柴胡

川黃連

甘草

熟地黃二

右剉剉

白水二鍾煎至八分去滓溫服

保命集羚羊角散

治水瀉久

羚羊角

升麻

北細辛

甘草

右為細末

一半煉蜜為丸

每服五六十丸

用一半為散以清水滾湯吞下食後送下散服二錢空

濟陰地黃丸

治三陰虧損虛火上炎致目睛微大視物不真或白淫下

連五味

當歸

花肉

茯苓

山藥

巴戟肉

枸杞

熟地黃

麥冬

右為細末

煉蜜為丸

如梧桐子大每服

四十丸空心滾湯送下

點眼藥法

凡治目點眼藥必按時隔。每日須過已至午時點。蓋人之陰陽。與天地同。子後一陽生。午後一陰生。正是陽生之際。火亦生焉。若點藥犯之。則火勢難遏。午後屬陰。方宜點藥。或膏或散。或試用犀角膏。如錢膏必蘸水乳磨化。如散則乾拭。俱先宜少點些。倘若目受藥。再略多些不妨。不可令患目者疼而怕藥。即係仙丹。患者畏懼。要在醫者輕手。徐徐對症施藥。命患者閉目仰面。久坐不睜。切戒妄想多言。輕則可點二三次。重則點三四次。每次必用替換淨藥。深不可過點過多。點則未必爽快。恐激動其火。反復增其患矣。

秘製點眼丹藥諸方

雲英散

治目疾清腫止淚明目去翳退赤定痛此散除一切等症

蘆甘石 大散通紅用重便時如此七次

明礬砂 琥珀 珍珠

牛黃

真熊膽 以上俱各一錢

雲英散

右和極勻。每次用淨替換少許點。閉目片時再點。又閉片時。

待藥性過然後使用。得撥去藥滓。溫水洗淨。每日點二三次。久閉為妙。

附雲藥方

水銀

黑鉛 各五

火硝 八

官礬 二

先將鉛化開。入水銀作一室。再加硝礬研勻。入陽城罐內。盛泥封固。打大三炷香。先文後武。待冷取出。聽用。

按此雲飛散所宜製也。是散也。甘石收濕除爛。雲藥磨翳拔雲。若砂珀珠末。牛黃熊胆。解毒清熱。止淚退赤。明日之品也。凡目有此症者俱可用。

熊膽膏 治一切火熱赤眼流淚。或爛眼。熊膽 豬膽 鯉膽 羊膽 川蜜 等

銅鏡中。微火熬成膏。取起用磁盒藏之。出火毒。點眼神良。

夫日症內熱則臉赤。肝熱則出泣微熱則癢。熱感則腹痛。或癢或痛。皆火之故也。氣熱則神濁昏冒。故令晝

夜目赤。內熱則眼赤。肝熱則出泣微熱則癢。熱感則腹痛。或癢或痛。皆火之故也。氣熱則神濁昏冒。故令晝

夜目赤。內熱則眼赤。肝熱則出泣微熱則癢。熱感則腹痛。或癢或痛。皆火之故也。氣熱則神濁昏冒。故令晝

不能視物陽盛者喜求惡火故曰不可以近燈光此經所謂天明則日月不明邪害空竅也五臟之苦是以清熱用寒之劑是以清火且諸腫者乃甲木之精也蓋者百花之精也皆有滋潤乙亥之妙焉

宋真宗皇帝勅封壇液膏

治一切年久

熊膽 牛黃

硃砂

麝仁

黃連

龍腦

蜜一 右熊膽牛黃麝仁黃連四味長流水二大碗傾於砂鍋之內熱至半碗用重綿紙濾過去滓入蜂窠再用文武火熬至紫色色焦起緣絲為度不可太過不及取出入硃砂龍腦研極細末和勻入滋確內封固入土埋七日出火氣每管腳挑少許點於目內眼目片時候過約性方開每日點二三次仍忌一切動風之物

紫金錠子

治眼疾不分遠年近日諸般眼腫如瘡入努肉攀睛拳毛倒睫積年赤障暴發赤腫或白睛紅腫沙眼難開凡眼疾遠近伯日差明眼多熱淚爛弦風癢視物昏花迎風淚出目中翳大諸般眼疾

蘆甘石

煅

黃丹

當歸

硃砂

川黃連

礞石

白礬

硃砂

白丁香

輕粉

龍齒

石蟹

海螵蛸

麝腦

乳香

沒藥

白珍珠

麝香

梅花片

二錢

其片磨入留氣

加

右除腦麝外餘各另製為末秤合和勻入黃連水杵至千萬餘下自乾次入麝香研細羅過又次入片

腦再研復入後膏搜和作錠子陰乾

猪腰子

四枚以蒜水洗去骨膜乾淨無油為度再用布包好燻入藥

生地黃

一斤

當歸

黃連

防風

龍胆草

黃藥

柯子

麝仁

大錫梨

冬蜜

右將黃連等八味洗淨剉碎以水浸於銅器內

春夏三秋四冬七日

濾去滓復添水熬三次取盡藥力以蜜絹綿紙重濾過澄去砂土慢火煎乾槐柳枝各

四十九條互換一順攪不住手攪得此藥如飴糖相類入蜜和勻磁瓶盛放湯瓶口上重湯蒸泡成膏復濾

淨滴入水中沉下成珠可丸為度待數日出火毒再溶化入末和勻拌為丸錠陰乾金銀箔為衣每以少

許新汲水調化開鴨毛蘸點眼大管內又可以熱水泡化作洗眼藥亦可如冷水冷再服用日洗五六次日點

二三次大効

陽丹藥品法製 蘆甘石眼科之要藥也。選輕白者佳。四兩用 蘇薄荷 羌活 防風 麻黃 荆芥穗 川芎 白芷 細辛 發散之藥各二錢。用清河水或雪水更妙。四大碗煎至二碗去滓。將甘石搥碎入藥水中於瓶內煮乾為度。此陰製用陽藥煎水法也。又用 龍胆草 黃芩 赤芍藥 大黃 生地黃 黃連 木賊草 連翹 劉寄奴 黃蘗 夏枯草 當歸 千里光 菊花 山枝仁 苦寒之藥各二錢。用井水五碗。春夏浸二日。秋冬浸四日。常以手攪之。浸畢去滓。將藥水分作清濁二碗。將所煮甘石入陽城礮內。大火煨紅。鉗出少時。先以濁水淬入。再煨再淬。以水盡為度。此陽製用陰藥浸水法也。又將前陰製煎水藥滓。及陽製浸水藥滓。共合一處浸水二碗。去滓濾淨。再澄淨。將煉過甘石傾入研攪浸露一宿。飛過分輕重兩處。晒乾。上者為輕。下者為重。各研極細。收藏輕者治輕眼重者治重眼。此陽丹合製用藥之法也。蓋甘石經火煉本陽藥也。又用於散藥製度。是辛甘發散為陽之象。故以陽丹名。又用陰藥為陰製者。是陽中亦有微陰之象。及治火毒法也。

陰丹藥品法製

銅綠

黃連 水者飛過

青鹽塊 白水

乳香 各三

硃砂 甘草水

蜜陀僧 飛過

沒藥 各三

五 又將前製陽丹蘆甘石一兩。共七味俱研極細。勿令犯火。所以為陰藥也。中用陽丹甘石者。為陰中有陽之象也。但只用蘇州蘇薄荷淨葉。川黃連龍胆草三味。各等分。浸水二杯。露一宿。去滓濾淨。水一杯入前藥在內調勻。明月下露一宿。而得月之陰氣。次日晒乾。又得日之陽氣也。俟夜露日晒還乾。再研極細。入後藥。此製陰丹之法也。川黃連 去皮毛洗淨 草烏 新白者 細辛 去土 胡黃連 各四錢 薄荷 各四錢 州淨葉洗淨 以上五味乃疏風退熱之藥。取象於五輪之義也。各研極細。律勻。用人乳為丸。如小豆大。用絹袋盛之。懸於東屋角頭風乾。再研極細。篩過。和前藥內共研勻。又入後藥。生薑粉 用大餅生薑四五塊

以黃連末填內濕包火煨取出
 祛腐生肌 出姜汁研乾一分半
 蛸去粗 輕粉各半 製牙硝四
 研極細用磁罐收貯是為陰丹藥雖頗峻但合時有輕重緩急之分而有病輕則輕病重則重之法也如用者須當斟酌

配合陰陽法式 前所製陰陽二丹無獨用之理所謂孤陽不生孤陰不長之義然配合之法其各有五取陰陽生五行之義也開列於後 右藥研有先後二丹為先後所配如加粉砂礬味為次而片屑則又候諸藥研至極細時方可加入同研凡合眼藥皆依此法而粗細須以舌嘗之大抵女人眼藥宜從右轉男子宜從左轉否則治目有反攻之患須識此意

一九金丹 陽丹九 陰丹一 礬砂一分 元明粉一厘 明礬一厘 麝香二厘 冰片三厘

二八木丹 陽丹八 陰丹二 粉霜二厘 元明粉二厘 礬砂二厘 明礬一厘 麝香二厘 梅花片二厘

三七水丹 陽丹七 陰丹三 粉霜四厘 礬砂一分 麝香二厘 冰片三厘 此丹不用礬

四六火丹 陽丹六 陰丹四 粉霜六厘 礬砂五分 明礬二厘 麝香二厘 冰片三厘

陰陽配合土丹 陽丹五 陰丹五 粉霜八厘 礬砂一厘 明礬二厘 麝香一厘 冰片三厘 俱研如前法

用丹頭大要 前所配合諸丹按陰陽生五行之義也其輕重之分則金丹為輕而木丹水丹則漸加重暴發赤眼近年醫眼可以酌點者也至若火土二丹則為峻重遠年老翳膜努肉攀睛方可施治可暫點數次不可常點所謂邪輕則輕邪重則重又須量人眼內客受何如以意推裁不必拘執故曰神而明之存乎其人然點眼宜飽治重眼須用吹若翳膜在眼珠上必吹可現吹較點多有神功眼輕則不可吹吹點後則以桑白皮側柏葉煎水稍熱洗之二可以退散赤腫二可以洗去毒物勿用冷水洗忌寒涼點至將愈時則不

可過點蓋當有餘不盡之意恐過點以致傷藥須識此意

不換金攝雲丹治一切遠年近日 大石蟹一個 大黃 桔梗 川黃連 黃藥 黃芩 防風 荆

芥穗 羌活 烏藥 陳皮 蘇薄荷 枳壳 乾姜 前胡 桑白皮 姜黃 細辛 當歸 木賊草

菊花 柴胡各 右將二十二味細剉用水五大碗放銅器內浸三日將布濾去滓却將石蟹微火煨令

紫色入藥汁內煎冷取起細研為末就將藥水淘飛淨清者以淨器盛浮水安靜室勿動以物覆器上俟使

塵垢入內俟其澄清傾去藥水以蟹粉乾取用配合後之諸藥 蟹粉 坯子各五 熊膽 明礬砂

膽礬各一 銀珠 輕粉 麝仁霜 硃砂各一 川椒 黃連 夜明砂 牛黃 珍珠 冰片各五

巴豆霜 血竭 金靈絡二 右各依製法合碼一日極細無熱磁罐貯之應用名曰丹頭隨病輕重加減

點眼其効如神

輕號丹頭分五 冰片分一 麝香分三 坯子分一 右共蟬極細專治一切風熱暴赤爛弦迎風冷淚怕熱羞明

或兼半年一發或一年數發發作無時悉以輕劑點之不可輕用重藥病輕藥重反受其害內服合病之劑

為助

次輕號丹頭分三 冰片分一 麝香分三 坯子分一 右共蟬極細專治久患不癒球上必生薄翳或有紅筋赤

膜悉以此次輕藥點之每日三四次若見退減日點一二次愈則勿點

重號丹頭分一 冰片分一 麝香分三 坯子分一 右共蟬極細治眼患頗重或弱障膏膜或赤帶痛澀用此次

點每日三四次日漸愈即止吹藥點數亦減內服稍輕藥為愈

至重號丹頭分一 冰片分一 麝香分三 坯子分一 右共蟬極細專治重眼厚膜遮睛釘白翳昏盲無見方點

此藥每日點二三次漸愈漸減