

感應膏錢



南京中医药大学图书馆版权所有

感應篇後卷之四目錄

傷寒病

風

蓄血 瘰癧 淤血 脚氣 霍亂 痘瘍 疱瘡 血症

溫熱

暑症

寒症 晚食 岩燒 痘瘍 痘瘍 痘瘍 痘瘍 痘瘍

春溫冬溫熱病合治
中喝合



感應篇卷之四

傷寒

內經云夫病其皆傷寒之極也蓋六氣為病者体實其一風寒暑濕燥火以因寒不化起故善治傷寒其必体寒兒六淫之氣亦治其是而疫癥之類傷寒者多不一一辨晰以而施治又當要能傳熟臨門是能治傷寒以款寒寒居感寒之八卦也今將款寒治法列於以下庶幾淺於醫學之症不致混入傷寒之病之治宜於感寒思過半矣

部詳傷寒和臣服寒而入先寒以確其六經辨寒用三焦為年溫寒散寒其是疫邪由口鼻吸受宗三焦認寒醫年經用

篇之用至後半退為止。退並與傷寒方不於風。

風症

凡天時時寒暖感生亂其所以風寒之和寒感而以寒者，皆爲陽氣虛也。先傷上焦，一因口鼻而受，先入肺經，生爲病也。見風寒之形，狀如癩瘡，痛身渴。(肺經見癩) 治宜辛涼輕利解之。(辛涼清上焦肺經) 大忌辛溫汗發(大傷寒不能發)。古人治風寒之善藥，湯知少葛根湯內多麻黃羌活苦參皆不可用。(辛溫發表收不可用)

風溫吸入先傷太陰肺分，右寸脉大。(右寸脉微小者，邪在太陰) 痘久而熱，或頭痛，或一邪。



医药大学图书馆版权所有

由筋而分本皮膚) 主治在太陰施灸桑杏姜皮牛蒡連狗膚
桔梗桔梗桑叶之款(轎室上其乳令其和辛涼清散法也) 治
解之痘癩加欒以清痘止散) 痘肉不揭加吹鑊(宣肺清大寒
肺火加石斛(清肺胃火甚) 咽痛加射干(利咽化痰化火潤
一全桔梗) 開癰化毒(乳瘀) 噴加元參(蘆根梨汁 生津化
止瘀因喉鎖痛加桑葉汁(潤喉下氣) 丸散丸正瘧乳精共安
南傷肺(如津和宜生地石斛和麥冬丸) 針刺梨皮之款主之
部許溫却由筋而入於胃其傷肺胃之津病在上中二焦收用
大清肺胃丸利生津潤燥為主治上中二焦之良法
如筋脉喘急胸痛乳納共此症和傷肺及羸內癱也急用桂枝甘草根



極仁並在桂姜皮全所々此以參里丸參連綴之敷清之

肺許者和葛根而中藥不宣氣清血瘀以禳而麻收風濁
喘急疫氣移真之症用半生半熟陽寒歸脾而引氣南
味以清化而其為名

良風清上受而多太陰經癌矣也半生厥陰之性尚於清其症
合參之

以上是感而以參之之法

肺許以上和和者而至易而輕矣而和不解得之心安及心也
復往則入裏而病重矣以溫其症內所列各條治法於直而

合參之



北京中医药大学图书馆版权所有

溫熱春溫冬溫
大病合論 卷葉集

頤常多發之。人陰熱久耗，遇空月非時之暖寒而即病其空病。
(空受空氣者名空病也)。春時木火同令，今天過溫，暖熱和引致伏邪。
溫後內侵其寒溫也。未令炎火感之而病此，其煩渴而不忍食者，其
病也。大抵虛寒之症，陰熱內耗，陰陽妄判，取一觸以除虛之病，
佐參養收而延年，狀甚於陽已乾舌燥者，而之治以石津液而互
旨。凡還傷之過經不詳，或當汗而反發，或當利小便而誤服之症
也。(這共病而用傷寒之法，故久發重收曰遲，且誤後之症)
少陽吟之陽傳內也。見大素而亦有以年三陰三言(溫其宗年經治故以全
三陰三言)。治宜互參。



郎許空不戒其妻必病。陰陽家是淫病之源，故淫淫其病以除
陰阳。肆如言，其妻淫矣。其二症必傷寒也。空日：立春之日，
加首正，其时天暖，人感风邪，引动伏邪，而发病。故名之曰伏。
妻淫矣，夫人内妄伏邪，和身天感夏淫邪，而外病多虚也。如空
妻所如，亦令妄避而外病，女止而前之甚，病如白丝，而
今之妄避，又止，此起而病女止，伏气所蒙之甚，病如白丝。
辨症方可以晰。內經曰：冬傷於寒，其必病淫矣。或曰：為病
淫，因多亡曰為病。其淫病，復出之途，向少陽耳。病發於之病
由陽而淫病，多以春夏陽主之，以春夏陽主於傷寒，此久
邪化其与淫病，皆由於通，而後傷寒与淫并始異而合。

也

又詳於氣時數之溫其病與寒而以發之溫其病見症稍異
氣之病多在裡而著於外表上者亦收和起於其
起於外象以風之溫病取由歸受而主皮毛收和起於
於純虛乃已少法辨認庶無差誤

手太陰氣分

言溫和入屬痘兒於痘癰有發於口體者則陷而微瘡上其頭
主附熱而陷乳瘡（肺火上炎）治宜辛涼輕利桔梗橘紅桑杏連
翹齶荷桔梗麥冬之類或加苦甘為引參竹葉角豆之類（理肺降
氣心痰清土而治）

節許此受而以氣之逆其病首先入肺之主皮毛而在表故見
表症宜辛涼輕解以宣肺上其肺而解之

手少陰心經

溫邪吸入由營及營其舌先白皮絳也或竟入營分則舌必
赤或仁中至微而色淡不寐神玉治諸宜犀角去蘚生地甘竹叶
連翹石菖蒲以解丹皮之款豆疫其加以月必天竺黃之款除疫
清大之劑

節許此承上條由肺而入營以受而有病之溫症也而照邪在
肺而津液耗入心營自肺入營其舌先白皮絳之深紅色也
紅中至微白氣分之和未生如是其擾心營分神農不休自

主上條取在筋刺之病為淺此條由微及著而氣自入內
生病較深下條取和傷入心色微中疫淤而閉生病尤深
皆受而以病之溫其病宗心營而病主陰故以宣是法
邪一法

手厥陰內閉

少陰承傳於膻中而干受其效疫於內閉則神昏沾迷忘絕江起
刺（純紅起刺色微和火赤也）此重症也急宜清心開閉用犀角達
麝以灸天竺素一粒石為蒲淳銀元鉤藤鉤西秀之毒丸
部許膻中為乎一宿城郭入於此十犯之色共逼心中扶疫因
互依致神昏若語而不知而內閉之則久晚夕不處而三候

也宜清火化痰開闢邪氣再加芳香宣發之品如紫雪
至寶丹之類尤妙

以上三條歲而疫氣之淫於病形由口鼻吸受先入肺傳入心肝其毒傳入心包同分入內一層進深一層

修養金參之

溫和細寒

為最其不足惟羌活半夏取以散之瘧氣移常用甘露飲玉女散之
矣

肺經久陰傷均羌活不拘伏氣陰虛主受而以散之治其
俱宜以候正瘧氣移陰寒火旺也二方兼陰散以清暑火為

治

老久煩渴口氣鹹吐石廄湯效至勝中痞內不似胃中反疼或內
沸也一加庚一匙汁荔枝核火汁五二匙冲

諸許中岩胃熱而作痞煩用真山禹胃除煩降火為治
且厭陰泡因

若溫和無汗而必深入厥陰神昏言亂急攻於寐不寐半向於
寐(肝人內擾則煩寐不寐)此素果冷心中火焚其極似寒爲
其而分冷以所火熱旺之候此正久客陰泡止固宜復取陽加減
加生地麥冬矣叫白芍味而酸丹皮生地之類此亦前之症誤
治而取入深汎之救也

部許治其誤治而入極深陷於肝經肝屬木而火木大內鑄
陰阻枯涸而固風動故見症為此故用歸陰治以清肝大為
治

邪氣干血分

風淫之邪入於血營分不解以致舌赤苔微燥於上肺或左甚或右
丹疹此邪退營而止及血分也亥心主血和平立分消成內閉風邪
燥為因宜大禁口苦言直生禍胃必犯淫邪其入體中則宜厥角
九參蘇生地黃一全石為薦丹皮銀花西夷之款多之

鄙辭而知入係以左脉不解以入氣分之不能以傷心營之

太解以入下焦分矣而在血分入裡極深半生俱病陰阻



北京中医药大学图书馆版权所有

受戕毒多泥固內困之候宜拔陰毒而清虛火後之正於
膻中里色微所居在於上宜用薦宜清而忌重固此種方
味淡和入心色之制若入之分當用地黃附陽後加陽方是大

真火候也

氣立兩傷

若感風邪而不但內燔為正氣立而邪氣亦左散右大（散
為寒大而為火燒焉）康吉春瘧盦（陰邪大盛之候）是尤宜

玉女煎

鄙詳淺不佞後並入陽明均傷少陰（陰虛者少陰不足陽以
多得病在中下多焦也宜肺胃陰以清胃火



南京中医药大学图书馆版权所有

邪結上焦

溫邪由口鼻吸入則上焦先受氣立與之和混塞隆固又或清氣不利凡寒熱皮肢筋膜腫脹（寒為少陽之經咽喉癆瘍牙齦紫瘡）寒結上焦而肺脾寒溼不_通 肺左小在搘搗其一（此立清寒之大
敵小和大內先以右肺搘搗）皆邪結上焦所破也當亟疫症施宜速建制牛蒡射干草者湯石銀元亦可商酌取於人中黃之款速用此由天之時毒而偏後尚亟疫症施治用宜教溫和清火解毒之法

鄙諱淺近疫毒口鼻吸受疫法上焦不_可宜教前為大抵風毒
喉腫咽痛若癌法後邪至風毒而成癌宜清其解毒之法

胃中不和

未去足少阳不飲不納其皆胃氣不和也宜灸陵山根半枚於寅時取
等和之

脚汗足胫而胸和不腹胃氣不和故不飲不納當清化便和
和胃氣為急



南京中医药大学图书馆版权所有
www.ntu.edu.cn