

馬氏錦囊秘錄雜症大小合叅卷二十

錦囊治療方論

百病之客乎人身也必有因以客之經曰邪之所客○正必虛○必字何等有力後人當進思矣金姓一令郎年十四而患癇病羣醫不效針灸繼之消痰鎮墜之品備嘗盡矣其發更頻而更甚乃延余治診其脈洪弦有力惟兩尺則弱此陰道虧極孤陽無歛火性上炎僵仆諸候乃發理所然也若用消痰鎮墜之餌不幾更耗陰分乎乃令空心淡鹽湯吞加味八味丸四五錢以使真陽藏納然陽無陰歛



馬氏錦囊秘錄雜症大小合叅卷二十

錦囊治療方論

百病之客乎人身也必有因以客之經曰邪之所客○正必虛○必字何等有力後人當進思矣金姓一令郎年十四而患癇病羣醫不效針灸繼之消痰鎮墜之品備嘗盡矣其發更頻而更甚乃延余治診其脈洪弦有力惟兩尺則弱此陰道虧極孤陽無歛火性上炎僵仆諸候乃發理所然也若用消痰鎮墜之餌不幾更耗陰分乎乃令空心淡鹽湯吞加味八味丸四五錢以使真陽藏納然陽無陰歛



加味八味丸方

熟地黃	一斤用八兩水煎汁去渣將
入兩入斗內煮爛搗爛入藥	懷山藥因雨炒
牡丹皮	四兩焙
白茯苓	三兩入乳拌
透、晒乾焙	山茱萸去核四兩酒
五味子	二兩每箇銅刀切作兩
引蜜酒拌蒸晒乾焙燥	澤鴉二兩淡鹽水
拌晒乾焙	拌晒乾焙燥

牛膝

三兩淡鹽酒拌炒

肉桂

取近裏一層有油而滋潤甜極者  
一兩五錢卽入藥勿出氣不可火

製附子

一兩五錢切薄片微火焙

爲末

用熟地搗爛入藥加煉

蜜杵好集羣手丸晒乾藏磁器瓶中每早空心淡鹽送服四錢隨後進服煎劑使陽藏而陰以秘之也

## 煎方

大熟地

一兩雨丹參一錢麥冬

去心三分生白芍

二錢茯苓

一分

丹皮

一錢五分

遠志肉

甘草煮透一錢二分

牛膝

三五錢

五味子

六分

水二盞燈心十根蓮子十粒去心煎八分溫和服於八味丸後滋陰藥最忌熱服熱服則走陽分不能養陰太

冷則直入腸中、又不能滲行經脈。

### 膏滋丸方

酸棗仁

四兩炒熟搗碎

當歸身

三兩酒浸熟

地八兩金石斛

三兩生地

金石斛五兩生地

白芍藥

三兩蜜水拌晒乾

炒製麥冬

三兩拌炒黃米同炒

燥去朱牛膝二兩水洗

製遠志肉

二兩用甘草濃汁煮透

晒乾焙

先以建蓮肉一觔去心煎

衣煎

取濃汁三十餘碗去渣入前藥在內煎取頭汁二汁去渣熬成極濃膏滋入後藥收成大丸

揀人參

三兩研極細

白茯神

四兩研極細

白茯苓

三兩研極細

以上收入前膏滋內丸成大丸每枚重四錢下午食後



白湯化下一丸

旗下何宅一令郎年錢歲肚腹脹極痞塊有形肌削神困  
僅存皮骨耳中潰膿目中紅腫牙齦出血或時腐爛咳嗽  
氣短腿膝乃疼夜不能寐日不能食已成壞症乃延余治  
詢其病由乃起於半週之內肚稍腫硬卽加消積丸餌久  
服不減乃消導補脾兼而治之久服亦不效乃清熱扶脾  
佐以化積之藥投之其內熱腫脹亦並不減六七年來脹  
極則倍用行氣化滯少緩則用扶脾養胃熱極則用清熱  
和中以延歲月近則腹脹更甚痞硬更大牙疳耳目腫爛

益甚精神益疲、肌肉益削、向治數醫、俱爲束手待斃而已。  
按其脉或時弦洪有力、或時弦而無力、明知久服剋制攻  
主真氣內亂、轉護邪氣爲害、先天之真陰真陽已竭、乃中  
空外浮之象也。要知凡痘氣所成、皆由中氣不能健運以  
致痰食氣滯聚而不散、亦非鐵石物也。故古方消積藥中  
必兼參术扶正、使正氣一旺、自能相佐藥力以化滯於無  
事之中。譬如腫硬氣血一和、不由膿血而自散矣。奈何以  
有形之藥峻攻無形之滯、揆其意、意如有鐵石物在其中  
也、以致中氣愈弱、應滯愈固、愈固、愈消、愈消、愈弱、不死、何

待試不思卽大黃巴豆迅利之藥亦必仗中氣以運行火  
至氣絕之後灌以巴黃効許豈能通利一物巴黃峻利之  
最者無人氣以運行則雖入腹而猶置於紙木器中安然  
不動如此一想則痞聚之類可不仗中氣以運化乎且諸  
病日久未有不累至根本地位受傷故初病多從標久痛  
必從本况此病原由根本上來者平向來所治皆非其治  
也余始先以金匱腎氣丸料加牛膝麥冬五味子作湯大  
劑空心溫服數劑熱減而腹脹稍軟隨以前劑冲八人參  
湯三錢食前日二劑十餘日後精神稍長諸症漸退後早

晨以生脉飲送下加牛膝五味子之入味丸三錢申酉初  
仍以前煎方進服如是調理兩月熱症悉退諸症盡平肌  
肉漸生精神健旺向患之痞竟不知從何處下落矣  
部主政張公五令郎年七歲亦患腹腫醫投消積之藥日  
久而脹益甚肌肉盡削形如鵠立勢甚危篤諸醫已無治  
法而請余視不過冀其十死一生耳余曰此幸藥誤非病  
拙也猶土乾則早再投燥脾丸削益令中氣愈虛而難健  
行於四肢百達乃壅滯於中脹滿甚自然面目四肢瘦  
削不堪要知此長彼消總此氣也此氣斷無消之之理性



中醫書庫

中國醫藥大學圖書館

宜溫養以壯之滋陰以配之補其火以生土益中氣以健  
運健運一行清濁自分腫脹自愈要知諸病不能出乎真  
陰真陽之外而人之求生者寧能外乎真陰真陽之中者  
乎真陰真陽者諸危病之要領求生者之根本也陰陽者  
何腎中之水火是也乃定一方以八味去附子倍熟地更  
加牛膝麥冬五味以潤水枯金燥更能使肺氣注於腎而  
有所歸也十餘劑後諸症漸平乃以前方作丸生脉飲送  
之月餘而全愈奈不能久服病雖去而根本未固次年夏  
月兩脇下忽發腫硬形如婦人之乳垂下外科投以解毒

之劑不惟不效。兩頤之下。腫亦如之。連翹金銀花之類。進以升斗敷貼之藥。塗以百計。毫無減勢。或議開刀。病家懼。乃與余商治。余曰此因去年根本未復。入夏陽氣浮。肝腎之氣不能牢固於下。以致無根之火上炎。則關津管束之處。任其衝燭爲累。何毒之有。經曰。頸項者。生氣之本也。乃肝之俞。又咽喉之管。東陰陽之道路。蓋三陽之脉。自頸而上。三陰之脉。自頸而還。惟其虛也。則無力以還腎。更不能收攝以納。乃浮而腫也。仍以去年之煎方。加青皮四分。土貝母二錢。食前服之。三劑後。腫減大半。不及十劑。

四難俱退矣

戶科李老先生令郎少年鄉薦入都會試適患咳嗽甚煩  
余見其身長肥白顏色常紅已知表有餘而裏不足上假  
熱而下真寒病必當劇勸以重服藥餌令尊先生以有通  
譜候選之新貴甚精醫學日在診治自當霍然也詢其藥  
乃山梔黃芩花粉橘紅貝母蘇子杏仁之類余聞之而心  
甚駭欲阻之恐似嫉妬之言欲順之不忍坐視誤藥傷人  
惟力陳此病頗重望謹慎斟酌勿輕忽從標清理致生他  
變渠皆置之勿聽數劑後而嗽轉甚煩躁喜冷倍常益信

寒涼爲對症之藥。倍用之而病轉劇。乃疑家居不能靜養。  
以致服藥無靈。令移於菴觀之中。同一按摩導氣者爲伴。  
再兼藥餌內外夾攻。無不愈矣。不意二日後。煩躁更甚。  
朱不食。飲水無度。更信爲實熱。以三黃丸下之。究竟利行。  
不多。而喘促逆奔之勢已見。而未甚。又一劑後。夜半喘急。  
大作。有出無入。遍身麻木。濶汗如注。神昏口直。口噤不言。  
使者歸而告急於主。先生寤而告急於余。乃促騎馳去。覽。  
其狀委頓殆盡。按其脉。兩寸左關尚存而已。時當六月。商。  
與四逆理中。主人畏懼。改以人參一兩。麥冬二錢。五味子。



六分。肉桂錢餘。主人始允。急煎服之。喘減片刻。奈病大藥。  
小頃復大作。主人不咎寒涼之罪。而反冤參桂之誤矣。余  
思盡吾之力。尙可以沾釋彼之疑。若徇彼之見。必死而已。  
反受其怨。乃堅定一方。勒合服之。用炒白朮三兩。人參二  
兩。炮薑三錢。五味子一錢五分。製附子二錢。煎濃汁半碗。  
灌之下咽之後。病人張口大聲云。心中如火燎欲死。主餓  
癰。怨交起。余總不動聽之。頃然又大聲云。臍間更疼更熱。  
欲死矣。余竊喜其陽能下達。未至絕也。果少頃喘定。汙收。  
手足溫而神始清。語言反甚無力。握余手而云。寒家雖無

好處及先生先生何肯堅心立救余命也。余日見死不救  
非爲醫矣。分內之事。何足謝爲。然此方以水多而參少者。  
固中宮久困寒涼。不先爲理。中則陽氣終難下達也。  
一張姓暮年而生一子。年十三歲矣。因暮年老人中風。請  
余診治。見其子出迎而步履甚難。問其故。則曰近日忽患  
腿癰。且夕疼痛已。請外科調治數日。俱云勢難消散。出膿  
得兩月。收功。余見身體浮胖。面色㿠白。已知暮年所得先  
天不足矣。再診其脉。六脉沉細而微。復視其腫。則右腿腫  
脹已極。色白而未冷。余思經曰。氣血不和。留結爲癰。今吾



使氣血既和而無留結。則病何自而成。令以昨進乃父之八味湯加牛膝杜仲各二錢食前服之。病家幸最莫逆。余言是諾。一劑之後。腿卽溫煖而腫痛減半。再劑而全退。四劑後。足力如故。步履如常矣。

吏部考功司正郎河南張老先生性稟端方居官清肅原在作令臨潼適當吳逆叛爲文兼武備且久焦勞遂得怔忡耳鳴諸症療者俱以痰治湧出痰涎斗許復用滾痰丸餌痰勢雖清精神內奪繼而逆寇蕩平行取擢列銓部兢兢辦事殫心竭力歷有年矣忽於辛未七月十二日正當

衙門辦事卒倒殞仆痰湧齁鼾日竄口開手足強直自汗  
如雨倉卒擡至私宅醫者病家俱謂斷無生理而危在旦  
刻也值禮科王老先生探視見其勢甚危篤力延余視按  
其脈則六部皆豁大無倫驗其候脫勢已具入九實刻不  
容緩矣乃立一方人參三兩白朮二兩附子五錢煎濃汁  
大半碗灌之令其照方日三劑夜二劑按時進之以補接  
虛脫之勢服後脉氣漸歟身熱漸和潰汙漸收次日仍用  
前方日二服夜一服至三日諸症漸減但殞仆不省如故  
余曰此工夫未到故標症稍平而失散之本元神氣未能