

傷寒標本心法類萃卷上

河間劉守真編集

新安吳勉學校正

傷風

傷風之証頭疼項強肢節煩疼或目痛肌熱乾嘔鼻
塞手足溫自汗出惡風其脉陽浮而緩陰浮而弱此
爲邪在表已上傷風之証皆宜桂枝湯第二次以解
肌傷寒汗出怕風而加項強痛者桂枝葛根湯第三
傷風及無汗者雖已服桂枝湯反煩不解而無裏証
者先刺風池風府却與桂枝葛根湯服之不若通用

雙解散五十一免致有桂枝麻黃之悞傷風自汗白
虎湯二十二金匱方太陽病無汗而渴者不可與白
虎湯

傷寒

傷寒之證頭項病疼腰脊強身體拘急惡寒不煩燥
無自汗或致頭面目疼肌熱鼻乾或胸滿而喘手足
指末微厥脉浮數而緊者邪在表以上傷寒之証皆
宜麻黃湯第一以發其汗傷寒冒風頭目痛四肢拘
倦比金散四十六不若通用天水散四十九或雙解
散之類五十一甚佳無使藥不中病而益加害也○

白虎合涼膈散二十三乃調理傷寒之上藥傷風
妙

中暑

中暑之証身熱頭痛背寒面垢自汗煩燥大渴口乾
倦怠而身不痛或時惡寒或畏日氣脉虛而弱無問
表裏通宜白虎夏月感冒發熱煩渴五苓散二十四
桂枝甘露飲三十四黃連香薷飲五十二或雙解散
或裏熱甚腹滿而脉沉可下者大承氣湯下之或三
一承氣湯尤妙半表半裏者小柴胡涼膈天水散

中濕

中濕之證一身盡疼重者發黃關節煩疼發熱鼻塞
時或腹滿脹大便利脉沉而緩以上中濕之証先用
雙解散微微汗之次用五苓散或淡滲散桂苓甘露
飲曾用甘露飲不愈却用黃連解毒則愈問曰若劑
止土之甘此屬土故以火劑燥土其病則愈

風寒俱中

風寒俱中之証頭痛項強肢體疼手足溫爲中風反
無汗惡寒脉浮緊爲傷寒也或頭項疼腰脊強身體
拘急指末微厥不自汗爲傷寒反煩燥而脉緩者爲
傷風也風則傷衛寒則傷榮榮衛俱傷則表裏熱甚

者通宜以大青湯或雙解散最妙

內外傷寒

始得脉便沉而裏病表和者內傷也脉浮而表病裏和者外傷也病在身體四肢爲表病病在胸腹之內爲裏病內傷通解散外傷雙解散內外一切所傷通神散然不若雙解散以子和爲之三法至神

一切汗候

風寒暑濕飢飽勞逸憂愁思慮恚恐悲怒四時中外諸邪所傷但覺身熱頭疼拘倦強痛無問自汗無汗增寒發熱渴與不渴微甚傷寒疫癘汗病兩感風氣

雜病一切舊病發作三日裏外並宜雙解散設若感
之勢甚本難解者常服雙解散三兩日間亦漸可減
並無所損或裏熱極甚腹滿實痛煩渴譫妄須可下
者三乙承氣湯爲妙或下後未愈或下証未全或大
汗前後逆氣或汗後餘熱不解或遺熱復勞或染他
人病氣汗毒傳染或中瘴氣羊氣牛氣一切穢毒并
漆毒酒毒食毒一切藥毒及墜墮打撲傷損疼痛或
久患風眩頭疼中風偏枯破傷風洗頭風風癰病或
婦人產後諸疾小兒驚風積熱瘡瘍疹痘無問日
但以雙解散服之周身中外氣血宣通病皆除愈

雙解乃通仙之藥但除孕婦及產後月經過多者
瀉者勿與服之惟年老人最宜自有造化於中矣

傳染

凡傷寒疫癘之病何以別之蓋脉不浮者傳染也設
若以熱藥解表不惟不解其病反甚而危殆矣其治
之法自汗宜以蒼朮白虎湯無汗宜滑石涼膈散散
熱而愈其不解者通其表裏微甚隨証治之而與傷
寒之法皆無異也雙解散益元散皆爲神方

表証

凡表証脉浮身體肢節疼痛惡風惡寒者可汗之不

傷寒論卷之
可下也傷寒無汗麻黃湯傷風自汗桂枝湯一法不問風寒通用雙解散或天水散最妙

裏証

凡裏証脉實而不浮不惡寒及惡風身不疼自汗譫語不大便或咽乾腹滿者可下之不可汗也以上之証宜小承氣湯大承氣湯調胃承氣湯選而用之一法不問風寒暑濕或表裏兩証俱不見但無表証而有可下者通用三乙承氣湯下之此藥發峻効使無表熱入裏而無結胸及痞之患疾也或熱結極深而諸藥數下畢竟不能利不救成痼者大承氣湯加甘

遂一錢匕下之病在裏脉沉細者無問風寒者濕或
表裏証俱不見或內外諸邪所傷有汗無汗心腹痛
滿譫妄煩燥畜熱內盛但是脉沉者宜三乙承氣湯
合解毒湯下之解毒調胃承氣湯能瀉大熱

表裏証

表裏俱見之証或半表或半在裏之証者謂前表裏
二証病在相叅有欲汗之而有裏病欲下之而表病
未解汗之不可吐之又不可法當和解傷風白虎湯
傷寒中風或兩感小柴胡湯一法不問風寒暑濕用
涼膈散天水散二藥合一服用煎解之或表熱多裏

熱少天水一涼膈半或裏熱多表熱少涼膈 天水
半表熱極裏有微熱身疼頭痛或眩或嘔不可汗吐
下者天水涼膈散合和解之解之又不能退其熱者
用黃連解毒湯表裏之熱俱微者五苓散表裏之熱
俱盛者大柴胡湯微下之更甚者大柴胡合大承氣
湯下之雙除表裏之熱服雙解散之後若不解病已
傳變後三日在裏法當下之殊不知下之太早則表
熱乘虛而入裏遂成結胸虛痞懊懣發黃之証輕者
必危危者必死但宜平和之藥宣散其表和解其裏
病勢或有汗而愈或無汗氣和而愈用小茈胡涼膈

天水合和主之病在半表半裏用小茈胡涼膈散
和而解之或小茈胡合解毒湯如服熱勢未退者
柴胡合三乙承氣湯表裏俱微半表半裏若裏微者
宜大柴胡合黃連解毒湯合服諸小柴胡湯証後病
不解表裏熱勢更甚而心下急鬱微煩或發熱汗出
不解心下痞鞭嘔吐不利或陽明病多汗或少陰病
下利清水心下痛而口乾或太陰病腹滿而痛或無
表裏証但發熱七八日雖脉浮而數而脉在肌肉實
數而滑者並宜大柴胡湯病至七八日裏熱已甚表
漸微脉雖浮數用三乙承氣湯合解毒下之下証未

全不可下者用白虎湯或知母石膏湯脉洪燥裏有微熱不可汗者用黃連解毒湯

汗後不解

凡是表証法當汗之依法汗之其病又不解汗後不解其証前後別無異証者通宜涼膈散調之以退其熱無使熱甚危極也除此之外遠勝小柴胡湯兩感至此而已汗後餘熱用益元散或小柴胡湯宣武人參石膏湯傷寒大發汗汗出不解反無汗脉尚浮者蒼朮白虎湯解之傷寒用桂枝湯發後半日許復熱順脉浮者再宜桂枝湯汗後不解下証未全者白虎

湯汗後煩躁不得眠微熱而渴五苓散汗後不解
外有熱口乾煩渴柴胡飲子解表之後尚未愈者解
毒涼膈天水散能調順陰陽洗滌藏府

下後不解

凡是裏証法當下之依法下之其病又不解或大下
後或再三下後熱勢尚甚而不退本氣虛損而不能
實擬更下之恐下晚而立歟不下之則熱極而歟寒
涼諸藥不能退其熱勢之甚者或濕熱內餘下利不
止熱不退者或因大下後濕熱利不止而熱不退脉
弱氣虛不可更下者或諸濕熱內餘小便赤澁大便

傷寒論
卷一
溇泄頻併少腹而急痛者必欲作痢也通宜黃連解毒湯以解之傷寒下之大過胃中無熱飲水無力白朮散又有大下之後其熱不退再三下之熱愈甚若下之不止其人脉微氣虛氣弱不加以法無可生之理至此下之亦死不下亦死但用涼膈合解毒湯調之陽熱退除陰脉漸生爲之妙法下之前後無問日數餘熱不解小柴胡湯汗下後胃虛大橘皮湯汗下後胸膈滿悶赤茯苓湯

在上涌之

言病在膈者當用瓜蒂散吐之或表証罷邪熱入裏

結於胸中煩滿而飢不能食四肢微厥而脈乍急
宜瓜蒂散吐之傷寒頭疼久不愈令人喪明胸膈亦
有宿痰故也當先涌之次以白虎湯加減

在下泄之

言病畜熱下焦則承氣抵當之類泄之而可也

合病

三陽合病腹滿身重難以轉側口燥而垢譫語遺尿
如誤發汗則譫語益甚下之則便厥額上汗出後必
發黃白虎湯

兩感

兩感謂一日太陽少陰兩証俱見二日陽明與太陰俱病三日少陽與厥陰俱病前六經之証是也小柴胡湯涼膈散五苓散天水散通聖散雙解散大柴胡湯可選用之熱勢甚欲可下者三乙承氣湯或解毒合承氣湯

痙病

痙之爲病發熱腹滿口噤頭搖瘈瘲不語項強背直腰身反強或目痛或目赤或閉或反目或足溫或妄行其脈沉弦而遲或帶緊者無汗曰剛痙有汗曰柔痙通宜三承氣湯合解毒下之

頭疼

頭疼之証無問風寒暑濕雜病自汗頭疼俱宜白虎湯或加川芎荆芥尤妙頭疼久不愈必致喪明宜先涌痰次用白虎加減風眩痰逆喘嗽頭痛半夏茯苓湯頭痛肢體痛黃連解毒湯頭疼口乾桂枝甘露飲風痰喘嗽頭疼白虎半夏橘皮湯風熱頭疼心煩昏憤人參石膏湯傷寒壯熱頭疼不卧散

身疼

身疼之証無問風寒通解散表熱甚頭項肢體疼痛黃連解毒湯傷寒瘟疫遍身疼痛少力頭旋腰脚麻