

新刊西學集成

五

新刊醫學集成卷之五

後學 義烏 傅滋 續註

○噎膈二十五

俗名翻胃謂吐
不納飲食也

脉法

沉緩而無力或大而弱為氣虛數而無力或濇小為
血虛數而有力為熱寸關沉或伏或大而滑數是痰
寸關脉沉而濇是氣緊而滑吐逆小弱而濇或尺
濇為翻胃若緊而濇者難治

丹溪云屬血虛氣虛有熱有痰夫噎病生於血乾血

也陰主靜內外兩靜則臟腑之火不起而金水二氣
有養陰血自生腸胃津液傳化合宜何噎之有今也
血液俱耗胃脘乾槁其槁在上近咽之下水飲可行
食物難入或可少入名之曰噎其槁在下與胃為近
食雖可入難盡入胃良久復出名之曰膈又曰翻胃
所因不同病出一體按三因等論有五有五膈之分
不徹胃脘痛憂天滯手足厥冷不能自溫勞噎者氣
上膈脇下支滿胃中填塞或背痛思噎者心忪脣喜
忘目視眩上食噎者食無多少皆中苦寒痛不得喘
息此五噎也若思噎則中膈實滿噎則醋心飲食不
消大便不利動噎則胃中氣結津液不通飲食不下
難瘦短氣然噎則胃中逆氣不順噎則筋急惡聞
食氣喜噎則五心煩熱口舌生瘡甚身熱胃痺引
背食少恐噎則心腹脹滿或噎氣逆腹中冷雷鳴逆

脘痛不能食為五萬也。愚嘗見世之病此者多因飲食失宜損傷脾胃。胃作液衰。酒肉肥甘。又復感於七情。或傷於六氣。或食積而氣滯。或成痰。或成五疳。搏不能流通。故病作矣。蓋氣留於咽。壅者則成五疳也。若夫膏肓痞悶。噎逆噎塞。妨礙飲食。結於萬間者。為五萬也。名雖不同。病本則一。宜生津養血。順氣清痰。降火開結。使陰陽平和。氣順痰下。則病無由而作矣。雖按法施治。若不斷厚味。戒惱怒。服良藥。莫能為也。故張機家有云。宜當足神思。問病微內。觀自養可以治之。此言深中病情。可不信哉。

病之初起。因內傷外感。而致痞塞噎酸。餒雜等證。醫者悉用扁方。辛香燥熱之劑。劫之而愈。復作復劫。延蔓至久。而成噎膈。展轉深痼。良可哀憫。

治法

潤養津血。降火散結。用童便。韭汁。竹瀝。姜汁。牛羊乳。

一本有馬尿 氣虛入四君子血虛入四物有熱入解毒有

痰入二陳切忌香燥之藥宜薄滋味

一法 黃連姜汁炒 山查肉 二錢 保和丸末 二錢 粥

丸麻子大胭脂坯為衣人參湯入竹瀝下六十丸

一方 馬剝兒燈燒存性一錢好棗肉平胃散二錢酒

調服食即可下纂要云馬剝兒即野甜瓜味帶酸黃時香其皮色肉味一似家園甜瓜如

雞子大而畧少藤類瓜北方多有之 又方萊萸黃連貝母瓜蔓牛轉草

又方韭汁牛乳一盞生姜半兩頓服

有痰者二陳為主。有氣結開導通氣之劑皆可用

。陰火上炎者治陰火。有積血者消息去之韭汁

熱下膈中瘀血。痰實火盛之人先以瓜蒂散吐之。
後用大黃皂角黑丑朴硝等分為末粥丸服。有自
咽塞住不寬項背轉側不便似乎膈噎之證飲食不
下先有心痛心痛未發一身盡黃先以川芎桔梗山
梔細茶姜汁蘼汁吃吐痰二梔後用葶痰湯加羌活
黃芩紅花人壯可服

不治證

糞如羊屎者年高者沫大出者皆不治

年高雖不治亦用參朮關防氣血年以以四物清胃
脫血。古方用人參以補肺御米以解毒竹瀝以清
痰乾姜以養血粟米以實胃蜜以潤燥姜以去穢有

治寒者必為當時有實因於寒者用之得効不比局
方泛論便凡有此證悉用之也挾寒者間或有之但
今人悉因痰氣又誤於鑿傳變而成其無寒也明矣
子和云三陽結謂之格三陽者大腸小腸小腸結熱則
血脈燥大腸結熱則後不通膀胱結熱則津液涸三
陽既結則前後閉必反而上行此所以噎食不下縱
下而復出也宜先潤養因而治下或痰涎上阻輕用
苦酸微上湧之

丹溪治一中年婦人反胃以四物湯加留白陳皮帶吳
桃仁生甘草酒紅花濃煎入驢尿以防生虫服數十

貼而安。一人勞而有艾妻且喜酒病反胃半年睡
瀉不均重取大而無力便澁面白形瘦精血耗故也
取新溫牛乳飲之每次一盃晝夜五六次漸至入
九次半月便潤月餘而安然或口乾蓋酒毒未解門
飲甘蔗汁少許遂安。一人年四十餘反胃二月惡
食或不吐或涎裹食出則快脈瀉重取弦大因多服
金石房中藥所致時秋熱以竹瀝御米為粥二三啜
而止頗與之遂不吐後以流水煮粥少入竹瀝與之
間以四物加陳皮益其血。一人咽膈間常覺有物
閉悶飲食妨碍脈瀉稍沉形色如常予俟仍飲熱酒

并致以韭汁每服半盞日三服至二升愈。一人不
能頓食喜頓食一日忽咽膈壅塞大便秘結脉瀋似
真臟脉喜其形瘦而色紫黑病見乎冬却有生意以
四物加白朮陳皮濃煎入桃仁十二粒研煎沸飲之
更多食諸般血以助藥力至五十貼便潤七十貼食
進可貼而愈。一人每食必屈曲下膈臆澁微痛脉
右甚瀋關沉左却和此瘀血在胃口氣因鬱而為痰
必食物所致詢之去膈日飲點剝酒三盞遂以韭汁
半盞冷飲細呷之盡半升而愈。一人止能喫稀粥
一匙即可下膈若雜吃一菜即連粥俱吐起居如常

用涼膈散加桔梗服

滑伯仁治一婦人病友胃滿夜飲食至明日中反皆出
或以暖藥罔効脉在肌之下不甚微弱細思前藥無
遠於病何至不効心歎然嘗記東垣云吐有三氣積
寒也上焦吐者從於氣中焦從於積下焦從於寒其
厥沉而進暮食朝出小溲利而大便秘此下焦吐也
法當通其秘溫其寒氣復以中焦藥和之予得此說
而喜笑曰其合於此婦之證歟但此大便不秘遂治
下焦散寒以茱萸茴香為君丁香桂半夏為佐服三十
劑愈經曰寒淫所勝平以辛熱其是之謂歟

鍼經云 怒氣所至食則氣逆而不下勞氣所至為咽

噎喘促思氣所至為中痞三焦閉塞咽嗑不利

附方

大半夏湯

並金匱

治反胃

半夏二升 人參三兩

白蜜

一升一本 有生姜

右以水一斗二升和蜜楊之二百餘

遍煮藥取一升半服一升餘再服

茯苓澤瀉湯

治反胃渴欲飲水

生姜四兩

茯苓

半斤

澤瀉四兩

甘草

桂枝

各二兩

白朮

三兩

右水一斗煮三升內澤瀉煮二升溫服八合日三

壯年反胃

益元散加陳皮半夏

姜汁浸 晒乾

竹瀝蔗汁下

痰氣所致

一陳加枳實砂仁木香

一方

白朮

黃連士炒

神曲

陳皮

半夏曲

宿砂各一兩

吳茱萸

青皮

丁香

霍香

檳榔

山楂

麥芽

三稜

莪朮

良姜

桂花

連翹

茯苓

各半兩

附子

十箇

草豆仁

二兩

右為末姜汁糊丸菰豆大姜湯下八十九

五噎散

張氏

治五噎

乾生姜

甘草

減半

人參

半夏

桔梗

白豆蔻

木香

枳頭糠

白朮

華澄茄

枇杷葉

沉香

等分

石為末每二錢姜七片水煎溫服

一法 糯米為末以牛涎取法以荷葉包牛口使耕力之出於之拌作小

丸煮熟食之遂愈後隨證調理

胡荽丹 治反胃氣結所致

烏雞一箇修製如常法令淨 胡荽子入雞內雞煮食

鍼灸法 憂噎心膈二穴在背五椎下各開二寸半灸七壯 勞噎膈

俞二穴在背七椎下各開一寸半灸七壯 思噎天休二穴在腋下一寸半灸七壯

氣噎膈中一穴在二乳中 食噎乳根二穴在乳下二寸六分

壯灸七 中脘在臍上四寸 脾俞在背十一椎下二旁各開一寸半 針入一分治腹向內

一寸半灸 中魁在手心中第二指末灸七壯 足三里取法見前

○欬逆二十六

脉法

肺脉散者不治

丹溪云有痰有氣壅有陰火。吃逆氣逆也。氣自臍下直衝上出於口而作聲之鳴也。經曰諸逆冲上皆屬於火。古方言胃弱而不及火以丁香柿蒂竹茹陳皮治之。未審孰為降火孰為補虛。况人之陰氣依胃為養。胃土傷損則水侮之。陰為火所乘不得內守木挾相火故直冲清道而上。言胃弱者陰弱也。虛之甚也。

謹按誰知云欬逆治人斷為歲逆其說似是而非蓋歲者乾嘔也。若有物直出則為吐有物旋出則為嘔也。假無物出則為噦也。欬逆者則水漬於肺而心痞或連嘔不已而氣逆或喜笑過多而氣噎或熱飲錯

唯而氣能或急食乾物而氣塞皆能作欬逆之聲
續不已俗謂之乞式是也蓋欬逆者不顧之義吃式
者差錯之意二者皆氣不得下為火耗之而使上至
咽喉壅而止也人或以紙燃鼻嚏而止或聞食香調
氣皆抑之欬之而使氣下也千金以欬逆上氣為病
肺脈散者死是心火刑於肺金也蓋噦者出聲也
出其氣噦聲盡然後吸欬逆者入聲也如氣不出逆
聲尽然後呼也出入呼吸其大不同燕噦者本於
胃欬逆者本於肺何其難辨哉夫水注下流火性上
炎理之常也今其氣自下冲上而作聲非火而何然
有因汗吐下後或誤服涼藥而致者亦有宜溫補之
胃弱陰虛火逆而冲上者平而補之挾熱者涼而補
之傷寒失下大便閉者寒而下之欬飲停蓄或暴氣
逆痰厥形氣實者隨其邪之所在而瀉之泄之清之
利之是
其治也

視有餘不足治之有餘并痰者吐之人參芦之類不足
者人參白朮湯下大補丸痰用二陳氣虛用參朮陰

火黃栢黃連滑石

吃逆自利

滑石甘草黃栢芍藥參朮陳皮竹瀝

治一人年近五十質弱多怒夏月因大怒後痢口渴自
飲蜜水病緩數日後稍大不數予令以參朮湯調益
元散與之痢減數日後倦甚吃逆知其久下陰虛令
守前藥痢米未止又以煉蜜與之衆欲用姜附予謂
陰虛服之必死待前藥力到自愈又四日吃逆止痢
除。一老人久喘新秋患利數日吃作脉豁大以其
形瘦可治用參朮湯下大補陰九而安。一女子性
躁味厚暑月因大怒而吃作舉身跳動神昏視其形

氣實

或曰氣上不得降非吐不可也

以人參芦煎飲

大吐頑痰數掄大汗因睡一日而安人參入手太陰

補陽中之陰芦則反是大瀉太陰之陽女子暴怒氣

上肝主怒肺主氣怒則氣逆肝木乘火侮金故吃作

而神昏今痰盡氣降火衰金氣復位胃氣得和而解

寶鑑

治一人中氣本弱病傷寒八九日醫見其熱甚以

涼藥下之又食梨三枚痛傷脾胃四肢冷時發昏憤

脉動而中止有時自還乃結脉也心亦悸動吃逆不

絕色變青黃精神減少目不欲開蹠足惡人語以炙

甘草湯再服而愈