

誠求集卷三目錄

吐瀉霍亂

吐瀉不治症

嘔吐

嘔吐不治症

泄瀉

泄瀉不治症

腹痛

腹痛不治症

腹脹

腹脹不治症

發腫

浮腫不治症

傷寒症治

傷寒不治症

傷風

附風熱

傷暑

附注夏

濕症

燥症

火症

痰症

癰症

瘰癧

厥治

痞結癖塊

黃疸

黃疸不治症

卷四目錄

便濁

小便不通

泄屁

咬牙

尋衣撮空

不寐

顛腫

諸淋

脫肛

莖囊症

瘡症

睡中驚動

多困

顛陷

遺溺

肛門作痒

偏風口噤

弄舌重舌木舌

諸熱辨

五軟

目直視

大便不通

搖頭便血

滯頤

角弓反張

虛羸

五硬

眼上窻

龜胸龜背

鶴膝

解顱

結核

夜啼

啼哭

喜笑

煩躁

天吊

內吊

盤腸氣

客忤

中惡

唇口蠕動

目睛睜動
眼眶動

目劄咬牙

虺虫

變蒸



誠求集卷三

吐瀉霍亂

小兒因調護不常。乳哺失節。遂致脾胃虧損。清濁相干。而為上吐下瀉之症。先吐而後瀉者。多面赤唇紅。煩渴溲澀。短脉洪數。此脾胃有熱。四苓散加竹茹藿香先瀉而後吐者。多面白神倦。不熱不渴。脉沉濡。脾胃寒也。理中湯有積滯于脾。復為飲食所傷。不能運化而吐瀉者。腹滿按痛。不思乳食。保和丸消導。二陳湯夏秋晝近極熱之地。夜則乘涼露臥。失蓋感冷。陰陽相搏。氣射中焦。而作吐瀉者。六和湯香薷飲脾胃氣虛。或久病後。面唇多白。吐瀉少食。手足厥冷者。六君子加炮姜吐瀉四肢重着。



骨節煩疼者。溫也。加湯減五苓散吐瀉。頭疼身熱。氣粗口燥。或眩暈眼花者。暑毒也。

腹痛煩悶上黃連香薷如飲乳母熱乳而吐瀉。玉露飲。夾暑傷而吐瀉。加味二陳湯。因外感風

食下世常言冷內傷飲食發熱。頭疼藿香正氣散。凡濕霍亂者。面色青冷。忽心腹絞痛。欲吐不止。

欲瀉不瀉。頃刻之間。升降不痛。通便致悶絕。不可輕與飲食。宜熱童便入燒鹽少許。

與飲。或單用鹽湯亦可後以鷄毛掃喉使吐。方可用藥調理。霍亂之極。手足轉筋者。脾肝勝

脾也。木瓜為君。佐以青皮。川連。扁豆。芍藥之類。制肝養筋。又用大劑藿香正其氣。砂

仁。木香。調其氣。茯苓。蘇子。順其氣。或更以手足浸冷水中。自可調暢。

吐瀉不治症



面黃黑硬氣長出多吐而少出多瀉白水不治面白眼慢唇乾鼻塞喉中有痰四肢
冰冷兩脇扇動不治身面俱黃腹中氣响舌黑唇焦喜食熱物不治面青唇黑及合
面卧地不治面青啼哭無淚口角流涎不治時時番身小便頻數不治不啼不哭不
叫声出不治唇赤生瘡眼多赤脉不治大渴不止不治

嘔吐

嘔者有声者也吐者吐出乳食也冷吐者多出少乳片不消色青淡或清涎夾乳吐
出溫中止吐湯若中寒停痰胸滿嘔吐前方去薤苓加丁香皮藿香熱吐者少出多
色黃酸蒼苦面赤唇紅身熱煩躁小便赤少清熱止吐湯若炎天傷暑黃連香茹飲



積吐眼胞浮面微黃足冷肚熱日輕夜重吐黃酸水或清痰或宿食夾乳吐吐有酸
醱氣五苓散化保和丸風痰吐痰道結氣逆連咳而出清金散或加減抱龍丸若久
嗽面白唇乾發乾嘔急宜保肺兼培其母虫吐昏困不省人事胃口時痛時止而嘔
清水宜安虫養胃驚吐早晚發熱山根青色吐而不睡宜扶胃散驚傷乳吐各症無
度運化不及滿而溢出節乳為上消乳飲氣乳出由乳母憂鬱或氣怒不時令兒乳
哺不化而吐須釋其忿怒服寬中順氣藥釀乳兒少与之虛吐面白額汗眼慢神疲
脉沉微助胃膏凡治吐須辨新久如初吐當導利以順氣下行久則須防胃虛生風
至膚削神困顛動停不腹痛少食肢冷露睛此虛極危症速溫補胃氣或有生者

嘔吐不治症

嘔吐不已日漸昏困顙腫顙陷腹上青筋大露不治頻吐不食昏沉語塞喘急大渴常嘔腥臭不治汗流作喘魚口鴉聲不治脉洪身熱而吐蛔虫不治

泄瀉

泄出少而勢緩瀉則直下而不可阻有冷瀉者多出白水瀉蜜而少眉皺腹鳴瀉清不渴溫脾止瀉湯熱瀉者色黃有沫小便赤少氣粗煩躁清熱止瀉湯若腹痛腸鳴卒痛一陳瀉一陳者為火盛之極瀉黃散傷暑瀉身熱煩渴乳食不化瀉深黃色六和湯清暑益氣湯之類若煩悶而小便不利車前子散統以佩藥扁豆葉之類煎湯



不時與飲溫瀉。水腹不痛。肌肉虛浮。身體重着。胃苓湯加車前木通。痰積瀉。時瀉
時止。或少或多。旋覆花湯。食積瀉。色黃如壞雞子。腥臭異常。胸膈飽悶。腹痛去後稍
寬。五苓散化保和丸。若食消痛已而瀉不止者。補中湯。食消痛不止者。異功散。水瀉
潰徹不曲。小水不利。陰陽不分。五苓散。疳瀉。面黃肌瘦。肚脹脚弱。瀉下顏色不一。晝
晝涼。夜熱。不思食。肥兒丸。紫蘇木瓜湯。下驚瀉。糞青如苔。稠若膠粘。或時搐搦。五苓
散化抱龍丸。虛瀉。下完穀不化。困倦神疲。異功散。理中湯。風入腸胃。挾濕作瀉。亦
水穀不化而完出。宜平胃散。加以防風。只散風去濕而瀉自止。又有受肚瀉者。飲
食運化不及。故脾滿而瀉盡則止。復又如是。脾傷弱也。椒薑散治瀉。當不外滲濕。

消導分利補脾四大法其有久瀉而脾氣下陷者升提之腸滑不禁者收澀之至如五泄五瀉名類不一俱可參合前法治之

泄瀉不治症

瀉注脉浮大數不治久痢作嘔有聲無物唇鮮渴逆不治洞泄不止不治瀉如蠡漏水不止食入則嘔昏沉眼窳手足口鼻皆冷不治

腹痛

小兒腹痛起于飲食停滯者居多其症身熱惡食暖氣飽悶按之堅痛保和丸消導二陳湯食久成積而作痛者為積痛其症痛有常處痛則欲便之下酸臭下後痛減



或便閉澀面黃夜熱足冷嗜卧磨積湯肥兒丸有火痛者面赤壯熱口中氣溫引冷
瀉黃散利之寒痛者綿_二時痛無增減面色青白甚且爪甲唇口俱青不思飲食
或更嘔逆泄瀉丁香散香砂理中丸氣滯痛者胸腹痞滿按之無形脈必沉寬氣飲攪
腸沙痛者四肢厥冷腹中絞痛勢迫急用鹽湯探吐次隨症調治虛痛者或病久或
消導後痛益甚手按少止異功散加白芍其餘虫痛內吊痛盤腸氣痛各見本條

腹痛不治症

凡兒心腹痛急面青手足冷指甲青目青悶亂煩躁狂言邪語噴藥喘急者皆不治
腹脹



腹脹肚腹膨脹皮膚併急多由脾氣不舒消脹之主有食則惡食飽悶前妨加神

山查麦芽久而成積或更生虫再加消食化虫當與腹痛門積寒而腹腹滿

不喘喜熱物熨丁香散濕壅而脹脾濕有餘氣不宜通面黃腹胞手足面目漸腫

導滯湯虛脹者久病後或攻伐太過元氣虛弱喘息短氣面白無神或脹痛喜安煩

渴飲湯異功散加桔梗至于喘脹相因須分先後以定標本參喘症門自得

腹脹不治症

病脹者腹堅而大腹皮無紋脐突背平胸高而喘或滑泄皆不可治

發腫



小兒發腫多由脾虛而其症不一有氣腫者因脾胃虛弱脾主肌肉肺主皮毛土弱

不能生金致虛上攻于肺行于面目遍身浮腫也法當調脾行氣五皮子五皮飲水

腫者因上焦煩渴引飲而脾虛不能約制其水一反侮土一隨水行上衝于肺流注

皮膚而為光腫也法當寔脾利水胃苓湯或五苓散調下寔脾散指迷云水腫氣急而小水溢氣腫腹

滿而四肢冷又腫分上下寒熱其腫在上或上先腫者為驟感風邪治宜發散所謂

開鬼門也葶苈散主之腫在下或下先腫者為濕淫所勝治宜利小便所謂潔淨府

也加味茯苓湯主之二症已見濕門一身盡腫須上下分消其濕胃苓五皮湯主之腫而寒

者口不渴身不熱小便畧黃或白平日肥壯脉遲此為上焦陰冷膀胱之氣不化故

令溺少而成腫去寒除腫湯腫而熱者身熱口渴小便赤如油平日瘠瘦弱脉數此
為濕熱鬱積而成腫清熱退腸腫湯有飲食停塞胃中清不能升濁不能降氣壅而
為浮腫者先用消食丸繼以補中湯有中氣不固唇起面淨浮午後足腫為虛腫者
白朮散加減有瀉後痢後瘡後痘後諸病後脾虛發腫者飲食減少四肢無力補中
湯六君子湯有久病小便不利四肢漸腫者脾肺氣虛不能通調水道也金匱加減
腎氣丸更有遍身生瘡因洗浴毒迫歸內而腫者此非水氣乃毒氣也宜先去濕熱
次用敗毒散解之凡腫症惟春令難療以時當木旺土受其剋故也

浮腫不治症



腹起青筋。脐突氣喘者。瀉痢不止。絕粒不食者。手足平完。单刺肚飽者。大小便俱不通。治之不應。皆不治。

傷寒症治

小兒傷寒。与大人無異。所異者。夾驚。夾食。耳寒。邪自外入。內由皮毛。而及臟腑。初起在太陽經。頭項痛。腰脊強。脉浮而緊。噴嚏。淩振。五指稍冷。發熱。惡寒。而無汗。葱白湯加減。外雖發熱。裏未燥。渴不可驟与苦寒。過此則少陽。二經在半表半裏。肌肉之間。脉不浮沉。外候在陽明。則頭額連眉骨痛。脉洪而長。鼻乾。不得眠。葛根湯加減。在少陽。則胸脇痛。耳聾。口苦。嘔逆。脉弦。數往來寒熱。小柴胡湯加減。少陽。二明俱病。柴胡湯加干葛芍。



南京中醫藥大學圖書館藏

藥

外不惡寒而裏燥熱者須即用苓連之類以青解之

三陽不已傳入三陰症見腹滿咽乾自利則別之為大

陰舌乾口燥則別之為少陰舌捲囊縮煩滿腹堅痛則別之為厥陰其寔搖寔揚明

胃府裏寔症脉必沉寔洪數有力外候大熱譫妄轉側身輕掀衣擲搯六七日不大

便宜大小調胃三承氣湯量輕重加減下之

下宜遲不宜早七日後小腹滿硬按之痛時失氣方可議下否則變害不測慎

之慎

如表症未除裏症又急双解湯加減柴胡湯下早邪乘虛入成結胸者胸高氣

粗按之則痛括萎湯入蜜同煎

小兒無大結胸症故不及

有汗下後表症已解邪熱在裏心胸煩

渴欲飲水者石羔湯或加黃連花粉有夾驚者或因驚而又感寒邪或傷寒熱極生

風手足抽搐面紅痰嗽山準頭有青色薄荷湯黃連湯或煎葱白湯化下抱龍丸有



夾食者飲食過度復感寒邪以致發熱頭痛日輕夜重時復吐逆噯氣酸臭或腹痛
脹滿目胞微浮紫葛只寔湯不解者大柴胡湯若初起便不熱身靜而重頭不痛
語言無力難以布息目睛不明口鼻柔冷水漿不入大小便不禁面惡寒如刀刮此
為陰症先用葱熨法內服四逆湯陰寒之極指甲俱青者用老雄雞一隻當脊切開
連腸血等乘熱裹肚臍上將布縛之一週時即醒陽物若縮去可用手扯住其有陽
症未傳入裏誤服涼藥或過飲冷水變為陰症或過食冷物或食後復飲冷水變入
陰病者急以溫中為主傷寒痊或行動不調致損真氣餘邪感觸而病復發者芎復
也宜扶養元神兼治標或脾弱過食不能運化餘邪與穀氣相搏而病復作者食復

