

外科

景岳全書卷六



外科



景岳全書卷之六十四春集

外科鈴古方

會稽 張介賓 曾鐫著

錢塘 曹如璩璧臣氏訂

外科

仙方活命飲

治一切瘡瘍未成膿者內消已成膿者即潰

此止痛消毒之聖藥也

川山甲 蛤粉炒黃 白芷

防風

天花粉

赤芍藥

歸尾

乳香

沒藥

貝母

皂刺

甘草 各錢

金銀花



北京中醫藥大學圖書館版權所有

陳皮各三錢

酒一碗煎數沸溫服

托庚消毒散二

治瘡疽元氣虛弱或行攻伐不能潰散服之

未成即消已成即潰腐肉即去新肉即生若腐肉既清而新

肉不能收斂屬氣虛者四君子湯為主屬血虛者四物湯為主

去氣血代虛者十全大補湯為主並忌寒涼消毒藥

人參各三錢

黃芪各三錢

當歸

川芎

芍藥炒

白朮炒

茯苓各錢

金銀花

白芷各七錢

甘草

連翹各五錢

右水煎服○陳氏托裏消毒散內哉陳皮方在疽瘡○

秘方托裏散一治一切瘡疥始終常服不致內順



瓜蒌

大者一個

當歸

酒拌

黃芪

炒 鹽少

白芍藥

甘草

各一兩半

熟地

天花粉

金銀花

皂刺

炒各一兩

右每用藥五兩以無灰酒五茶鍾入磁器內厚紙封口再用油紙重封置湯鍋內蓋煮至藥香取出分服直至瘡愈○立齋曰此方藥品平易消毒之功甚大且不動臟腑不傷血氣不問陰陽腫潰屢用屢效真仙方也常治發背腦疽勢盛者更用隔蒜灸之若脉沈實大小便秘者先用疎通而後用此其功甚速若火毒已退不作膿或不潰者更宜托裏潰而不欬及膿清者用收補



神功托裏散四

一名金銀花散。治癰疽發背腸癰乳癰及

一切腫毒或炊痛憎寒壯熱

金銀花

黃芪

當歸

甘草等分

右用酒水各一鐘煎至一鐘分病上下食前食後服之少頃

可服一劑相較患處不問老少虛實皆可服若為

參芪托裏散五

治瘡瘍氣血俱虛不能起發或腐潰不能收

斂及惡寒發熱者

人參

氣虛多

黃芪炒

白朮炒

當歸

熟地

芍藥酒炒

茯苓

陳皮

各一錢

右水煎服



參芪內托散六

方在痘疹七

治癰疽膿毒不化及潰後作痛

托裏養營湯七

治癰疽流注一切癰疽不足之證不作膿

或不潰或潰後發熱或惡寒肌肉消瘦飲食不思

人參

黃芪

當歸

川芎

芍藥

白朮

熟地

五味子

麥冬

甘草

水二鍾薑三片棗一枚煎七分食遠服

托裏黃芪湯八

治癰疽氣虛作渴甚效

黃芪

甘草

天花粉

水二鍾煎八分頻服之○加人參一錢亦可○若氣血俱虛

膿血大泄而作渴或兼發熱者宜用托裏養營湯

內補黃芪湯

治難毒內虛毒不起化及潰後諸虛迭見者

黃芪

麥冬

人參

熟地

茯苓

甘草

白芍藥

當歸

川芎

遠志

官桂

右每服一兩薑棗水煎服

托裏養營湯

治清湯氣血俱虛或暗熱內熱寒熱往來或

婦人諸瘡經候不調小便頻數大便不實等證但瘡瘍氣血

虛而發熱者皆宜服之久服亦收斂瘡口



人參

黃芪

當歸

熟地

川芎

芍藥各錢

柴胡

甘草各五分

右水煎服

托裏健中湯十一

治瘡瘍元氣素虛

或因涼藥傷胃飲食少畏或作嘔泄等證

人參

白朮

茯苓各二錢

半夏

炮薑各一錢

黃芪一錢

炙甘草五分

肉桂三分

右薑棗水煎服

托裏溫中湯十二

治瘡瘍膿潰元氣虛寒或因剋伐胃氣脫

陷勝鳴腹痛大便溏泄神思昏憤此寒變內陷緩則不治

附子炮去皮臍二錢

乾薑炒三錢

益志

丁香



羌活

沉香

木香

茴香

陳皮各一錢

炙甘草二錢

右薑水煎服

托裏益中湯十三

治中氣虛弱飲食少思或瘡不消結或腐而全統

人參

白朮

茯苓

炮薑

陳皮

半夏各一錢

木香

炙甘草各五錢

右薑棗水煎服

托裏溫經湯十四

治瘡瘍寒覆皮毛鬱遏經絡不得伸越筋

伏營中聚結赤腫作痛惡寒發熱或痛引肢體若頭面腫痛疾甚仍百發之

麻黃

升麻

防風

乾葛



白芷

人參

當歸

芍藥

甘草

蒼朮錢各一

石水二鍾煎一

鍾服臥煖處得汗乃散○或加柴胡

托裏益黃湯十五

治脾土虛寒水反侮土以民飲化少思或北北治瘧等證

人參

白朮

茯苓

陳皮

半夏錢各一

炮薑

丁香

炙甘草錢各五

右薑棗水煎服

托裏清中湯十六

治脾胃虛弱陰氣不清飲食少思等證

人參

白朮

茯苓

陳皮錢各一

半夏八分

桔梗七分

甘草五分



南京中医药大学图书馆版权所有

右薑棗水服煎服

托裏棟青湯十七

治肝木侮脾土虛弱以致飲食不思或

人參

白朮

茯苓

半夏

陳皮各一錢

芍藥

柴胡

甘草各五分

右薑棗水煎服

托裏營衛湯十八

治瘡瘍外無炊腫內便調和乃邪在經絡也直上此

人參

黃芪

當歸

甘草

紅花

柴胡

連翹

蒼朮米泔

羌活

防風

黃芩各一錢

桂枝七分

右酒水煎服



托裏越鞠湯十九

治六鬱所傷脾胃虛弱飲食少甲子等證

人參

白朮各二錢

陳皮

半夏各一錢

山梔

川芎

香附

蒼朮各七分

炙甘草五分

右薑棗水煎服

定痛托裏散二十

治瘡瘍血虛疼痛之聖藥也

栗殼去蒂炒二錢

當歸酒洗

白芍藥炒

川芎各一錢半

乳香

沒藥

肉桂各一錢

右薑棗水煎服

內托復原散二一

治瘡瘍吹腫在外其脉多浮邪勝必侵於



南京中医药大学图书馆藏

內宜用此托之

人參

白朮炒

當歸

黃芪鹽水炒

芍藥炒

茯苓

甘草炙

地骨皮

肉桂

防已酒炒

黃芩各一錢

防風二錢

右先以棗木一升水五升煎去木人藥再煎至二升

內托羌活湯

治筋骨堅硬腫痛兩尺脉緊無力

羌活

黃柏各一錢

防風

當歸尾

藁朮

肉桂各一錢

連翹

蒼朮米泔炒

陳皮各日

黃芪鹽水炒一錢半

右水酒各一鍾煎八分食前服



內寒散 二三

治陰虛陽邪濇滯患腫或潰而不斂或風寒襲

於患處血氣不能運行久不能愈過成漏證

附子 薑製 浸炮

肉桂 去皮

赤小豆

炙甘草

黃芪 鹽水 少

當歸 酒拌

茯苓

白芷

桔梗 炒

川芎

人參

遠志 去骨

厚朴 制各 一兩

防風 四錢

右為末每服

二錢空心溫酒下或酒糊丸鹽湯下

或煨蜜為丸亦可

中和湯 二四

治瘰癧屬半陰半陽似潰非潰似腫非腫此因元

氣虛弱失於補托所致

人參

陳皮 各二

黃芪

白朮



當歸

白芷各一錢半

茯苓

川芎

皂角刺炒

乳香

沒藥

金銀花

甘草節各一錢

右水酒各半煎服

神效酒煎散二五

治一切瘡瘍能托毒散毒其效如

人參

沒藥吳所

當歸尾略

甘草

括萸一個半生半炒

右以酒三碗煎二碗分四服○或以為末酒糊丸桐子大每

服五十丸用酒下善消毒活血

人參黃芪湯六

治消瘍飲食少思無睡發熱



南京中医药大学图书馆版权所有

人參

白朮

蒼朮

麥冬

陳皮

當歸

升麻

黃芪

黃柏炒四分

右水煎服

黃芪人參湯二七

治潰瘍虛熱無睡少食或機氣所觸作痛

黃芪

鹽水炒

人參

白朮

蒼朮

米泔浸炒

當歸

酒拌

麥門冬

五味子

炒散各一錢

甘草

炙

升麻

神麴

炒

陳皮

各五分

黃柏

酒炒三分

水二鐘薑三片棗一枚煎服

黃芪建中湯二八

內托癰疽諸毒

黃芪

蜜炙

肉桂

各一兩

甘草

炙二兩

白芍藥

六兩