

寒溫條辨 卷四



南京中医药大学图书馆版权所有

傷寒溫病條辨卷四

醫方目錄

麻黃附子細辛湯

升降散

麻黃湯

桂枝湯

大青龍湯

小青龍湯

黃芩湯

白虎湯

附白虎加人參湯

大承氣湯

小承氣湯

調胃承氣湯

大柴胡湯

柴胡龍骨牡蠣湯

增損大柴胡湯

陳氏航

南京中医药大学图书馆版权所有
南京中医药大学 1961

雙解散

增損雙解散

涼膈散

加味涼膈散

三黃石膏湯

增損三黃石膏湯

理中湯

附理中丸

四逆湯

附四味回陽飲

神解散

清化湯

大清涼散

小清涼散

小柴胡湯

附柴胡加芒硝湯 柴胡陷胸湯
柴胡枳桔湯

六一順氣湯

加味六一順氣湯

理陰煎

附陰煎

子理

補陰益氣煎



南京中医药大学图书馆版权所有

大溫中飲

補中益氣湯

桃仁承氣湯

代抵當湯丸

茵陳蒿湯

參胡三白湯

黃連解毒湯

玉女煎

黃龍湯

附補脾湯

大復甦飲

小復甦飲

六味地黃丸料

附腎氣丸料

參胡溫膽湯

人參養榮湯

葛根湯

附桂枝加葛根湯

痛瀉要方

桂枝麻黃各半湯

人參敗毒散

卷之二
冲和湯

葛根加半夏湯

增損普濟消毒飲

眞武湯

梔子豉湯

附梔子生薑豉湯 梔子甘草豉湯
梔子乾薑湯 梔子厚樸湯

瓜蒂散

炙甘草湯

生脈散

左歸丸

右歸丸

蜜煎導法

參歸養榮湯

犀角地黃湯

通脈四逆湯

白頭翁湯

桔梗杏仁煎

腸癰祕方

連翹金貝煎

蠟礬丸

附子湯

桂枝加附子湯

甘草附子湯

正方七十一
附方十四

傷寒溫病條辨卷四

醫方辨引

此論確當

作方圓必以規矩。治病證必以古方。固也。但古方今病焉能盡合。是以羅太無曰。以古方治今病。正如拆舊屋湊新屋。其材本非一。必再經匠氏之手。故用方者。不貴明其所當然。要貴明其所以然。則或增或損。或奇方。或偶方。或合方。或以內傷方治外感。或以外感方治內傷。信手拈來。頭頭是道。許學士云。讀仲景之書。用仲景之法。未嘗執仲景之方。乃爲得仲景之

心也。若不明其所以然。而徒執其方。如經生家。不能
搦管作文。乃記誦先輩程文。以計場屋題目之必中。
奚可哉。是集諸方人所易曉者。止錄其方。其涉疑難。
及理趣深奧者。須採明理論。醫方考。明醫方論等書。
以闡明之。間附一得之見。誠能潛心於此處方。其無
誤乎。抑又有慮焉。仲景傷寒論曰。病當汗解。診其尺
脈濶。先與黃蓍建中湯補之。然後汗之。先賢慎於用
汗藥如此。則吐藥下藥可知矣。故凡用方者。雖方與
病合。又在診脈。並察兼證。以詳辨其虛實。或汗或吐。

或下方爲盡善。若遇老人虛人。血氣陰陽四損者。甯

可顧護元氣。而不可輕用汗吐下之重劑也。

麻黃附子細辛湯

傷寒論曰。少陰病。脈微細。始得之。反發熱。太陽脈

但欲寐。

表熱。脈

沈者。少陰裏寒。此方主之。

麻黃去節附子炮細辛各二錢水煎麻黃去沫。次入附

子細辛煎服。

病發於陰者當無熱。今少陰始病。何以反發熱。此乃太陽少陰之兩感病也。蓋太陽膀胱與少陰腎相爲

表裏寒邪感於少陰故裏有脈沈由絡達於太陽故表有發熱。有太陽之表熱故用麻黃以發汗。有少陰之裏寒故用附子細辛以溫中。三陰之表發與三陽不同。三陰必以溫經之藥爲表故麻黃附子同用。方是少陰表發之正也。按傷寒病兩感者亦少此卽太陽少陰之兩感也。麻黃附子同劑治法委是奇特。學者引伸觸類可應無窮之變矣。且傷寒兩感麻黃附子細辛湯主之。此仲景傷寒兩感之治法。温病兩感雙解散主之。此河間補仲景温病兩感之治法。此

此論卓見真出
人頭地矣傷寒

二方者。乃辨溫病與傷寒。發表攻裏兩感異治之要。
訣也。世之以溫病爲傷寒。以傷寒方治溫病者。觀此
能勿悔心乎。

升降散 溫病亦雜氣中之一也。表裏三焦大熱。其

證不可名狀者。此方主之。

(如頭痛眩運。胸膈脹悶。心腹疼痛。嘔吐)

食者。如內燒作渴。上吐下瀉。身不發熱者。如增
寒壯熱。一身骨節酸痛。飲水無度者。如四肢厥
冷。身涼如冰。而氣噴如火。煩燥不甯者。如身熱
如火。煩渴引飲。頭面猝腫。其大如斗者。如咽喉
腫痛。痰涎壅盛。滴水不能下嚥者。如遍身紅腫。
發塊如瘤者。如斑疹雜出。有似丹毒風瘡者。如
胸高脇起。脹痛。嘔如血汁者。如血從口鼻出。或
目出。或牙縫出。毛孔出者。如血從大便出。甚如

爛瓜肉。屋漏水者。如小便濇淋如血。滴點作疼。
不可忍者。如小便不通。大便水瀉無度。腹痛腸
鳴者。如雷者。如便清瀉白。足重難移者。如肉瞤筋
惕者。如舌捲囊縮者。如舌出寸許。絞擾不住。首
聲不出者。如譫語狂亂。不省人事。如醉如癡者。
如頭疼如破。腰痛如折。滿面紅腫。目不能開者。
如熱盛神昏。形如罪人。哭笑無常。目不能閉者。
如手舞足蹈。見神見鬼。似風癲狂祟者。如誤服
發汗之藥。變爲亡陽之證。而發狂叫跳。或昏不
識人者。外證不同。受邪則一。凡未曾服過他藥
者。無論十日半月。一月。
但服此散。無不輒效。

白殭蠶

酒炒

全蟬蛻

去土

廣薑黃

去皮

川大黃

生

錢

秤准。右爲細末。合研勻。病輕者。分四次服。每

服重一錢八分二釐五毫。用黃酒一盃。蜂蜜五

錢。調勻冷服。中病即止。病重者。分三次服。每服
重二錢四分三釐三毫。黃酒盃半。蜜七錢五分。
本
調勻冷服。最重者分二次服。每服重三錢六分。
五釐。黃酒二盃。蜜一兩。調勻冷服。一時無黃酒。稀熬酒亦可。
斷不可用蒸酒。胎產亦不忌。煉蜜丸。名太極丸。服法同
前。輕重分服。用蜜酒調勻送下。

按溫病總計十五方。輕則清之。神解散。清化湯。芳香
飲。大小清涼散。大小復甦飲。增損三黃石膏湯。八方。
重則瀉之。增損大柴胡湯。增損雙解散。加味涼膈散。

加味六一順氣湯。增損普濟消毒飲。解毒承氣湯。六方而升降散其總方也。輕重皆可酌用。察證切脈斟酌得宜。病之變化。治病之隨機應變。又不可執方耳。按處方必有君臣佐使。而又兼引導。此良工之大法也。是方以殭蠶爲君。蟬蛻爲臣。薑黃爲佐。大黃爲使。米酒爲引。蜂蜜爲導。六法俱備。而方乃成。竊嘗考諸本草。而知殭蠶味辛苦氣薄。喜燥惡濕。得天地清化之氣。輕浮而升陽中之陽。故能勝風除濕。清熱解鬱。從治膀胱相火。引清氣上朝於口。散逆濁結滯之痰。

也。其性屬火。兼土與木。老得金水之化。僵而不腐。溫病火炎土燥。焚木爍金。得秋分之金氣而自衰。故能辟一切怫鬱之邪氣。夫蠶必三眠三起。眠者病也。食薄皆病。而皆不食也。起者愈也。合薄皆愈。而皆能食也。用此而治合家之溫病。所謂因其氣相感。而以意使之者也。故爲君。夫蟬氣寒無毒。味鹹且甘。爲清虛之品。出糞土之中。處極高之上。自甘風露而已。吸風得清陽之真氣。所以能祛風而勝濕。飲露得太陰之精華。所以能滌熱而解毒也。蛻者退也。蓋欲使人退

去其病。亦如蟬之脫然無恙也。亦所謂因其氣相感。
而以意使之者也。故爲臣。薑黃氣味辛苦。大寒無毒。
蠻人生啖。喜其祛邪伐惡。行氣散鬱。能入心脾二經。
建功闢疫。故爲佐。大黃味苦。大寒無毒。上下通行。蓋
亢甚之陽。非此莫抑。苦能瀉火。苦能補虛。一舉而兩
得之。人但知建良將之大勲。而不知有良相之碩德
也。故爲使。米酒性大熱。味辛苦而甘。令飲冷酒。欲其
行遲。傳化以漸。上行頭面。下達足膝。外週毛孔。內通
藏府經絡。驅逐邪氣。無處不到。如物在高巔。必奮飛

冲舉以取之。物在遠方。及深奧之處。更必迅奔探索。
以取之。且喜其和血養氣。伐邪辟惡。仍是華陀舊法。
亦屠蘇之義也。故爲引。蜂蜜甘平無毒。其性大涼。主
治丹毒斑疹。腹內留熱。嘔吐便祕。欲其清熱潤燥。而
自散溫毒也。故爲導。蓋蠶食而不飲。有大便。無小便。
以清化而升陽。蟬飲而不食。有小便。無大便。以清虛
而散火。君明臣良。治化出焉。薑黃辟邪而靖疫。大黃
定亂以致治。佐使同心。功績建焉。酒引之使上行。蜜
潤之使下導。引導協力。遠近通焉。補瀉兼行。無偏勝。