

廣陵醫籍叢刊



瘡證目錄

內經原瘡論

自論瘡由

瘡疾論脈

瘡疾論治

治瘡方論

諸方論附方

清暑破瘡飲

和瘡飲

實瘡飲

虛瘡飲

久瘡飲

各臟腑瘡論附方

加減開邪散

治足太陽膀胱經瘡

加減平陽湯

治足陽明胃經之瘡

和瘡飲

治足少陽膽與三焦之瘡

加減溫脾祛瘡湯

治足太陰脾經之瘡

溫裏退邪湯

治足少陰腎經之瘡

加減補肝祛瘡湯

治足厥陰肝經之瘡

清肺和瘡湯

治手太陰肺經之瘡

清心和瘧飲 治手少陰心手厥陰心包絡之瘧

白虎去石羔加首烏當歸和瘧飲 治瘧瘧方

白虎加桂枝湯 治溫瘧方

蜀漆散 治牝瘧方

加減小柴胡湯 治勞瘧方

柴胡羌活湯 治風瘧方

加減羌活桂枝湯 治寒瘧方

柴胡薑桂湯 治寒多熱少之瘧方

小柴胡加香薷湯 治暑瘧方亦名瘧瘧

人參白虎湯 治症同上

胃苓羌活紫蘇湯 治濕瘡方

提陰升陽湯 治三陰久瘡方

補中益氣湯 治陽虛久瘡方

首烏當歸鱉甲飲 治三陰虛瘡方

清脾飲 治實瘡

鬼哭丹 同上治

七寶飲 同上治

常山飲 同上治

鱉甲飲 同上治

何人飲 治陰陽兩虛久瘡之方



南京中醫藥大學圖書館版權所有

四獸飲 治陽虛久瘡之方

休瘡飲 治同上

牛膝煎 治壯人久瘡之方

追瘡飲

木賊煎

錦囊治久瘡神方

露薑飲

翦歸首烏飲 治孕婦瘡疾之方

加減千金固胎飲 治孕婦瘡疾方

當歸芍藥和瘡湯 治產後瘡疾之方

加減補中和瘧飲

治產後瘧疾之方

理陰煎加柴胡

治產後陰虛之瘧方

截瘧諸方

護薑截瘧方

膏藥截瘧方

蝎棗餅截瘧方

葛仙翁丹砂截瘧丸

不二飲

截惡瘧神方

普濟截瘧方

海上截瘡方

聖惠截久瘡方

宣明截瘡方

瘡後變痢論

附方

和瘡清痢兩解湯

瘡後陰虛調理方

瘡後陽虛調理方

瘡後氣虛調理方

瘡後脾虛腹脹手足頭面浮腫調理方

後天和瘡次

治小兒胎瘡之方

理脾化滯清瘧飲

治同上

瘧瘧論

附方

劉長春治瘧瘧方

彭司寇治瘧瘧方

嶺南治瘧衛生方

大梁李侍詔治瘧瘧方

寒瘧冷瘧方

瘧瘧熱重方

瘧瘧虛寒方

瘧瘧實症寒熱方

祝由科神治截瘧法

內經原癰論

黃帝問岐伯曰、夫癰瘡生於風、其蓄作有時者何也、
岐伯對曰、夜發謂之癰、晝發謂之瘡、癰之始發、先起
於毫毛伸欠、寒慄鼓頷、腰脊俱痛、寒去內外皆熱、頭
痛如破、渴欲飲冷、帝曰、何氣使然、願聞其道、岐伯曰、
陰陽上下交、爭虛實更作、陰陽相移、陽并於陰、則陰
實而陽虛、陽明虛則寒慄鼓頷也、巨陽虛則腰背頭
項痛、三陽俱虛則陰氣勝、陰氣勝則骨寒而痛、寒生
於內、故中外皆寒、陽盛則外熱、陰虛則內熱、外內皆
熱則喘而渴、故欲飲冷也、此皆得之、夏傷於暑、熱氣

盛藏於肌膚之內、腸胃之外、此榮氣之所舍也、此令人汗空踈、腠理開、因得秋氣汗出、遇風及得之以浴、水氣舍於皮膚之內、與衛氣并居、衛氣晝行於陽、夜行於陰、此氣得陽而外出、得陰而內薄、內外相薄、是以日作、帝曰其間日而作者何也、岐伯曰其氣之舍深、內薄於陰、陽氣獨發、陰邪內著、陰與陽爭不得出、是以間日而作也、帝曰善其作日晏與其日早者何氣使然、岐伯曰邪氣客於風府、循脊而下、衛氣一日一夜大會於風府、其明日日下一節、其作也晏、此先客於脊背也、每至於風府則腠理開、腠理開則邪氣

入邪氣入則病作以此日作稍益晏也其出於風府
日下一節二十五日下至骶骨二十六日入於脊內
注於伏膂之脉其氣上行九日出於缺盆之中其氣
日高故作日益早也其間日發者由邪氣內薄於五
臟橫連募原也其道遠其氣深其行遲不能與衛氣
俱行不得皆出故間日乃作也帝曰夫子言衛氣每
至於風府腠理乃發發則邪氣入八則病作今衛氣
日下一節其氣之發也不當風府其日作者柰何岐
伯曰此邪氣客於頭項循膂而下者也故虛實不同
邪中異所則不當其風府也故邪中於頭項者氣至

頭項而病、中於背者、氣至背而病、中於腰脊者、氣至腰脊而病、中於手足者、氣至手足而病、衛氣之所在、與邪氣相合、則病作、故風無常府、衛氣之所發、必開其腠理、邪氣之所舍、則其府也、帝曰、善、夫風之與瘧也、相似同類、而風獨常在、瘧得有時、而休者何也、岐伯曰、風氣留其處、故常在、瘧氣隨經絡、沈以內薄、故衛氣應乃作、帝曰、瘧先寒而後熱者何也、岐伯曰、夏傷於大暑、其汗大出、腠理開發、因遇夏氣淒滄之小寒、藏於腠理皮膚之中、秋傷於風、則病成矣、夫寒者陰氣也、風者陽氣也、先傷於寒、而後傷於風、故先寒

而後熱也、病以時作、名曰寒瘧、帝曰先熱而後寒者何也、岐伯曰此先傷於風、而後傷於寒、故先熱而後寒也、亦以時作、名曰溫瘧、其但熱而不寒者、陰氣先絕、陽氣獨發、則少氣煩冤、手足熱而欲嘔、名曰瘴瘧、帝曰夫經言有餘者寫之、不足者補之、今熱爲有餘、寒爲不足、夫瘧者之寒、湯火不能溫也、及其熱、冰水不能寒也、此皆有餘不足之類、當此之時、良工不能止、必須其自衰、乃刺之、其故何也、願聞其說、岐伯曰經言無刺熇熇之熱、無刺渾渾之脈、無刺漉漉之汗、故爲其病逆、未可治也、夫瘧之始發也、陽并於陰、當

是之時、陽虛而陰盛、外無氣、故先寒慄也、陽虛則外寒、陰盛則內寒、故寒慄鼓頷、外無氣、謂衛氣并於陰而表虛也、陰氣逆極、則復出之陽、陽與陰復并於外、則陰虛而陽實、故後熱而渴、夫瘡氣者、并於陽則陽勝、并於陰則陰勝、陰勝則寒、陽勝則熱、瘡者、風寒之氣不常也、病極則復、至病之發也、如火之熱、如風雨不可當也、故經言曰、方其盛時必毀、因其衰也、事必大昌、此之謂也、此言病邪方盛、刺之必傷正氣、止刺之、則正氣不傷、故曰事必大昌、夫瘡之未發也、陰未并、陽陽未并、陰因而調之、真氣得安、邪氣乃亡、故工

不能治其已發爲其氣逆也、帝曰善攻之柰何、早晏
何如、岐伯曰、瘧之止發也、陰陽之且移也、必從四末
始也、陽已傷陰從之、故先其時、堅束其處、令邪氣不
得入、陰氣不得出、審候見之在孫絡盛堅而血者、皆
取之、此真往而未得并者也、帝曰瘧不發其應何如、
岐伯曰、瘧氣者必更盛更虛、當氣之所在也、病在陽
則熱而脉躁、在陰則寒而脉靜、極則陰陽俱衰、衛氣
相離、故病得休、衛氣集則復病也、帝曰、時有間二日
或至數日發、或渴或不渴、其故何也、岐伯曰、其間日
者、邪氣客於六腑、而有時與衛氣相失、不能相得故

休數日乃作也、榮衛之氣、日行陽分二十五度、夜行陰分二十五度、一日一夜、五十度週於身、邪氣在分肉之間、與之相遇則病、邪氣客於六府、不得相遇、謂之相失、相失則休、故數日乃作也、瘧者、陰陽更勝也、或甚、或不甚、故或渴、或不渴、帝曰、論言夏傷於暑、秋必病瘧、今瘧不必應者、何也、岐伯曰、此應四時者也、其病異形者、反四時也、其以秋病者、寒甚、以冬病者、寒不甚、以春病者、惡風、以夏者、多汗、帝曰、夫病溫瘧、與寒瘧、而皆安舍、舍於何藏、岐伯曰、溫瘧者、得之冬中於風寒、氣藏於骨髓之中、至春則陽氣大發、邪氣