

外臺祕要

S25-4

1474

1部1

卯 11

1

共 40 册



重訂唐王燾先生外臺秘要方卷第五

瘡病十五門

療瘡方二十一首

五藏及胃瘡方六首

溫瘡方五首

山瘡瘡方一十九首

十二時瘡方一十二首

發作無時瘡方三首

瘡瘡方五首

間日瘡方二首

久瘡方八首



南京中醫藥大學圖書館藏

勞瘡方三首

牡瘡方二首

一切瘡方四首

灸瘡法一十三首

穰瘡法六首

許仁則療瘡方四首



南京中醫藥大學圖書館版權所有

唐王燾先生外臺秘要方第五卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞鼓院上護軍臣林億等

新安後學程衍道敬通父訂梓

男 晉錫爲昭父仝校

申錫爲載

療瘡方二十一首

病源夏日傷暑秋必病瘡瘡病之發以時者此由邪氣客

於風府循膂而下衛氣一日一夜常大會於風府其明日

下一節故其作也晏此先客於脊背也每至於風府則腠

理開腠理開則邪氣入邪氣入則病作此所以口作稍益

晏者也其出於風府日下一節二十五日下至尾骶二十

通按

二十五
日一作



二十
日二十
六日一
作十一
二日

六日入於脊內注於伏膂之脉其氣上行九日出於缺盤
之中其氣日高故作日益早也其間日發者由邪氣內積
於五藏橫連募原其道遠其氣深其行遲不能與衛氣俱
行不得皆出故間日蓄積乃作夫衛氣每至於風府則腠
理乃發發則邪氣入邪氣入則病作今衛氣日下一節則
其氣之發也不當風府其日作者奈何曰此邪氣客於頭
項循膂而下者也故虛實不同邪中異所則不得當其風
府也故邪中於頭項者氣至頭項而病中於背者氣至背
而病中於腰脊者氣至腰脊而病中於手足者氣至手足
而病衛氣之所在與邪氣相合則病作故風無常府衛氣

之所發必開其腠理邪氣之所合則其府也風之與瘧也
相與同類而風獨常在也而瘧得以時休者何也山嵐瘴氣
留其處瘧氣隨經絡沈以內薄故衛氣應乃作陽當漸而
不陷陰當升而不升為邪所中陽遇邪則蹇陰遇邪則緊
蹇則惡寒緊則為慄寒慄相薄故名曰瘧弱則發熱浮乃
汗出旦中旦發晚中晚發夫瘧其人形瘦皮必粟起問曰
病瘧以月一日發當以十五日愈設不愈月盡解

出第十
一卷中

廣濟療瘧常山散方

常山

五分

升麻

二分

蜀漆

一分

右三味搗篩為散一服二錢匕和井華水煮米半合頓

服少間則吐吐訖則差忌生葱生菜及諸菓子生冷油

膩等物

又療瘧常山湯方

常山 三兩

右一味切以漿水三升浸經一宿煎取一升欲發前頓

服之後微吐差止忌生葱生菜

近効療瘧間日或夜發者張文仲備急同並出

第一卷中

張仲景傷寒論辨瘧病 印曰大陰氣孤絕陽氣獨發而脉

微者其候必少氣煩滿手足熱而欲嘔也名曰瘧瘧若但

熱不寒者邪氣在心藏外舍分肉之間令人消燦脫肉

通按
脫肉



通按

一作可

溫之

通按

風疾一

作風發

通按

消息之

一作消

息止之

尚德按

若通按

三件要

略同引

一本者

未之發

耳

又辨瘧脉夫瘧脉自弦弦數者多熱弦遲者多寒弦小緊

者下之差弦遲者溫藥愈弦緊者可發汗針灸也浮大者

吐之差脉弦數者風疾也以飲食消息之

又辨瘧歲歲發至三歲發連日發不解者以脅下有痞也

瘧之不得攻其痞但虛其津液先其時發汗其服湯已先

小寒者漸引衣自覆汗出小便利則愈瘧者病人形瘦皮

上必粟起尚德按此千金之文仲景無此論

又問病瘧以月一日發當以十五日愈設不差者當月盡

解也如期不差當云何師曰此結為癥瘕名曰瘧母宜急

療之大鼈甲煎方



又按十
金用灰

十厥作
作作要

仁三
分

鼈甲 十二分

烏扇 三分

黃芩 三分

柴胡 六分

鼠婦 三分

乾薑 三分

大黃 三分

芍藥 五分

桂心 三分

葶藶 二分

石韋 二分

厚朴 二分

牡丹皮 五分

瞿麥 二分

紫葳 三分

半夏 一分

人參 一分

麝蟲 五分

阿膠 三分

蜂窠 四分

赤消 十二分

蠅娘 六分

桃人 三分

生葱胡荽羊肉餒等物 千金有海藻大戟蠱蟲無赤消鼠婦用鐵竈灰一斛

右二十三味末之取鍛竈下上一斗清酒一斛五升浸

土候酒盡一半著鼈甲於中煮令泛爛如膠漆紋取汁

下諸藥煎為丸如梧子大空心服七九日三服忌葷菜

生葱胡荽羊肉餒等物

千金有海藻大戟蠱蟲無赤消鼠婦用鐵竈灰一斛

又瘧發渴者與小柴胡去半夏加栝樓湯方

柴胡 八兩

黃芩 三兩

人參 三兩

大棗 十枚

甘草 三兩

生薑 三兩

栝樓根 四兩

右七味切以水一斗二升煮取六升去滓更煎取三升

溫服一升日三忌海藻菰菜 經心錄療勞瘧並出第十五卷中

肘後療諸瘧方

取青蒿 一把

右一味以水一升漬絞取汁盡服之 備急張文仲同

又方

鼈甲 三兩



右一味擣末酒服方寸匕至發時令服三服兼用火炙
無不斷者忌葷菜

又方

牛膝莖葉一把切以酒三升漬一宿分三服令微有

酒氣不卽斷更作不過三服止

文仲備急集驗同並出第一卷中

深師療瘧膈痰不得吐宜吐之常山烏梅湯方

烏梅

半兩

桂心

半兩

芫花

半兩

豉

五合綿裹

半夏

半兩

常山

半兩

右六味切以酒三升水四升合煮取二升分三服必得

吐一方取三升忌生葱羊肉饒生菜

一方無半夏常山



又癰瘡九神方

人參 三分

鈆丹 三分

天雄 十分 熬

右三味擣合下篩蜜和初服二丸如梧子臨發服五丸
中當溫熱四肢淫淫痺為知服藥忌飽飯食瘡斷後食
如常萬不失一 備急文仲同

又療瘡擦臍湯方

常山 三兩

甘草 三兩 炙

松蘿 二兩

烏梅 十四枚

黃芩 二兩

瓜蒂 十四枚

梔子人 十四枚 擘

右七味切以酒二升漬一宿明旦以水四升煮取三升
分三服忌海藻生葱生菜菰菜等



又瘡結實積熱煩擾迷胃寒熱但多綿悞因篤常山人黃湯方

常山 三兩

甘草 三兩

前胡 二兩

大黃 三兩

右四味切以水一斗煮取三升半下大黃煎取三升

澄令冷初服七合中服八合比欲發服九合王文州大

子因瘡危困服此皆愈忌海藻菰菜生葱生菜等

又療瘡醇醢湯方

生薑 三兩

烏梅 三七枚擘一方十四枚

甘草 三兩

桂心 二兩

常山 三兩

蘘荷根 三兩

右六味切以水六升煮取一升曰醇未發時須頓服更



以水三升煮取一升曰醢至發不斷復頓服甚良別
說發日平旦服醢一升以醇著頭邊若欲發便服
良二說不同也忌海藻菰菜生葱生菜

出第二十

千金麻黃湯療瘧瀉發汗方

麻黃 四兩 去節

大黃 四兩

栝樓 四兩

甘草 一兩 炙

右四味切以水七升煮取二升半分三服未發前食頃

服臨發更服服後皆覆取汗忌海藻菰菜

集驗同出第十卷中

千金翼療瘧病醫不能救者方

以繩量病人腳圍繞足跟及五指一匝訖截斷繩取
所量得繩置項上著反向背上當繩頭處中脊骨上



灸三十壯則定候看復惡寒急灸三十壯則定比至

過發一炊久候之雖飢勿與食盡日此神驗男五足

女右足 出第十八卷中

崔氏療瘡會稽賴公常山湯方

常山 三兩 石膏 入兩碎 甘竹葉 一把 糯米 一百粒

右四味切以水八升明旦欲服今晚漬於銅器中露置

星月下高淨處橫刀其上向明取藥於病人房門前於

銅器裏緩火煎取三升分三服日欲出一服臨發又一

服若即定不須後服取藥滓石膏裏置心上餘四分置

左右手足心甚驗忌生葱生菜 出第四卷中



急華佗常山桂心丸神良方

并草炙

常山

大黃

桂心各四分

右四味末之蜜和平旦服如兔屎每欲發服六丸之欲服藥時先進少熱粥良忌海藻松菜生葱生菜

同出第二卷中

延年療瘡常山丸方

裴右慶送

常山四分

青木香四分

蜀漆一分

牡蠣二分

大黃二分

烏梅肉一分

丹砂二分

豉二分

知母二分

鼈甲二分

麻黃一分

右十一味壽篩蜜和為丸丸如梧子未發前粥飲服五



丸訖微吐後須更任食至欲發更服十九丸忌菹菜生血

物生葱生菜油膩

崔氏同

又療瘡丸方

常山

三兩

甘草

二分

知母

四分

右三味擣篩蜜和爲丸丸如梧子未發前飲服十五丸
臨發服十五丸得快吐則愈忌海藻生葱生菜菰菜

並出

第十五卷中

必効療瘡雞子常山丸方

取雞子一枚斷開頭出黃及白令盡置小鐺子中又

取常山細末量滿前空殼又傾鐺子中又量白蜜還



北京中醫藥大學圖書館藏