

蘭軒外台方標記

猗蘭館置

伊澤蘭軒手稿本

蘭軒外台方標記



外台秘要方

傷寒篇云經云連發汗々不出者死吾思可差之

按書問陰陽樞象論其有邪者瀆形以為汗又唐
書許胤宗傳初事陳為斬茶王外兵參軍時柳太
后病風不言名臣治皆不愈肺益沈而噤胤宗曰
口不可下藥宜以湯氣熏之令藥入腠理周理即
差乃造黃耆防風湯數十斛置於牀下氣如烟霧
其夜便溲語云々

同小建中湯之生方中桂心傷寒論用桂枝而分逆

云去皮。然則桂心者，桂之去皮者也。後世方家謂桂心即肉桂也。用幹桂枝用梢枝，大不同義也。

東垣韓愈論補中益氣湯加減法，若寒覺冷，痛去加皮中桂者，注云桂心是也。

同陰陽諸經傳畫故也。巢氏畫心膏，外台、宋世校條，整正以避諱，心畫耳。真本千金竟字，宋校本心畢。

正此類也。恬養謂巢源宋時校正，不精，可以見耳。

同妻奴丸方，後若日移五犬不汗，肘後方五犬心五赤，恬養赤即尺字。肘後書中徒，乃有之，千金亦作。

五尺此宗臣誤認心火

同崔文衍解散一名皮痺散皮坐心度按此方即上文崔氏度痺散中四味節用耳且方後云痺無氣可以為證

又上文華佗曰若崔文衍度痺散逆云度痺散在雜療中范逆方四味者是也

同陽旦湯千金方無黃芩以桂枝湯即為陽旦湯據傷寒論則千金方似優

同半夏茯苓湯此方原出於靈樞邪客篇半夏湯加

此條本在于
崔氏行解散
條中

伏苓者

栳華湯華傷寒論以花唐以華無花字此華字蓋指
本而不经改易者

天行篇未去喻々恬案喻々與喻々同

同四順湯熱恬案即是傷寒加人參湯也見肘後霍

亂篇又見抱朴子至理篇

同千金水通散又五苓散以上三方俱是滌飲利
水之劑蓋可見外邪復發狂屬飲者多

同天行病差食餌餘云々恬按餌字心餌々與餌同

玉篇魚似蛇同鰈山海經胡灌之書其中多鰈也
鰈亦鰈魚字陶弘景云鰈時行病起食之多獲又
安鰈乃鰈略體耳顏氏家訓書證篇後漢書云鰈
在衛三鰈魚多假借為鰈鮓之鰈倍之學士因謂
之為鰈魚云々

食鰈魚肉結氣不化案圖經本草鰈魚条又有鰈魚
音護相似而大

過病篇肘後屠蘇酒此所引與今行肘後頗異因記
於左

小呂。正朝屠蘇酒法。令人不病。過疫。大黃五分。川椒五分。桂各三分。桔梗四分。烏頭一分。菝葜二分。七物細切。以絹囊貯之。十二月晦日。正中時。懸置井中。至泥。正曉。拜慶。最出之。正旦。取藥置酒中。屠蘇飲之。於東向。藥置井中。能迎歲。可無此。此。當心。此輩他法。武帝有方。驗中。從小至大。少隨所堪。一人飲一家。無患。飲酒三朝。地。云。口口口口。一方有一兩。按此引小呂。此葛氏比陳延之為先輩。此又復人取小呂。所補。宜以外台所引為肘。復真。

面目又

匡心方引玉箱方又異記于左

玉箱方云屠蘇酒治惡氣溫疫

白朮 桔梗 蜀椒 桂心 大黃 烏頭

援枹

防風

各二分

凡八物細切緋袋盛以十二月晦日夕中懸沈井中不令至漚正月朔旦出藥置三升溫酒中屠蘇之東向戶飲之各三合先從小兒起一人服之一家無病一家飲之一里無恙飲藥三朝

還置升中仍歲飲之累代無患傷寒論病論云

按屠蘇酒之名義有諸說此据小呂玉箱之

服方則謂飲之於屠蘇之東也龐安常傷寒

臨病論其說記於左

義尤明晰

瘡疫氣令人不相染及避溫病傷寒屠蘇酒通

曰屋平曰屠蘇左雅曰屠蘇庵也此屠蘇平而

庵園所以不相同今人寒日磨亭下心板閣生

也尊貴之室閣中施利帳錦幃口舍以禦寒故

正旦令飲避溫酒而以此屠蘇為名也此案表

文甕幃間評据此文以屠蘇酒為禦風之義誤

也方後文可考此文以屠蘇酒為禦風之義誤

大黃

桂枝

桔梗

川椒

各十錢

白朮

十錢

烏頭

接契

防風

錢各六

吹咀絳囊盛以十二月晦日早懸沉井中至泥

正旦平曉出藥置酒中屠蘇之束面戶飲之云

夕

黃疸篇仲景傷寒論黃疸麻黃醇酒今本案此即引金

匱金匱附方引千金與此同而千金之文即與煮

法後所引古今方文金同古今二字疑千金誤字

欬

同黃蘗湯

案證類引唐本註云女麴完小麴為之

一名靛

靛音桓

子黃蒸磨小麦為之一名黃衣並食消

止洩痢下胎破冷血也案石金千金翼第十九雜

療八小麦麴條下文同

同大黃力蘼皮梔子消石湯肺經心大黃力蘼梔子

芒消湯千金用礞石則今人用此方而火消者非

再按別錄芒消下曰生枳朴消又消石下曰一名

芒消可併考

同千金寒水石散今本千金方心疑水石散按本經

疑水石別錄一名寒水石唐本注經理為寒水石

作

秘方稱之與此義同

之

湯及此方。此後世無疾不成瘡。寧之語。所祖欽。

同。深師療瘡。醇醑湯。案後世亦有此類。下之所引。備。

急桂。廣州法。醇醑湯法。同方異。

古今歸驗。烏梅丸。案千金烏梅圓。此方又有。

同。述効。挑人常山丸。方後不飲酒。事須酒下三十丸。

案下文。詳仁則論。中有如金綿。懨事須取吐。云々。

若知病雖輕。吐根本未。似得除事。須利之。云々之。

語、眩、則、事、煩、者、熱、語、也、蓋、必、之、義、也、歟

霍亂篇廣濟高良薑湯杜梨枝葉案杜梨即棠梨一名見典籍便覽聖惠方棠梨枝葉一握同木瓜二兩煎汁呷之治霍亂吐瀉不止轉筋腹痛

同小呂霍亂吐痢而汗出小便復利或下後清穀裏外與熱脉微欲絕或要寒四肢拘急手足厥逆四逆加猪膽湯主之方案此條此傷寒論霍亂法中四逆湯證治二條合併者詳記于左
吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷者四逆

湯主之

既吐且利小便復利而大汗出下利清穀內寒外
熱脉微欲絕者四逆湯主之

全方如此而此用加猪胆者傷寒論通脉四
逆加猪胆湯法方耳記於左

吐已下斷汗出乃而厥四肢拘急不解脉微欲絕
者通脉四逆湯主之

藥而論之則小呂台侯三法方者猶不免綱
免之譏歟

又按千金只用四逆而久與傷寒論同

此裏寒無熱傷寒論心裏寒外熱無寒上有
發熱二字蓋宋臣以四逆大過之藥故心無
熱而割發熱二字欤宋臣徒口有此弊

同延年方若熱亂則渴心煩欲得冷水與則宜煮豈
飲冷水及土漿取足定千金方治中熱霍亂暴利
心煩脈數欲得冷水者方右以新汲井水頓服一
升立愈先患胃口冷者勿服之怡案右二法所補
中暑霍亂之類而張子和謂霍亂從濕熱生者欤