

蒼朮

防風

甘草

右咬咀加葱白煎服○治剛痊無汗者加羌活或獨活麻黃

說約

沉香降氣散

四十

治陰陽壅滯氣不升降胸膈痞塞或留

飲吞酸脇下妨悶

沉香

二錢八分

砂仁

七錢半

香附子

去毛鹽水炒六兩
二錢五分

炙甘草

五錢五分

右爲極細末每服二錢入鹽少許沸湯調不拘時服或淡薑

湯亦可

和劑

藶子降氣湯

四一

治心腹脹滿喘促氣急消痰進食

蘓子炒

半夏麴

前胡

當歸

陳皮

厚朴制各八分

桂

甘草各三分

水二鍾薑三片煎七分不拘時服

醫林
小降氣湯四一

治濁氣在上痰涎壅盛

家紫蘓

台烏藥

白芍

陳皮各二錢

炙甘草五分

水一鍾半生薑三片棗一枚煎七分食遠服

統旨
木香順氣散四三

治氣滯腹痛脇痛

木香

香附

檳榔

青皮

陳皮

枳壳

砂仁

厚朴

制

蒼朮 各一錢

炙甘草 五分

水二鍾薑三片煎八分食遠服

局方 木香調氣散 四四

木香

白檀香

白豆蔻

丁香 各二錢

炙甘草

藿香 各八錢
砂仁 四錢

右爲末每服二錢入鹽少許沸湯點服

流氣飲子 四五

治三焦氣壅五臟不和胸膈痞滿肩背攻痛

嘔吐氣喘痰盛浮腫等證○卽外科方脉流氣飲

木香 磨汁

檳榔

青皮

陳皮

枳壳

烏藥

大腹皮

枳實

茯苓

紫蘓

桔梗

防風

黃芪

當歸

川芎

芍藥

甘草

半夏 制各等分

水一鍾半薑三片棗一枚煎服

和劑二十四味流氣飲 四六

調營衛利三焦行痞滯消腫脹

紫蘓

陳皮

青皮

厚朴 制

炙甘草

香附 炒各四兩 木通 二兩

大腹皮

丁香皮

檳榔

肉桂

木香

草果

莪朮炮

藿香各一兩半

麥冬

人參

白朮

赤茯苓

木瓜

白芷

半夏

枳殼炒

石菖蒲各一兩

右每服三錢薑四片棗二枚水煎服

七氣湯四七

治七情之氣鬱結於中心腹絞痛不可忍及不

能飲食

半夏制五兩

人參

肉桂

甘草炙各一兩

右每服三五錢水一鍾半薑三片煎八分服

三
因七氣湯 四八

治如前 按此方即局方四七湯也 在後九七

半夏

五兩制

茯苓

四兩

厚朴

三兩

紫蘓

二兩

右每服三五錢薑七片棗二枚水煎服

加味七氣湯

四九

即前七氣湯加厚朴茯苓各等分

局
方七氣湯 五十

治七情鬱結臟氣互相形尅陰陽不和揮霍

撩亂吐瀉交作

半夏

制

厚朴

芍藥

茯苓

各二錢

人參

肉桂

橘紅

紫蘓

各一錢

水二鍾加薑棗煎服

指迷七氣湯 五一

治七情相干陰陽不得升降氣道壅滯攻衝

作疼積聚癥瘕脹滿等證

半夏

甘草 各七分 香附 錢半

青皮

陳皮

桔梗

官桂

藿香

益智

莪朮 煨各一錢

右每服三五錢薑三片棗一枚水煎服○統旨七氣湯有三

稜玄胡索薑黃草豆寇無半夏桔梗○濟生大七氣湯有三

稜無半夏

四磨飲 五二

治諸逆氣

沉香

烏藥

枳實

檳榔

右四味用白湯共磨服或下養正丹尤佳○一方用白酒磨

○濟生方用人參無枳實○本方加木香即名五磨飲

濟生疏鑿飲 五三

治水氣通身浮腫喘呼氣急煩渴大小

利

澤瀉

茯苓皮

木通

商陸

大腹皮

檳榔

羌活 去蘆

秦艽 去蘆

椒目

赤小豆 炒

右咬咀每服六七錢水一鍾半薑五片煎服

良方厚朴湯 五四

治心腹脹滿此病氣壅實者之治法也

厚朴 四五錢薑汁炒

加生薑五七片水煎溫服○或間用沉香降氣散

木香寬中散 五五

治七情傷於脾胃以致胸膈痞滿停痰氣

逆或成五膈之病

青皮

陳皮

丁香

各四兩厚朴 制一斤

甘草

各五兩

白豆蔻

二兩

香附 炒

砂仁

木香

各三兩

右爲末每服二錢薑鹽湯調服○若脾胃虛損之證不可過服或與六君子兼用之

良木香分氣飲五六

治氣滯留注四肢腹急中滿胸膈脇肋

膨脹虛氣上衝小便臭濁

木香

猪苓

澤瀉

赤茯苓

半夏

枳壳

檳榔

燈草

蘼子等分

右咬咀每服一兩水一鍾半煎八分入麝香末少許食遠服

人參木香散五七

治水氣病

人參

木香

茯苓

滑石

琥珀

海金沙

枳殼

檳榔

猪苓

甘草
等分

右咬咀每服一兩生薑三片水一鍾半煎七分日進三服不

拘時

消導寬中湯
五分

治氣滯食滯水腫脹滿

白朮

一錢半

枳實

麩炒

厚朴

薑制

陳皮

半夏

茯苓

山查

神麴

炒

麥芽

炒

蘿蔔子

炒各一錢

水一鍾半薑三片煎八分食遠服○小便不利加猪苓澤瀉

化滯調中湯 五九 治食滯脹滿

白朮 錢半 人參 白茯苓 陳皮

厚朴 薑汁炒 山查 半夏 各一錢 神麴 炒

麥芽 炒各八分 砂仁 七分

水一鍾半薑三片煎七分食前服○脹甚者加蘿蔔子炒用

一錢麴食傷者尤宜用

索 矩 三和湯 六十 治脾濕腫滿

陳皮 厚朴 薑炒 白朮 檳榔 各一錢

紫蘓 七分

海金沙

木通 各五分

水一鍾半薑三片棗一枚煎七分食遠服

實鑑

導滯通經湯

六一

治脾濕氣不宜通面目手足浮腫

木香

白朮

桑白皮

陳皮 各五錢

茯苓 一兩

右咬咀每服七八錢水一鍾半煎八分食前溫服

良方

導水茯苓湯

六二

治水腫頭面手足徧身腫如爛瓜之狀

按而塌陷胸腹喘滿不能轉側安睡飲食不下小便秘濇溺出如割或如黑豆汁而絕少服喘嗽氣逆諸藥不效者用此

卽漸利而愈

赤茯苓

麥門冬

去心

澤瀉

白朮

各三兩

桑白皮

紫蘓

檳榔

木貳

各一兩

大腹皮

陳皮

砂仁

木香

各七錢半

右咬咀每服一二兩水二鍾燈草三十根煎八分食前服○

如病重者可用藥五兩再倍加麥冬及燈草半兩以水一斗

於砂鍋內熬至一大碗再下小銚內煎至一鍾五更空心服

枳再煎連進此三服自然小水通利一日添如一日

健脾散 六三

和中健胃消食快氣

人參

白朮炒

丁香

藿香

砂仁炒

肉果煨

神麴炒

炙甘草等分

右為細末每服二錢不拘時橘皮湯下

參朮健脾湯六四

治脾虛兼滯脹滿

人參

白茯苓

陳皮

半夏

砂仁

厚朴薑制各一錢 白朮二錢

甘草三分

水一鍾半薑三片煎七分食遠服○加神麴麥芽山查消脹

尤佳

三當歸散六五

水腫之疾多由火不養土土不制水故水氣

盈溢脉道閉塞滲透經絡發為浮腫心腹脹滿之證

當歸

桂心

木香

赤茯苓

木通

檳榔

赤芍藥

牡丹皮

陳皮

白朮

各一錢

木瓜

一斤

水二鍾加紫蘊五葉煎八分不拘時服

當歸活血散

六六

治瘀血脹滿

赤芍藥

歸尾

酒洗

生地黃

各錢

桃仁

去皮尖炒

紅花

酒洗

香附

童便浸各一錢

川芎

牡丹皮

玄胡索

蓬朮

炮各八分

三稜

炮

青皮

各七分

水一鍾半煎七分食前服

局方五皮散 六七

治風濕客於脾經以致面目虛浮四肢腫滿

心腹膨脹上氣急促兼治皮水胎水

五加皮

地骨皮

大腹皮

茯苓皮

生薑皮 等分

右咀每服三錢水一大鍾煎七分熱服無時

瘡瘡 五皮散 六八

治病後身面四肢浮腫小便不利脉虛而大

此由諸氣不能運行散漫於皮膚肌腠之間故令腫滿此藥

最宜