

東醫寶鑑

十六

東醫寶鑑雜病篇卷之八

御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許漢忠教撰

癰疽下

腸癰腹癰

開元欽屬小腸天樞欽屬大腸丹田欽屬三焦其穴分隱痛者為疽上肉微起者為癰也

○腸癰為病小腹腫而強按之則痛小便數似淋時時汗出發熱而復惡寒身皮甲錯腹皮急如

瘡出或甚有腹脹大轉側有水聲或遠臍生瘡膿從

濕熱鬱積腸內成癰脉遲緊者宜大黃牡丹湯或

五香連翹湯上方見下之脉芤澁者宜四物湯或

桃仁紅花玄胡索木香脉洪數者三仁湯小腹痛

尿澀者膿滯也宜牡丹散○腹皮急按之濡身疼

無熱乃陰冷所成宜牡丹散或內托十宣散加炙

東醫寶鑑卷之八

痰膿即愈或蟬蟻元亦佳坊見○腹痛甚者是也治法

同腸

脈法

腸下以平之洪數可推數而下為熱腸癰何疑遲緊未

而數知當屎膿也○腸癰之脈滑而數滑則為

實數則為熱滑則為榮數則為衛衛數下降榮滑

大黃牡丹湯

治腸癰脈遲緊膿未成可下之○大黃芒

錢半右剉作一貼水煎服有膿即下膿無膿即下

針

三仁湯

治腸癰中病痛縱非癰疑似問便可服○

錢右剉作一貼水煎服

牡丹散

治腸癰冷證腹軟而痛時下膿血牡丹皮人參天麻白茯苓黃芪薏苡仁批仁白芷當歸

川芎各二錢官桂甘草各五分木香三分右剉作一貼水煎服

敗醬散

治腸癰身無熱腹滿冷薏苡仁二錢半敗醬一錢半附子炮五分右剉作一貼水煎服小

便當下膿血而愈附子敗醬散

黃黑散

治腹內癰腫大黃一兩取末四錢半破故紙一兩取末二錢牛蒡子一兩取末一錢黑

牛子一貼蜜水調空心服以利為度

腸癰治驗

一婦人腹痛百方不效孫兆診曰腹中痛脉當沉細今反滑數此腸癰也雲母膏作丸溫

酒吞下服一兩下膿血而安

臂癰

傷於風者上先受之宜服白芷升麻湯

白芷升麻湯

治臂癰黃芪酒黃芪各四錢生黃芪三錢白芷一錢半升麻桔梗連翹各一錢

酒紅花甘草各五分右剉分二貼每取一貼酒水各半煎服

醫癰

其位居小腹之後又在於下此陰中之陰也其道遠

可生癰纔有腫痛祭之脉證但見虛弱便與滋補

氣血可保終吉若用尋常驅熱舒氣之藥虛虛之

禍如指諸掌○醫癰初起未成膿者隔蒜灸再

用慈熨法欲作膿者內托羌活湯痛甚者仙方治

懸癰

穀道前後生癰謂之懸癰此病生穀道外腎之間

初發如松子大甚癰漸如蓮子數十日後始覺赤

腫如挑子即破若破而大小便皆從中出者為難

治宜服國老膏○此疾首尾常服國老膏雖患

亦輕雖潰亦淺誤用寒涼則不可救○初起作痛

尿澁者仙方活命飲○此疾去大黃服之○膿已成者

急鍼之○生成漏者加味十全湯○此疾去大黃服之○膿已成者

○穀道中生瘡取水中符葉細搗綿裹納下部日

三即愈

國老膏

治懸癰橫紋大甘草帶節一兩四寸切以山

午乾則投前水再灸直待水盡看甘草中沁潤透

為度細剉好酒二升煎取一升空量飲之潤三

日一服二三服可保無虞此藥雖不貼消過二甚

便癰

俗名便毒實血病也一名野馬經多血故又任為

病而癰見於厥陰經之分野其經多血故又任為

疔或先有疔瘡而發或卒然起核疼痛而發皆熱

毒血聚而成初發宜速利之即散變膿後如常用

托裏內補之藥○便毒處所生於不在腹下不在

間或一腫痛或左右兩邊俱發先用五苓散助

三見坊消毒飲玉燭散神奇散○便毒取三大安一
箇研細熟酒調下劇○便毒初起射干三寸生薑

煮如指大搗細順流水煎服以瀉為度因用阿膠醋

薑一塊蘸米醋磨取千步峯泥付腫處即消又生

蘇方散治大便癰木鱉子當歸尾赤芍藥白芷川芎射

分右剉作一貼酒

牡蠣大黃湯治同上大黃牡蠣各二錢半甘草一

消毒飲治便毒三四日可消皂角刺金銀花藥風當

貼水酒各半煎服仍頻

玉燭散治便毒腫痛大黃芒硝各二錢川芎當歸赤

服空

神奇散

治便毒魚口瘡喉嚨噴嚏者牡蠣大黃各三錢黃連黃芩黃柏金銀花連翹各一錢半穿

山甲三片土炒木鱉子三箇去殼黃蠟三兩右到分作二貼酒水各半煎服

雙解散

治便毒大黃黑丑炒頭末各一錢甘草七分右到分作一

貼薑五片水煎服空心先服是便快是熱從小便出也後大便利皆此濁氣順下將流入

囊癰

者濕熱下注也或陰道或溺水道不利而然膿盡自安勿藥可也或有因腹腫漸流入囊腫甚而囊自裂開

懸掛水出以焚炭末付之囊外以紫蘇藥包裏仰臥

養之○癰疽入囊者曾治數人悉以溫熱入肝經

處治而用補陰藥佐之雖膿潰皮脫畢九懸掛者

附骨疽

附骨疽與白虎飛尸痛淺按之則便止附骨疽則

痛深按其亦無益○白虎飛尸痛淺按之則便止附骨疽則生及腐潰碎骨出盡方愈然則同是一病但淺

深無赤腫突起初因露筋骨之痛如錐刺外則
全無初起不能轉寒熱無汗經久寒鬱為熱變
而為膿膿成即用火鍼使毒不得內潰○初起
宜漏蘆飲子五香連翹湯坊見疎下之次用內消
升麻湯在尻醫宜內托羌活湯坊見在腿內羌活
防己湯在腿外托裏黃芪湯黃連消毒飲坊見潰
後久不愈宜蟾蜍膏赤木元平肌散○初起大
痛而肉色不變名附骨癰三生散最妙無用青皮
甘草節二味煎服○附骨疽與緩疽石疽賊風
相類宜辨而治之

緩疽石疽賊風辨其緩疽石疽皆寒氣伏於骨髓之間

肉俱爛故名曰緩疽○腫與皮肉相似而堅硬
如石故謂之石疽生而肉陷與皮肉相和鹽少許塗付
日一換即軟○賊風由風邪搏於骨髓故其痛亦
徹骨遇寒則甚外證惡寒有汗痛處常欲熱熨失
治則變為痺曲偏枯○緩疽石疽宜服越婢湯疎通之劑
裏溫熱之劑賊風宜服越婢湯疎通之劑

始發預防法

環跳穴痛不已防生附骨疽急用青草

貼又不效恐疽將成急搗地坑以火燒紅次以小

便令患人赤體坐其上以被圍抱下體使熱氣熏

漏蘆飲子

治附骨疽初起宜服他惡瘡初起亦可服

麻赤芍藥朴硝甘草各一錢右剉作一貼水煎服

內消升麻湯

治附骨疽疎下後服此大黃升麻當歸

右剉作一貼水煎服

羌活防己湯

治附骨疽發於方陽喉陰太陰分者羌

活射干白芍藥木通當歸尾蘇木甘草各七分右剉作一貼酒水各半煎服

托裏黃芪湯

治附骨疽發於足少陽陽明分者當歸

分連翹鼠粒子肉桂黃芪各一錢黃柏升麻
甘草各五分右剉作一貼酒水各半煎服

蟾蜍膏 治附骨疽久不收口 蟾蜍一枚亂髮雞子大猪脂四兩右以猪

脂煎二物令稠去滓凝如膏貼之先以桑白皮烏豆煎湯洗瘡口拭乾然後却貼之藥

赤朮元 治附骨疽久不收口 赤朮一兩香破故紙川練子

炒赤茯苓白芷桃仁各一兩右為末蜜丸梧子大溫水下百丸

平肌散 治附骨疽成漏久不合老狗頭骨煨碎蜂房

右為末入輕粉麝香各少許濕則乾糝乾則油調付之

三生散 治附骨疽及瘡口久不合神驗露蜂房酒調

下空

青草蒼栢湯 治附骨疽治宜預防青皮一錢半甘

貼水煎和薑汁三匙空心飲之冬
加掛枝夏加條苓體虛加牛膝

流注骨疽

有流者行也注者住也或結塊或
其痰注之處

而發多生四肢或胃腹腰臂關節之
處初起宜

痰法防見實者十六味酒氣飲防見
無服竹瀝達

自消自潰若潰後久不飲宜以托裏
烏主更佐以

豆豉餅藥珀膏勦規膿成以火鐵破
之於所

起於傷寒傷寒表未盡遺毒於四肢
經絡流注

滯而後為流注也蓋流注者傷寒之
餘毒骨疽者

流注之敗證也○痰飲而注於背項
項臨

腰腿手足聚結腫硬或痛或不痛按
之無膿或有薄
或有一微紅亦淡薄不熱堅如石破
之無膿或有薄
血或出清血或如紫汁又有瘰癧肉
如敗絮或又如
瘰癧在皮肉之間如雞卵可移動軟
活不硬破之
亦無膿血鹹口努肉突出惟覺咽
痰塞作寒作
熱榮衛返魂湯主之○骨疽者由
瘡潰後氣血
不榮骨自脫出膿水腐潰碎骨出
盡方愈蓋人
有正骨附骨傳合成形附骨出則愈
後如常正骨

腐出則為終身廢疾隨腫硬之處潰後久不愈則

接榮氣自歛矣胃自

榮衛返魂湯

主一切痰飲為患專治痰腫赤芍藥木通白芷何首

烏枳殼茴香烏藥當歸甘草各一錢散在劉作一貼

酒水各半煎服○一名追風通氣散一名通順

散又名何首烏散此方宜與十宣散相間用之並

加忍冬藤○凡氣血逆於肉理令壅結為癰疽

此藥大能順氣勻血自然榮衛通順不生癰疽

合內疽○虛加炮附子實加大黃痰盛加南星

半夏腫毒堅硬不穿加川芎麻黃蒼白全蝎穿山

甲流注獨活流注者氣血凝滯加獨活則可以

動一身血脉既動豈復有流注乎○此藥

治泥注癰疽發背至救壞病活死肌○此藥

萌之萌拔根於既愈之後大能順氣勻血蓋氣陽

血之陰也只調陽不和陰則氣耗而凝肌必不活

如五香連翹之類是也只和陰不調陽則血旺而

氣弱病必再作如內補十宣之類是也此藥無之

真神仙妙劑也

疔疽

發於足上下名曰四滿疽其狀大癰不急治之百日發

急治之六其黑者不消輒益不治百日死○發於

足皆治名曰脫疽其狀赤黑者死不治不赤黑者不

死治之○不衰急斬之否則死○蓋故謂之疔近世

多見因食自死牛馬禽獸之肉而發或感襲天地

暴疹之氣而發或恣食辛辣厚味積毒而發其形

有十三種治法皆同初起僅一小瘡殺入於一二

日之內比之癰疽尤毒又有紅絲疔魚臍疔其毒

尤甚○疔瘡發無定處在手足頭面胃背骨節間最急其餘處為緩○

疔疽形證

疔疽生黃疸中或紫黑初發必先痒後

大重則嘔逆為難治○瘡頭黑硬如釘四畔帶

赤如火盤根突起隨變焦黑未幾腫大而光轉為

濕爛深孔透肌如大鍼穿之狀○外證心驚頭

痛拘急惡寒四肢痛強或寒熱交作煩舌間亦黑

點點如珠髓○或不痛痒只麻木寒熱眼以中流火

牙關緊急時時驚惕甚則嘔吐喘急中氣

疔疽治法

痛凡疔瘡毒氣攻心欲死以鍼刺瘡心若覺

血者急刺之百會穴痛有血者下鍼子若無血以親

入熱血代之猶活三四宜用迴瘡鉸子碧霞鉸子

迴瘡蟾酥鉸子○又法急以艾炷灸之鍼疔因

邊皆令血出以迴瘡鉸子○又法急以艾炷灸之鍼疔因

服五香連翹湯千金漏蘆湯見上方疎下之若鍼之

不痛無血者以猛火燒鐵鍼通赤於瘡上烙之令

如焦炭取痛烏效亦緝前鉸子經一二日膿潰根

出服托裏湯散以取平復○治法急用飛龍奪

命丹或雄黃九下之去其毒熱次服化毒九及二

活散○實者初服賽命丹○見三九以葱酒發

表虛者服保生鉸子以解毒○通治紫金鉸返

魂丹一捻金神效奪命丹蟾酥丸獨治紫金聖湯

還魂散千金

消瘰散選用

紅絲疔

疔瘡或有一條如紅線直上倉卒之際急用

青等膏於正瘡內塗之鐵時以病者知痛出血為

紅絲至臍疔生兩手多有紅絲至心疔生面多毒

有紅絲入喉者俱難治急鍼其絲至心疔生面多毒

魚臍疔

水又有一種瘡頭黑深形如魚臍破之滲出黃

逆鬚惹白韭葉各等分研搗如泥取汁以酒和服

其幸貼臍下如病在左手貼左腕下在右手貼右手

臍并左腳貼左腕下在右手貼右腕下在身中貼心

脫疽疔

內經曰膏梁之變足主大疔蓋因膏梁酒色

其經所謂發於足不傷名曰脫疽發於足指名曰脫疽

此也謂之脫疽以其指節潰爛脫去也
色赤自潰先用隔蒜灸內服清血方
魂散重者色黯不痛先用甚者赤變為黑急須在丹指
則斬在肉則割否則黑一上足必死外治用桐油
及無名異煎一沸入川椒一勺看瘡大小剪藥
以此內同煎浸七日即安門

一方治蛇虺全者一條右盛器中黃泥固濟火煨存

性為細末每一錢空為黃水矣因服少五聖湯中端
痛痛止而其瘡已化為黃水矣因服少五聖湯中端

疔疽死證日疔瘡含蓄毒氣突出寸許痛痒之異常一

疔毒入心則口乾煩悶恍惚似醉嘔吐不
也萬病解丹口乾煩悶恍惚似醉嘔吐不

寶命丹潤然真入奪命丹其可服立待也疔毒入心
腹則煩悶嘔逆恍惚癡眠其斃可服立待也疔毒入心

瘡走黃過心者難治若太重則嘔逆疔疽出冷汗者
姑用乳粉托裏散防見止之則嘔逆疔疽出冷汗者