



醫林纂要探源卷九目錄

方劑

嬰兒部

朱蜜法

白龍糝法

茶清拭法

甘草湯

益脾散

蟬蠶散

龍膽湯

天麻丸

沈香天麻丸

風引湯

再見

省風湯

青州白丸

再見

蘇合香丸

大青丸

白餅子

惺惺散

大連翹湯

利驚丸

理中湯

再見

人參毓神湯

開關左右散

防風導赤散

蟬蛻釣藤飲

當歸散

花火膏

蟬蛻散

六神散

抱龍丸

白銀湯

紫霜丸

柴胡人參湯

當歸人參散

調氣散

代赭石散

天南星散

蠍虎散

磨消乳丸

保和丸

枳實消痞丸

白朮散

肥兒丸

胡黃連丸

茯苓散

換肌丸

清肺飲

使君子地黃丸

蓮子黃連丸

蝦蟆丸

蜘蛛膏

使君子丸

化蟲丸

檳榔散

烏梅湯

烏梅丸

再見

凡五十四方 內複見四

痘疹部

惺惺散 再見

參蘇飲 再見

升麻湯 再見

宣風散

十神解毒湯

羌防散鬱湯

桔梗荆芥湯

桔梗麥冬湯

導赤散 三見

犀角地黄湯 再見

消毒飲 三見

快斑湯

臙脂膏

保元湯

太乙保和湯

益元透肌散

保元人乳湯

保元固氣湯

獨聖散

牛李膏

豬尾膏

狗蠅散

十宣散

十全大補湯

敗草散

松花散

木香散

異功散

枳殼湯

寬中散

麥門冬湯

滋燥養榮湯

再見

保嬰八補湯

八珍加木香牛蒡子湯

八珍加黃芩知母湯

八珍加麥門冬五味子湯

八珍加肉果木通湯 木香歸蟬散

桔梗消毒湯 柴苓湯 再見

益元散 三見 內滌湯

韶粉散 玉髓膏

花露膏 決明散

紫貝散

附痘瘡避忌 附稀痘方 五

凡四十七方 內複見八條

麻疹部

升麻葛根湯 再見 升麻柴胡湯

麻黃湯

再見

參蘇飲

再見

消毒飲

再見

化斑湯

六一散

四見

四物滋陰湯

黃連杏仁湯

黃芩知母湯

普濟消毒飲

再見

四物湯

四見

芍芩湯

香連丸

再見

養陰消毒湯

蜘蛛膏

再見

桔梗消毒湯

再見

栗枝洗法

四物加麩湯

凡十九方

內複見十

醫林纂要採源卷九

婺源汪紱雙池輯後學

吳縣徐大鑒子丹  
吳縣吳大彬俊卿  
同邑程夢元賦園  
溧陽強汝諤莘原  
元和管禮昌叔王  
慈谿林頤山晉霞

同校字

方劑

嬰兒部

小兒之疾與大人同。但口未能言。又脈氣未定。難於診察。故昔人謂之啞科。錢仲陽脈法言脈亂為氣不和。弦急為傷食。沈緩為虛。促急為驚。浮為風。沈為冷。水鏡云三部逆順難明。須辨虎口三關。凡未至三歲。看男左女右。虎口第二指根第一節為風關。若脈見病初交第二節為氣關。脈見病深重。第三節為命關。脈見死不治。其紋見色青為驚。色赤多熱。急驚。紅黃為食積。淡白為疳。紫黑為寒。為慢驚。又云。三關青者四足驚。赤者水火驚。黑者人驚。紫色瀉利。黃色雷驚。脈紋入掌心內弔文。曲向

裏風盛。曲向外。食積。上蒸。如線一直。驚熱。三條或散者。風痰。愚按虎口經脈。上出指尖。亦太陰肺經所分行。驗其脈色。以察病症。固亦猶診太淵寸口之意。但此經脈文色。有皮厚雖病而不見者。有皮薄無病而亦見者。有無病而紋透三關者。是亦未可盡據。又徵之面。而分五部。左腮為肝。右腮為肺。額上為心。下頰為腎。鼻上為脾。此亦伸陽之法。然額上屬心。下頰屬腎。鼻上屬脾。可準。而兩腮分屬肝肺。則難準。莫若口議所云。五位氣色。總見藍青色者。驚積不散。欲發候火。紅色者。痰積壅盛。驚悸增進。黃土色者。食積癥傷。欲作疳疾。痞癍。灰白色者。大腸滑泄。水穀不分。欲作吐利。慘黑色者。臟腑欲絕。其疾危惡。其兒不久也。大概面部如印堂山根。見青黑色。多主驚悸。人中見黑色。主蛔。黑氣繞口者。多死。面頰赤多主火熱。餘可類推。難以細分也。至於太淵脈法。則未及三歲者。皆以一指意分三關。而以一入至為平。九至為過。七至為不及。四歲以後。用一指滾轉別三部。七歲以後。可稍移指診之。成童以後。則與大方脈同矣。小兒之疾。惟臍風與急漫驚風及變蒸之候。異於大人。茲則輯其最

要於用者數方於左。其餘風寒食積皆與大方脈同治。可無贅述。又古方治小兒病。每多用金石香竄峻利之藥。恐非柔脆之體所勝。又非貧家所能猝辦。故茲亦不多及云。

朱蜜法

肘後方

小兒初生。口有液毒瘀血。宜於啼聲未出時。急用絛裹指為拭去。不然。則嚙下。使兒多愚。且生瘡疹。然倉猝之際。不及如法。則用此解之。

甘草

細切

黃連

細切

硃砂

細研

蜂蜜

各少許

宜預備。分器

貯之。收生之際。急以沸湯泡甘草。以絛裹指蘸甘草汁。拭兒口。次用泡黃連汁拭兒口。又次以蜜一蠅殼和硃

砂抹兒口中。可鎮心安神。且解胎毒。

按此方固可解胎熱之毒。然有胎中

帶寒者。則黃連非所宜。故有用淡豉汁者。或濃茶者。此皆察母之體氣。可以隨宜而施之於其子。又俗有用艾

火灸百會穴者。此則恐反致火毒。大非所宜。不可從。

### 白龍糝法

直指方

小兒初生翦臍法。視其實者深之。弱者則淺之。昔人云。斷臍不盈尺。一撮之內。隨其根蒂自落。其或有翦臍不慎。傷於外風。致臍瘡不乾者。可用此傳之。

### 白礬

收濕且能益心。

### 龍骨

斂氣且能安神。

### 絲綿

斂瘡口且能禦風去寒。

各少

許煨研末。燒綿灰合之。以糝臍上。

每日換尿布時。仍展視加糝。

臍濕

自乾。且可免臍突及風證。

又方用枯礬三錢五分。礬香五分。硃砂五分。麝香冰片各

五釐。按冰麝香竄。恐兒體弱。則非所宜。尤恐反引風入裏。不如此方之穩。

### 茶清拭法

小兒七日之內。臍風撮口。鮮有活者。宜預審視其口中。齒齲之上。有小白泡子。如粟米狀。是則胃中風熱。

所變見。乃臍風撮口之兆。預用此法可免。

濃煎好陳細茶

甘苦寒。而氣味輕清。能升清陽。於上。降濁陰於下。祛風蕩熱。

用青布

裹指。

資藍。澁之氣。以舒肝風。而靖心熱。

蘸茶拭兒口中。擦破其齧上之

粟粒小泡。撮口可頓開。甚效。

### 甘草湯

治噤風撮口。取吐風痰。

生甘草

一錢濃煎汁。餵之。取吐風痰後。取豬尾血少許。點

入口中。

甘草生用。散而有補。解毒而不失之寒涼。雖可涌吐。而能緩肝之急。豬尾血取其掉動不止。為

全身血脈所注。故能通血脈。古方用豬尾。或用豬乳。不

然也。○古方瓜蒂散。控痰散。多失過切。不若此之平穩。

控痰散用蠟尾銅青硃砂膩粉麝香。茶調下。

### 益脾散

治小兒噤風。用甘草湯吐痰後。可與此湯以和脾胃。噤風者眼閉口噤。啼聲不出。舌上齟上。聚肉如粟。不能飲乳。大小便通而口吐白沫。此脾胃有風寒滯鬱。得自母胎。產時復為風邪所搏。則鬱而成熱。變見於喉。舌間。故二便通而口上噤。百二十日後。宜防此證。

人參 白茯苓 益元氣 厚脾土 木香 陳皮 疎肝和胃 通理上下 草

果 煨 厚朴 去陳腐 開鬱 積破堅結 蘇子 炒 邪降逆氣 甘草 炙

和中等分為末。每二錢。薑棗煎服。此和平之劑。自有殊功。以辰砂礪砂牙硝元明粉全蠍珠麝治風噤。愚案此證宜屬胃寒。故口吐白沫。而二便通利。其似乎有熱者。乃外風激之耳。辰砂散藥多寒涼。似非所宜。如熱重不得已用之。亦只可少許。塗傅乳上。使兒吮之。

### 蟬蠶散

治小兒撮口證。撮口者。面目黃赤。舌強唇青。氣息喘急。啼聲不出。聚口縴。不能飲乳。初生七日內。每見之。甚者。腹脹青筋。掣急引痛。若口吐白沫。四肢冷者。多不治。此由胎氣挾熱。母食辛熱之物。至轉生熱風。又或胎受驚氣。兼之產時風邪入臍。內外搏擊。而成此證。最為惡候。

蟬蛻 去嘴脚炙四個。○甘寒。能緩肝和脾。去濁熱。除風濕。宣達陽氣。清肺膏心。 僵蠶 去絲

四條。○甘辛鹹。祛風勝濕。補心安神。清肺瀉熱。補肝和胃。通利經絡。 全蠍 炙去毒一錢。○辛酸鹹。專

入肝木。主 茯苓 五分。○安心神。利小便。此治諸風。主 證多不。小便。故宜加用。 釣藤 鉤

一錢。○甘苦寒。緩肝風。抑相火。主治驚癇癡胎。風客忤。 硃砂 少許。為末。每服一錢。

取竹瀝調下。竹瀝甘寒。通行經絡。若倉猝間。竹葉亦可。用。○此方本古。殭蠶膏方。而斟酌之。治撮

口證。最為平穩。其有初生小兒。便不能飲乳。小便。犯此

證者。先用葱白五。四寸。和乳搗蒸。抹兒口中。即能飲乳

乃繼服。此可也。

醫林真寶要 卷九 方劑 嬰兒部 益脾散 蟬蛻散 龍膽湯

龍膽湯

本千金方。此從楊氏加減。

治胎驚。月內氣盛發熱。臍風撮口。血脈盛實。四肢驚掣。發熱大吐。及變蒸不解。客忤驚癇等證。凡十歲以下。皆可酌量輕重服之。按臍風證。亦多由母腹中經受風濕。或多食辛熱。或房慾不禁。或偏食生冷。或感觸驚駭。皆為兒病之原。至產下斷臍之頃。又或為水濕風冷所乘。外淫自臍而入。內外搏激。遂令腹脹臍腫。身重肢弱。日夜多啼。不能飲乳。甚乃發為風搐矣。然此證亦有寒熱虛實。內外輕重。非可一例治。如兒身熱填胸坎證。盛實者。則可用此。若臍旁青黑。爪甲黑者。為內搐。甚重。死不治。

龍膽草

釣藤鈎

柴胡

拔在下之清氣而升之。

桔梗

降在上之逆氣

而下

甘草

炙。厚其中之正氣而和之。

白芍

陽氣過亢。為之斂之。

茯苓

心火恟恍。為之安之。

麥門冬

清肺甯心。

防風

疎肝和脾。且逐外淫。以上各五錢。此二

味直指。方所加。

黃芩

大黃

煨。以上各二錢半。蕩除肺胃之熱。

剉散。每服視

兒大小為輕重。如百日內者，每只服錢許，稍長略加。○舊方有蜣螂，直指方去之。加大棗煎服，得利則止。此兒多熱，熱則便秘，得利則止，不可過服。

### 天麻丸

治臍風釣腸鎖肚撮口諸證。或胎氣本寒，翦臍時復感風冷水濕，致令腹脹臍腫，四肢柔直，日夜驚啼，不能吮乳者，故以温中逐痰祛風為治。

天南星 泡二錢 ○辛苦潤腎補肝祛風去濕破滯通關 白附子 泡一錢 ○辛苦

經之風能逐寒痰治搐搦 天麻 一錢 ○辛温主治肝風 五靈脂

一錢 ○甘鹹活血散瘀 全蠍 焙一錢 巴豆霜 少許 ○定驚止癇通利經絡

驅逐沈寒 牙硝 一錢 ○辛苦鹹能軟堅攻積合巴宣達關竅 豆霜用之能破積而不致洩瀉