

本經逢原
卷四

人 禽 魚 蟲

部 部 部 部

獸 介 龍

蛇

部 部 部

本經逢原卷四

清 長洲石頑張璐路玉父纂述

以柔安世

男

訥遜言

參訂

日本 大泉長菴前田安宅子仁

再訂

男

典子守

蟲部

蜂蜜 甘平無毒。入調補藥用白蜜。瀉火藥用赤蜜。味酸者不堪入藥。不可與生葱獨蒜萬苣同食。令人下利。凡煉蜜炭火慢煉。掠去浮沫。至滴水成珠為度。煉成每觔入陳酒四兩。再熬沸。和藥為丸。則藥力易化。本經主心腹邪氣。諸驚癇瘕。安五藏補不足。益氣補中。止痛。

解毒除衆病。和百藥。久服強志輕身。不饑不老。
發明蜂采無毒之花。醞釀而成。生則性涼清熱。故能治心
腹之邪氣。熟則性溫補中。安五藏諸不足。甘而和平。故能解
毒。柔而潤澤。故能潤燥。緩以去急。故能主心腹肌肉瘡瘍之
痛。仲景治陽明結燥。大便不通。用蜜煎導法。取其能通結燥
而不傷腸胃也。凡滋補藥。俱用煉白蜜丸。取其和脾潤肺也。
赤蜜味酸。食之令人心煩。惟降火藥用之。白蜜雖補脾肺。然
性涼潤。脾胃不實。腎氣虛滑。及溼熱痰滯。胸痞不寬者。咸須
忌之。故瓊玉膏用糖霜。枳朮丸用荷葉裹飯。佐金丸用米飲。
牛黃丸用蒸餅。黑錫丹用酒麴。慈珠丸用神麴。虎潛丸用酒。
香連丸用醋。茸珠丹用紅棗。滾痰丸用水泛。各有所宜。今人
修製丸劑。槩用蜂蜜。殊失先哲用方之義。

蜜蠟 淡平無毒。

本經主下痢膿血。補中。續絕傷。金瘡。益氣不饑耐老。
發明 蜜成於蠟。萬物之至味。莫甘於蜜。莫淡於蠟。得非厚
此薄彼耶。仲景治痢有調氣飲。千金治痢有膠蠟湯。蓋有見
於本經之義也。淡爲五味之本。胃爲五藏之源。故能補中續
傷。蓋有得於太極也。甄權治孕婦胎動下血不絕欲死。以雞
子大一枚。煎三五沸。投美酒半升服立瘥。又能解毒。故蠟礬
丸用之爲君。華陀治下痢食入卽吐。用白蠟方寸匙。雞子黃
一枚。石蜜苦酒髮灰黃連末各半。雞子殼先煎蜜蠟苦酒雞
子四味令勻。乃納連末髮灰熬至可丸乃止。二日服盡神効。
露蜂房 苦鹹平有毒。

本經主驚癇瘈瘲。寒熱邪氣。癰疾鬼精。蠱毒腸痔。火熬之良。

發明 露蜂房陽明藥也。本經治驚癇癰疾。寒熱邪氣。蠱毒腸痔。以其能祛滌痰垢也。瘡瘍齒痛。及他病用之者。皆取其以毒攻毒殺蟲之功耳。

蟻蚋

一名果羸。細腰蜂也。

辛平小毒。

本經治久聾欬逆毒氣。出刺出汗。

發明 詩言螟蛉有子。果羸負之。言細腰之蜂。取青蟲之子。

教祝變化成子也。大明治嘔逆。生研能罾竹木刺。卽本經出刺出汗。取其毒之銳。以出其刺也。

蟲白蠟

甘溫無毒。

發明 蠟樹屬金。性專收斂。堅強之氣。其葉能治瘡腫。蟲食

其葉而成。與桑螵蛸無異。爲外科之要藥。取合歡皮同入長肉膏中。神効。今人治下疳服之。未成卽消。已成卽斂。以半兩

入鯽魚腹中煮食。治腸紅神効。

紫釗

卽紫草茸

甘鹹平小毒。

發明

紫釗乃騏驎竭樹上蟻壤聚其脂液而成。與蜂釀蜜

無異。出真蠟爲上。波斯次之。古方治五藏邪氣。金瘡崩漏。破

積血。生肌止痛。今人專治痘瘡。有活血起脹之功。無鹹寒作

瀉之患。其功倍於紫草。故以紫草茸呼之。實非紫艸同類也。

五倍子

卽川文蛤

苦酸鹹平無毒。產川蜀如菱角者佳。法釀過

名百藥煎。每五倍末一觔。入桔梗甘草真茶各一兩爲末。入

粳糟二兩。拌和置糠中窖。待起如發麴狀。卽成矣。作餅晒乾

用。

發明。川文蛤善收頑痰。解熱毒。黃昏欬嗽。乃火氣浮於肺

中。不宜用涼藥。宜五倍五味斂而降之。若風寒外觸暴嗽。及

肺火實盛者禁用。以其專收而不能散也。故痰飲內盛者誤用。則聚斂於中。往往令人脹閉而死。爲末收脫肛。及子腸墜下。○百藥煎性浮。味帶餘甘。治上焦痰嗽熱渴諸病。含嚥尤宜。煨過主下血。烏鬚髮。消腫毒。斂金瘡。治喉痺口瘡。搽之便可進食也。

桑螵蛸

甘鹹平無毒。桑枝上螳螂子也。火炙黃用。

本經王傷中疝瘕。陰痿益精生子。女子月閉腰痛。通五淋。利小便水道。

發明

桑螵蛸肝腎命門藥也。功專收瀉。故男子虛損。腎衰

陽痿。夢中失精。遺溺白濁。方多用之。本經又言通五淋。利小便水道。蓋取以泄下焦虛滯也。桑螵蛸散。治小便頻數如稠米泔。心神恍惚。瘦悴食少。得之女勞者。方用桑螵蛸遠志龍

骨菖蒲。人參。茯苓。當歸。龜甲各一兩。卧時人參湯調下二錢。如無桑樹上者。以他樹上者。濃煎桑白皮汁佐之。若陰虛多火人誤用。反助虛陽。多致洩赤莖痛。強中失精。不可不知。生研爛塗之。出箭鏃。

雀甕

一名蛭蜥
俗名載毛

甘平小毒。

本經主寒熱結氣。蠱毒鬼症。小兒驚癇。發明雀甕蛭蜥殼也。其蟲夏生葉上。背上有刺螫人。故名載毛。秋深葉盡欲老。口吐白沫。凝聚漸硬。在中成蛹如蠶。至夏羽化而出。其形有似蜻蜓而翅黑稍濶。放子葉上而生。蛭蜥謂雀甕者。以雀好食其蛹也。入藥惟取石榴樹上者。連蛹炙焙用之。蘇頌曰。今醫家治小兒驚癇。用雀甕子連蟲同白。蠶蠶全歇各三枚。微炒搗末。煎麻黃湯調服一字。日三服大。

效。藏器治小兒撮口不得飲乳。但先務日傷見血。以雀糞打破。取汁塗之。

原蠶蛾

鹹溫小毒。取未交雄蛾。紙封焙乾。拌椒密藏。則不

蛀。

本經主心腹邪氣。起陰痿。益精氣。強志生子。好顏色。補中輕身。

發明 蠶之性稟淫火。力專助陽。其子在臘月中。非以重鹽鹽透。水漬曝乾。則繭不能繰絲。出子之後。非桑不食。本經主心腹邪氣。皆桑之餘力。猶蠶蠶之治風痰。蠶繭之療癰腫。蠶沙之去風淫耳。其起陰痿。益精氣。強志生子。卽別錄之益精氣。強陰道。交精不倦。亦能止精。若合符節。好顏色。令人而色好之互辭。補中輕身者。以其善補稟陽。陽主輕捷故也。詳參

經旨。洵爲原蠶。主治無疑。奈何集本草者。悞列。楞雞之下。敢力正之。

白蠶。蠶。鹹。辛。平。無毒。色白者良。入藥。惟取直者爲雄。去黑口及絲炒用。

本經主小兒驚癇夜啼。去三蟲。滅黑點。令人面色好。男子陰瘍病。^上

發明。蠶蠶之病風者也。功專祛風化痰。得乎桑之力也。

本經治驚癇。取其散風痰之力也。去三蟲。滅黑點。男子陰瘍。

取其滌除浸淫之淫。三蟲亦淫熱之蟲也。凡咽喉腫痛。及喉痺用此。下咽立愈。其治風痰結核頭風。皮膚風疹。丹毒疥癩。

疥蝕金瘡。疔腫風疾。皆取散結化痰之義。

蠶繭。甘溫無毒。

發明 蠶繭治癰腫無頭。燒灰酒服。次日卽破。煮湯治消渴。

繅絲湯及絲綿煮汁。功用相同。

蠶退

卽馬明退

甘平無毒。卽老蠶眠起所蛻皮。入藥微炒用。今

以出過蠶之紙爲馬明退。非也。

發明 蠶非桑葉不生。得東方水氣之全。故能治風病血病。

而蛻治目中翳障。較之蟬蛻更捷。惜乎一時難覓。

蠶沙

甘辛溫無毒。微炒用。

發明 蠶沙療風溼之專藥。有人病風痺。用此焙熟。絹包熨

之。治爛弦風眼。以麻油浸蠶沙二三宿。研細塗患處。過宿卽

愈。蠶沙置酒罈上泥好。色清味美。然惟晚者爲良。早蠶者不

堪入藥。以飼時火烘。故有毒也。

九香蟲 鹹溫無毒。

發明 九香蟲產貴州。治膈腕滯氣。脾腎虧損。壯元陽攝生方。烏龍丸用之。

雪蠶 即雪蛆 甘寒無毒。

發明 雪蛆生蛾眉山北。積雪歷年不消。其中生此。大如瓠。

味極甘美。故能解內熱渴疾。方物中之最益人者也。

蜻蛉 一名赤卒 微寒無毒。

發明 蜻蛉生水中。而能煖水藏。強陰蓄精。而赤者性猶壯。

熱助陽藥用之。

樗雞 即紅娘子 苦平有毒。不可近目。去翅足。同糯米炒。去米用。

發明 樗雞厥陰經藥也。能活血散血。治目翳。撥雲膏中與。

芫青斑蝥同用。亦是活血散結之義。能通血閉。行瘀血。主療。

癰辟邪氣。療獐犬傷。治偏頭風。用紅娘子青娘子各七枚。去。

翅足。炒爲末。同葱莖搗塗痛處。周時起泡去之。孫一奎治血
蟲。用抵當丸。以糯雞易水蛭。三服血下脹消。形神自復。與薛
新甫治水腫椒仁丸中芫青不殊。一走血而下瘀。一走氣而
破水。皆峻劑也。綱目以本經原蠶蛾主治。誤列於此。今正之。
芫青即青娘子。辛溫有毒。去翅足。同糯米炒。去米用。
發明 芫青居芫花上而色青。故能泄毒攻積。破血墮胎。功
同斑蝥。而毒尤猛。芫花有毒。故也。其治瘋犬傷。消目瞖。刮偏
頭風。塞耳聾。皆取其毒銳也。又治月閉水腫。椒仁丸方用之。
斑蝥 辛鹹溫有毒。去翅足。同糯米炒熟。或醋煮用之。

本經主寒熱鬼疰蠱毒。鼠瘻瘡。疽蝕死肌。破石癰。

發明 斑蝥人獲得時。尾後惡氣射出。臭不可聞。其性專走
下竅。利小便。故本經言破石癰。能攻實結。而不能治虛秘。不

過引藥行氣。以毒攻毒而已。但毒行小便必瀉痛。當以木通滑石導之。其性猛毒。力能墮胎。虛者禁用。瘋犬傷。先於患人頭上拔去血髮二三莖。以斑蝥七枚。去翅足。炙黃。同膽螬搗汁服之。瘡口於無風處。搗去惡血。小便洗淨。髮灰敷之。服後小便當有瘀毒泄出。三四日後當有肉狗形。三四十枚爲盡。如數少再服七枚。若早服雖無狗形。永不發也。其毒發於葛上亭長。辛溫有毒。去翅足。同糯米炒。去米用。發明。亭長大毒。善通淋。及婦人經脈不通。以五枚研末服三分。空心甘草湯下。須臾臍腹急痛。以黑豆煎湯服之。卽通。此蟲五六月爲亭長。頭赤身黑。七月斑蝥。九月爲地膽。隨時變化。其毒可知。

地膽 辛溫有毒。同糯米炒。去米用。

本經主鬼疰寒熱鼠癭惡瘡死肌破癥瘕墮胎。

發明地膽有毒而能攻毒性專破結墮胎又能除鼻中瘳肉下石淋功同斑蝥力能上涌下泄。

蜘蛛微寒有毒其種類不一惟用懸網者入藥。

發明仲景治陰狐疝氣偏有太小時時上下者蜘蛛散主之。以其入肝性善循絲上下故取以治辜丸上下之病。別錄治大人小兒癰疽又治乾霍亂服之能令人利其邪得以下泄也。搗汁塗蛇傷効。

壁錢無毒。

發明生壁間似蜘蛛而形扁其膜色白如錢故名。治鼻衄及金瘡出血不止取蟲汁注鼻中及點瘡上同人中白等分燒研治瘡又治喉痺。

蠟。辛平有毒。被螫者以木梳合之。卽愈。去毒及足用。亦有獨用其尾者。其功尤捷。滾醋泡去鹹。炒乾用。

發明。蠟產於東方。色青屬木。治厥陰諸風掉眩。及小兒胎

驚發搐。最爲要藥。左半身不遂。口眼喎斜。語言蹇澀。手足抽

掣。瘧疾寒熱。耳聾無聞。疝氣帶下。無不用之。蠟尾膏治胎驚

發搐。用蠟梢二十一枚。麝香少許。屢効。東垣治月事不調。寒

熱帶下。有丁香柴胡湯。方用羌活柴胡。當歸生地。丁香全蠟。

益取以散血分之風熱耳。

水蛭。鹹苦平有毒。水蛭是小長色黃。挑之易斷者。勿誤用。

泥蛭。頭圓身潤者。服之令人眼中如生烟。漸至枯損。凡用水

蛭。曝乾。豬油熬黑。令研極細。倘灸不透。雖爲末。經年得水猶

活。入腹尚能復生。凡用須預先熬黑。以少許置水中。七日內

不活者。方可用之。

本經逐惡血瘀血月閉。破血瘕積聚無子。利水道。

發明 鹹走血。苦勝水。蛭之鹹苦以除畜血。乃肝經血分藥。故能通肝經聚血。攻一切惡血堅積。本經言無子。是言因血瘕積聚而無子也。別錄云墮胎。性劣可知。昔人飲水。誤食水蛭。腹痛面黃。飲泥漿水數碗乃得下。蓋蛭性喜泥。得土氣隨出。或用牛羊熱血。同豬脂飲亦下。或以梅漿水多飲。則蛭溶化而出也。

蛆 苦寒無毒。漂淨炙黃。搗細末。同糖霜食之。

發明 蛆出糞中。故能消積。治小兒諸疳積滯。取消積而不傷正氣也。一法用大蝦蟆十數隻。打死置罈內。取糞蛆不拘多少。河水漬養三五日。以食盡蝦蟆爲度。用麻布紮住罈口。