

醫綱提要卷之五

開陽一亭李宗源纂集論註 旌德王汝謙鏡堂氏評刊

虛實部

虛實總論

有汗用麻黃為虛虛
虛無汗用桂枝為實
裏寒用承氣為虛虛
裏熱用參桂為實實
醫殺之也

虛者正之虛神氣不足為陽虛精血不足為陰虛無有正氣有餘之實也實者邪之實在表者有汗為虛無汗為實所忌者實實不特桂枝下咽陽盛則斃也在裏者有寒為虛有熱為實所禁者虛虛不特承氣入胃陰盛而亡也是故虛者補之兼補其母實者瀉之兼瀉其子夫人而知之矣而補瀉之中有三大害焉不可不明之也何以知其然哉參芪者補虛之上藥也正虛者必寒而桂附者去寒之要藥也若邪實者必熱惟宜導邪出

最愛吳又可人參造
成虛怯之語正為熱
邪得補固閉關竅致
邪氣久留元氣日虧
故成虛憊也
麻黃湯乃太陽寒水
司令時必見惡寒無
汗脈浮緊表實之症
耳桂枝湯乃厥陰風
木司令時必有汗惡
風脈浮緩表虛之症

竅邇來妄以三陰傷寒不分虛實皆用參芪以蔽關竅非關門而逐賊乎以桂附為引火歸元非揚湯以止沸乎是傳經實熱之邪皆為真實而猶用溫補藥是謂實實其害一也至於麻黃湯者冬感寒邪表實無汗之要藥然有冬時當用僅二三法而禁用反十三條已詳表裏何況三時各有兼病而可妄用麻黃之理乎況漢時分兩與今不同今人用至三錢則大汗如雨至五錢則元氣大損未有用麻黃至三兩而不死也每見悞下猶有可救悞汗則速亡者心中原有津汁三合汗出于心固不等腸胃中穢濁之物也舒氏曰過汗雖是亡陽然亡津液亦兼亡陰故人有發汗一次而愈者二次則水體漸虛三次則隨大汗而俱殞此違禁妄用表藥是謂虛虛之悞其害二也至于小兒推挈

前言人參
造成虛怯
此言九補
不可一損

之法未知果否九天元女之術觀其進退補瀉頗有制度然小兒微陽微陰肌膚柔脆壯盛者一瀉一補可以無損否則一瀉二補且不免于有損久病弱者雖一瀉三補皆不勝其瀉焉恆見小兒初次病者推挈合法應手而愈二次用之體已漸虛病雖去而邪已易集三次用之不知啼哭應手而殁是徒知補瀉有定之法而不知**虛實**無定之活法也人熟不欲壽其子乃受胎以後不知異室而寢男女慾火動則胎元泄漏而一悞胎養不足則多變蒸以變蒸為外感而再悞又妄施推挈而三悞焉此徒知推挈補**虛瀉實**可以去病而不知三補無濟于一**虛**一瀉反同于**虛虛**其害三也故凡病有九補不可一損之**虛**候焉十全大補十四味建中湯是矣尤有速補不及之極**虛寒**焉惟

見內傷外感虛實寒熱之不同是在好學深思者之心知其意

結首必燥兼油當歸只壳以潤之大黃雖少無不通也

獨參湯為先務得效後增一二味生芪炙草再增桂附以助陽
再增歸地以助陰每劑藥其重二三兩蓋補藥之力薄不能挽
同極虛之症不能生也有急瀉不可一補之大實熱焉陷胸白
虎承氣固瀉實清熱之法而大黃之用當一二兩者雖八九錢
不濟也石膏之用當五六兩者雖二三兩而熱不退也是皆病
重藥輕補瀉之力不敵虛實之數不可以半途廢也總之參芪
補氣歸地補血虛桂附以去寒又兼阿膠鹿茸乃為大益然
精氣神乃為身中大藥喻氏所謂大病須大藥者天時春夏吾
心居然秋冬閉藏得法則龍雷之火不動而百體皆康此尤補
虛瀉實之要畧也

經論虛實

經曰實者氣入也虛者氣出也氣實者熱也氣虛者寒也

內經曰年四十而氣自半起居衰矣年五十體重耳目不聰明

矣年六十陰痿氣大衰九竅不利下虛上實涕淚出矣

岐伯曰脉盛皮熱腹脹前後不通大小便閉悶瞀此謂五實脉細皮

寒氣少前後泄利飲食不入此謂五虛

經曰虛則補其母實則瀉其子當先補之然後瀉之又曰子能

令母實內經曰邪之所湊其氣必虛註云留而不去其病則實

又邪氣勝則實精氣奪則虛大熱病氣勝脉滿是謂重實脉虛

氣虛尺虛是謂重虛又脉虛則血虛

黃帝曰脉從而病反者何如岐伯曰脉至而從按之不鼓諸陽

皆然帝曰諸陰之反何如岐伯曰脉至而從按之鼓甚而盛也

註

曰病熱而脉數按之不鼓動乃寒盛而格陽于外又可所謂脉厥是也形症乃寒按之而脉氣鼓擊于指下此陽盛而拒陰于外節菴所謂陰格陽也

難經曰陽絕補陰陰絕補陽是謂實實虛虛如此死者醫殺之也張潔古註曰用寒涼實外用溫煖實內也實實虛虛者乃

桂枝下咽陽盛則斃承氣入胃陰盛乃亡也

傷寒瘟疫虛實法

仲景太陽中篇發汗後腹脹滿者厚朴生薑甘草三兩半夏各半

斤人參一兩湯主之五味

此虛中實非眞實也

喻氏曰此由脾胃素虛津液搏結陰氣內動壅爲滿實故以益胃和脾降氣滌飲爲治也

發汗者表也表後虛故用溫暖表後實則邪入裏故用攻下法

太陽中篇發汗不解反惡寒者虛故也芍藥甘草附子湯主之

不惡寒反惡熱者實也當和胃氣與調胃承氣湯

芍藥甘草附子湯○芍藥三兩甘草三兩附子一枚

調胃承氣湯○大黃四兩甘草二兩芒硝半斤

舒馳遠曰前症陽虛故加附子以同陽後症陰虛表藥中當

加歸地以養陰否則陰津被奪腸胃枯燥而結熱故惡熱者

胃實也用調胃承氣以復陰而病自愈也

太陽中篇傷寒六七日結胸熱實脉沉緊心下痛按之石硬者

大陷胸湯主之見太陽裏

下之後復發汗必振寒脉微細所以然者以內外俱虛故也

舒氏曰內外俱虛參芪薑附當不可少

傷寒若汗若吐若下解後心下痞鞭噫氣不除者

旋覆代赭石湯主之

見太陽裏

臟結虛寒用參桂扶陽未必死燥結者屬桂熱乃忌參

中篇凡病脇下素有痞連在臍旁痛引少腹入陰筋者此名臟結死臟結無陽症不往來寒熱其人反靜舌上胎滑者不可攻也

西逆者甘草乾薑附子是也

舒注曰臟結之症本氣虛寒外感皆從寒而不化熱所以表裏俱無陽症當用四逆湯加半夏草菓人參茯苓肉桂之類陽明上篇陽明病不能食攻其熱必噦所以然者胃中虛冷故也以其人本虛故攻其熱必噦

程郊倩曰平素本有虛寒法以溫裏為本凡病微有熱邪俱宜標視之陽明固然他經亦可例矣

濕亦作癢
補氣兼瀉
濕可也
以下瘟疫
虛實法摘
錄

陽明病法多汗。今反無汗。其身如虫行。皮中狀者。此以久虛故也。○程郊倩曰。虛指胃言。胃實則為痛。虛則為癢。

吳又可曰。疫症不因發散而自然汗出者。有虛有實也。脉長洪而數。身熱大渴。汗不止。宜白虎湯。若認為表虛自汗。輒用實表之藥。則誤矣。若面青唇白。喜熱畏冷。脉微欲絕。忽得自汗。此為虛脫。急當峻補。補不及者死。大病愈後。每飲食及驚動。即汗。此表裏虛怯也。

人參養營湯 ○人參錢二 麥冬錢二 五味錢一 地黃錢二 當歸錢一 白芍錢一

五知母錢一 陳皮錢一 甘草錢一 黃芪錢三

又時疫愈後。脉靜身涼。數日後反得盜汗及自汗者。此屬表虛也。宜。

黃芪湯

○黃芪

蜜炙三錢

五味

錢二

當歸

錢一

白朮

錢一

甘草

五分

如汗未

止加麻黃根一錢五分無有不止者然屬邪氣實者多屬正

氣虛者少虛實之辨在乎有熱無熱有熱為實無熱為虛臨

症慎之庶免實實虛虛之誤耳

又可曰疫症四逆脉厥體厥者皆緣應下失下陽氣鬱內不能

四布于外胃實也宜大小承氣下之若下後反見此症為虛脫

宜補

孔氏曰病後調理法肥人脾虛有痰異功六君補之瘦人陰

虛有火六味四物調之陰陽兩虛兼補之

倘非虛脫宜小劑緩進

雜症虛實法

蔣示吉曰○相火命門君火心二火一水不相均

惟腎屬水經所謂一水不

若非陰寒
直中參附
不可妄投
也

但知柏亦
宜酌用

同陽救急
參芪桂附

勝二五臟氣升皆是火氣有餘妄動須知燠至陰經所謂一水不勝五火也

心火亢極陽強病口吐氣盛病勢進癲狂便閉用硝黃硝只實

厚朴大承氣也三黃山梔烏梅治大熱譫語飲食勞

倦身發熱補中益氣功偏勝參芪歸朮陳皮甘草相火熾盛致

乘陰朝涼暮熱血虛成陰中之火從寒降知柏四物法通靈當

生地白芍川芎黃柏知母腎水受傷陰虛病面紅耳熱虛火盛左尺洪數無

根火柏龜六味治如神熟地淮山棗皮茯苓丹皮澤瀉黃柏胃

虛過食傷生冷抑遏陽氣脾中央火鬱之症升散之升陽散火

最為良此方治五心煩熱胃府時疼四肢乏力肌熱筋痺或骨

生甘草各五分防風五分煎服忌涼命門火衰陽脫病面赤煩

躁虛火盛足冷脉沉陰極燥回陽救急醫中聖陰虛發熱火旺

皆圖目是五五卷五辨症虛實

之類是也

甚脉數無力屬心腎內傷發熱乃陽虛脉大無力脾肺分氣從

左起肝之火陰火還從臍下生脚下熱來侵腹者斯人虛極藥

難平熱從脚起先用附子末津調貼脚心中湧泉穴引火下行然後服四物降火之劑

保元曰肝虛者陳皮生薑補之虛則補其母以熟地黃柏補之

如無他症六味地黃湯主之腎者肝之母也實則白芍瀉之如

無他症瀉青丸主之胆草山梔大黃川芎當歸羌活防風蜜九竹葉湯下實則瀉其子以

甘草瀉心湯主之甘草黃連乾薑大棗心者肝之子也

心虛者炒鹽補之虛則補其母肝者心之母生薑補之如無他

症以安神丸補之黃連硃砂生地當歸甘草為丸棗豆大實則甘草瀉之如無他

症重則瀉心湯大黃黃芩黃連附子輕則導赤散生地木通甘草梢淡竹葉等分煎

脾虛者甘草大棗之類補之虛則補其母心乃脾之母以炒鹽

脾虛人不
可妄用黃
柏用宜酒
炒焦赤亦
勿多用

補之。實則瀉其子。肺乃脾之子。以桑白皮主之。又云實則黃連

只實瀉之。如無他症。益黃散主之。防風藿香山梔石膏甘草爲末密酒調服

肺虛者。五味子補之。實則桑白皮瀉之。如無他症。阿膠散主之。

阿膠馬兜鈴甘草杏仁糯米牛蒡子虛則補其母。脾乃肺之母。以甘草大棗補脾

實則瀉其子。腎乃肺之子。以澤瀉瀉腎。

腎虛者。熟地黃柏補之。腎無實不可瀉。錢仲陽止有補腎地黃

丸。見前內無瀉腎藥。虛則補其母。肺乃腎之母。以補肺湯主之。

人參黃芪五味紫苑桑白皮熟地密二匙

內經曰。損其肺者益其氣。損其心者調其營。損其脾者調其

飲食。適其寒溫。損其肝者緩其中。損其腎者益其精。又形不足

者溫之以氣。丹溪曰。溫字作養字。謂調以飲食藥餌。東垣謂用

溫藥補元亦賢者之一失。

諸潮熱譫語皆屬于

實

已詳表裏門中凡邪未去則為實也傷寒溫疫法同

諸厥暴卒皆屬于

虛

凡正氣先虧則為虛也

脉解篇曰內奪

奪精氣也

而厥則為瘡

聲不出

痺

肢體偏枯

皆腎虛也少陰

不至者厥也

調經論曰志不足則厥

腎藏精與志也

本神篇曰腎氣虛則厥

虛

岐伯曰氣之所并為血

虛

血之所并為氣

虛

蓋有者為實無者為虛

脉要精微論曰厥則陽并于上目無所見火燭光也陰并于下

則足寒足寒則脹也

內經曰肝者罷極之本陽氣者煩勞則張罷極則傷肝煩勞則

精絕辟積于夏使人煎厥

註煩勞太過則氣張于外精絕于內邪辟之氣積久不散至夏則火旺而

一人久病忽昏仆目上視汗瀉不止脉無倫丹溪合服獨參湯兼炙丹田三飲而甦蓋命門胞系在臍故氣海丹田為生氣之源十二經之根本也

眞陰如煎火炎而氣大怒則形氣絕而血菀干上使人薄厥氣血
虛逆上故曰煎厥也

之謂也

而厥者身熱肢滿忽如死人身不動搖目閉口噤或微知人眩

氣盛身寒

得之傷寒

氣虛身熱

得之傷身

白薇湯○白薇
當歸各一兩
人參五錢
甘草錢半
每服五錢水

煎溫服

氣厥者身冷無痰。多由鬱怒不伸。冤抑難白。故局方用。

烏藥順氣散 ○ 烏藥
橘紅 各二錢
麻黃 去節
川芎
白芷
桔梗

枳殼各一錢炒 薑去絲 炮薑
甘草五分炙 薑葱引

芪防風數斤煮湯置床下熱氣上薰是夕

痰厥者痰涎壅盛氣閉昏愢藥食不下先用吐之

得甦

瓜蒂散○甜瓜蒂

炒黃

赤小豆為末熟水調下吐時須令閉目

緊束肚皮吐不止者葱白湯解之

諸亡血虛家老人產婦血虛脉微者俱不可服

又方用半夏末吹鼻得嚏即甦或灸人中穴足大拇指離指甲

一韭菜許各三五壯即活無痰身冷名氣厥亦可用此

酒厥者酒醉不語或嘔吐泄瀉痞塞頭痛小便利宜

葛花解酲湯○葛花

豆蔻

砂仁

各一錢

木香

分三錢

皮青

分八錢人參

白朮

茯苓

二錢神曲

一錢干薑

猪苓

澤瀉

各一錢

暑厥者手足逆冷總由貪涼飲冷抑遏陽氣所致用道中熱土

搗水澄服外用熱上圍臍上令人尿其中即活

或曰葛花解酒發散不如枳椇經霜黃赤而味甘其藥入酒酒化為水尤妙

呂祖曰寡言語以養氣寡思慮以養神寡嗜慾以養精精生氣生神神自靈也精絕則氣散氣散則神飛