

花柳易知

卷三

潰瘍。因而知覺極銳敏者。可於小便後打入沃度仿謨凡士林。即留入膀胱內。約一兩次後。便覺大好。他如內服藥品。亦殊見效。就中如拔爾撒謨劑。撒曹。撒魯兒。烏羅篤羅。並等尤佳。

處方

沃度仿謨 五錢二分 凡士林 五兩二錢

右隔日。或每三日打一次。每次以一兩三錢爲度。每用均須臨時調製。收貯暗處。
白檀油 十滴

右裝入一個膠囊中。共裝三十個。一日三次。每服兩個。
骨泚波拔爾撒謨

右一日兩三次。每服五滴。至十五滴。各裝入膠囊吞服。

撒曹 二錢六分

右輕輕研細。勻分十包。一日三次。每服一包。

撒魯兒 一錢五分六釐

右勻分六包。一日三次。每服一包。

烏羅篤羅並 七分八釐 蒸汽水 五兩二錢

右調和。一日三次。分兩日服。

(丙)直腸白濁 此病以女子爲多。男子較少。因女子陰部患生白濁。易沿海底而流於後。遂被傳染於直腸內也。男子惟雞姦者有之。其證候爲直腸內腫脹。時洩極多惡臭之脂水。且常帶血。每逢大便。痛不可當。兼覺裏急後重。肛門往往脫皮。或起皸裂。甚者肛門周圍亦發紅腫。終則或自愈。或成慢性。直腸既成潰瘍。終必變爲狹窄。治當安靜身體。常用熱水熏洗下身。肛門內納入依比知阿兒坐藥。或用雅片專進液狀食物。俟數日後。大便之通利既止。乃飲以蓖麻子油。或瀉葉浸劑。令排柔軟之便。倘有糜爛。或起皸裂。則可滴以古加乙涅水。將患處麻醉。然後以硝酸銀蝕死之。

(丁)膿漏眼 患白濁之人。其手指或手帕等沾有白濁。未經洗滌。卽以拭眼。必生此病。

右調和。裝入黑玻璃瓶中。作點眼用。點後須卽以鹽水中和之。此方極濃。

水銀軟膏 二錢六分 黃芩膏 五分二釐

右調和。取豌豆大一塊。徐徐塗搽額角及太陽穴。一日數次。功能止痛。

鎂磺養 七錢八分 苦味丁幾 五分二釐 蒸汽水 五兩二錢

右調和。一日六次。分兩日服完。功能輕瀉。

二、初生兒膿漏眼 專發於產後二三日。至八日內之初生兒。眼皮內面及眼白。先後腫起。時洩或白或黃之膿液。能速卽醫治。大都無害。此病第一須留意者。在豫防病兒之好眼。與他人之眼。毋被傳染。其患病之眼。尋常多用過滿俺酸加里水。頻頻洗淨。嚴避室中之溫暖。與塵埃烟煤。病房亦須帶暗。夜間點燈。光亦不可過大。眼內常點硝酸銀水。額角及太陽穴。可貼黃芩軟膏。其有效無害之唯一豫防之法。莫如於嬰兒生後。當入浴之際。卽以潔淨之軟布片。蘸清水。或極淡之防腐藥水。細細拭去眼皮間之污物。繼以指輕啟其目。用細玻璃棒。蘸五十倍之硝酸銀水一滴。點角膜上。代以醋酸銀。

益佳。

處方

結晶硝酸銀

一分三釐至二分六釐

水

一兩三釐

右調和裝黑玻璃瓶中。每日點入上眼皮內。而約一兩次。候內皮略帶白色爲度。隨即以新毛筆蘸取鹽水。將該硝酸銀水洗去。至膿水減少。乃換用後列之淡者。

結晶硝酸銀

二釐六毫至七釐八毫

水

一兩三錢

右調和點眼同上。

戊白濁風濕痛

此病每在白濁未愈之間。一併發生。骨節痠痛。骨膜腫脹。坐骨神經

痛。腿鞘發炎。筋肉作痛。下肢麻痺。兼患眼病。但與尋常風濕痛。初無特異之處。若就部位而論。則以膝關節爲最多。他如手腕。足。指趾。肩胛諸關節均次之。大約第二個禮拜以後。尿道白濁延及後部。此病卽忽然而來。往往祇一關節腫脹。間有波及兩關節者。熱候。或有或無疼痛。或缺如。或輕微。或劇甚。但皮膚概不紅。亦不熱耳。腫脹益甚。輒成

右調和。裝入黑玻璃瓶中。作點眼用。點後須卽以鹽水中和之。此方極濃。

水銀軟膏 二錢六分 黃荳膏 五分二釐

右調和。取豌豆大一塊。徐徐塗搽額角及太陽穴。一日數次。功能止痛。

鎂磺養 七錢八分 苦味丁幾 五分二釐 蒸汽水 五兩二錢

右調和。一日六次。分兩日服完。功能輕瀉。

二、初生兒膿漏眼 專發於產後二三日。至八日內之初生兒。眼皮內面及眼白。先後腫起。時洩或白或黃之膿液。能速卽醫治。大都無害。此病第一須留意者。在豫防病兒之好眼。與他人之眼。毋被傳染。其患病之眼。尋常多用過滿俺酸加里水。頻頻洗淨。嚴避室中之溫暖。與塵埃烟煤。病房亦須帶暗。夜間點燈。光亦不可過大。眼內常點硝酸銀水。額角及太陽穴。可貼黃荳軟膏。其有效無害之唯一豫防之法。莫如於嬰兒生後。當入浴之際。卽以潔淨之軟布片。蘸清水。或極淡之防腐藥水。細細拭去眼皮間之污物。繼以指輕啟其目。用細玻璃棒。蘸五十倍之硝酸銀水一滴。點角膜上。代以醋酸銀。

益佳。

處方

結晶硝酸銀 一分三釐至二分六釐 水 一兩三釐

右調和裝黑玻璃瓶中。每日點入上眼皮內面。約一兩次。候內皮略帶白色爲度。隨即以新毛筆蘸取鹽水。將該硝酸銀水洗去。至膿水減少。乃換用後列之淡者。

結晶硝酸銀 二釐六毫至七釐八毫 水 一兩三錢

右調和點眼同上。

(戊)白濁風濕痛 此病每在白濁未愈之間。一併發生。骨節痠痛。骨膜腫脹。坐骨神經痛。腿鞘發炎。筋肉作痛。下肢麻痺。兼患眼病。但與尋常風濕痛。初無特異之處。若就部位而論。則以膝關節爲最多。他如手腕。足。指趾。肩胛諸關節均次之。大約第三個禮拜以後。尿道白濁延及後部。此病卽忽然而來。往往祇一關節腫脹。間有波及兩關節者。熱候。或有或無。疼痛。或缺如。或輕微。或劇甚。但皮膚概不紅。亦不熱耳。腫脹益甚。輒成

顯著之關節水腫症。經過頗緩。每有六禮拜至八禮拜之久。然關節鮮有因之強直者。治法。首須靜養患部。初發之急性症。須貼冰囊。候稍輕減。乃塗搽沃度酒。並施壓迫繃帶。久患之慢性症。則宜行按摩法。用熱水洗滌患部。益佳。內服藥中。以沃度加里爲佳。若在初期。則宜用撒魯兒。（一日服二分六釐）撒曹亦可。如不見效。乃改用安知必林。（一日服一分三釐至二分六釐）惟併發心臟病者。不可用安知必林。切記切記。所患關節部。可塗搽沃度甘油。外加繃帶。已至後期。宜常用熱水洗滌。

（己）尖圭濕疣 此病主爲白濁之膿水。浸潤內皮。或皮膚。因久受刺激。遂從而生數多之贅肉也。試檢視之。該處表面。每有極多之小隆起。叢生如楊梅。又似雞冠花菜。尋常雖不甚大。亦間有大如拳者。隆起愈密。則愈濕潤。終且洩似膿之水矣。自覺之證候。細小者多無有。大則殊覺不適。且發劇痛。其部位。男子以龜頭冠狀溝。包皮內面爲多。肛門次之。女子以小陰唇。海底部。大腿內面等處爲多。陰戶內次之。若在妊孕之中。增大殊迅速也。醫治之法。在隆起細小。且非叢生者。僅搽藥粉。搽藥油。藥酒已足。腐蝕藥雖

亦可用。然周圍健好之部。慎勿沾附該藥。以免蝕爛。其較大者。惟有用過格魯兒鐵。或硝酸銀以蝕死之。較爲穩妥也。

處方

薩毘那末 凡士林 各二錢六分 松節油 一錢三分

右煉和塗搽患部。

薩毘那末 枯礬 各二錢六分 硫酸銅 二分六釐

右同研細。搽患上。

亞砒酸 五釐二毫 水銀軟膏 一錢三分

右調和。外用。塗患上。

沃度酒 二錢六分 五倍子酒 一錢三分 沃度 二釐六毫

右調和。每日早晚。塗搽患上。

昇汞一分三釐 酒精 一兩三錢

右化開和勻塗搽患上以上各藥均係腐蝕藥劑用時務勿沾及周圍之健好部
至要至要



花柳易知第一編西法終



花柳易知

第二編 中法

第一章 梅毒總論 節錄於梅毒全書

楊梅瘡一證。以其腫突紅爛。狀如楊梅。故爾名之。其在西北人則名爲天泡瘡。東南人又謂之廣東瘡。凡毒輕而小者。狀類茱萸。故名茱萸瘡。毒甚而大者。泛爛可畏。形如綿花。故名綿花瘡。大都此證必由淫毒傳染而生。蓋此淫穢之毒。由精泄之後。氣從經道乘虛直透命門。以灌衝脈。所以外而皮毛。內而骨髓。凡衝脈所到之處。則無處不到。此其爲害最深最惡。設初起時。去毒不淨。或治失其宜。而隨之敗爛隕命者。蓋不少矣。或至二三十年之後。猶然發爲瘋毒。或致爛頭。或致爛鼻。或四肢幽隱之處。臭爛不可收拾。或遺毒兒女。致患終身。其惡如此。靜而思之。則有見此惡道而不爲寒心知避者。其愚亦甚矣。故凡治之法。當知切要。不可不慎也。亦有不因淫毒傳染。偶中濕熱而患者。

此不過在皮毛肌肉之間。清去濕熱。自當全愈。無足慮也。

今人每遭此毒。或畏人知。或畏毒甚。而大用攻擊峻利等藥。多致邪毒未除。而元氣先敗。或成癆瘵。或卽殞命。或愈久愈甚。以致敗壞不能收斂。皆元氣先敗之故也。故凡被此病者。切不可驚慌。亦不可專肆攻擊。但按法漸解其毒。務使元氣毫無損傷。則正能勝邪。雖毒無害。若不勝邪。則微毒亦能殺人。此其要也。

廣瘡治法。凡其初起。而元陽未傷。毒亦未甚。宜速用清利。使從小便利去其毒。惟換肌消毒散爲第一。其次則五加皮飲亦妙。或兼火邪者。宜秘仙方餘糧湯。或稟氣多弱者。宜茯苓膏。凡此諸藥。或十日。或半月。甚者一月。無不見效。凡生瘡毒者。宜服槐花蕊二。三升。則毒從小便泄去。可免終身之患。此瘡初起時。多有先下疳。次便毒。而後瘡出。是爲一套。若便毒勢甚。腫痛熱秘。而元氣素強者。卽宜用會膿散。或牡蠣散。先去其毒火之勢。而後用前方諸藥。亦要着也。此瘡久而不愈。或元氣素弱。或因剋伐致虛。但見有正不勝邪之勢。則當酌其輕重。或以純補元氣爲主。凡脾陰腎陽氣血。皆宜隨

證用方。但使氣血得復。則雖毒無害。最忌見不真而執兩端。則終歸無益。亦是要着。飲食宜否。有謂宜忌口者。有謂不忌口者。而任其發透。總之亦有其要。蓋瘡毒初起。毒本未甚。此時只宜清利。使毒漸消爲善。若食發物。則愈發愈多。而毒愈甚矣。此則宜忌之時也。若瘡毒已久。元氣已弱。濃汁既多。血氣既耗。斯時也。非以藥食滋補。則日見消敗。何以收效。此則不宜忌者也。宜忌不宜忌。亦宜補不宜補之法耳。使不知辨。安能無誤。瘡生頭面。或遍身不便處。欲其速愈。但用點藥。則二三日可以脫落。亦神妙者也。但此惟治標之法耳。

瘡毒久蓄。發爲風毒。亦名楊梅癰漏。或腐骨潰爛不收。最爲惡證。近來治法。惟五寶丹爲最效。及徐東臯楊梅癰漏方。或秘傳水銀膏。宜擇用之。

又有所謂結毒者。熏火收遏瘡毒而沉於骨髓也。又有未經熏擦。見苗未久。服藥不多。內毒未盡。便用點藥收斂。鬱遏毒氣者。亦能致之。發則先從筋骨疼痛。日後漸漸腫起。發無空處。隨便可生。發在關節中。則損筋傷骨。縱愈曲直不便。發於口鼻。則崩梁缺唇。

雖瘡破形。更有發於咽喉者。更變聲音。發於手足者。妨於行走。苦楚一生。毒遺數代。情關一錯。禍起百端。初起筋骨疼痛。服金蟾脫甲酒。發汗自愈。虛弱者芎歸二朮湯。頭疼欲破者。天麻餅子。吹鼻碧雲散。年餘流串筋骨疼不愈者。五寶散。虛弱者。潰爛疼痛不飲者。十全大補湯。同土茯苓煎服。初起筋骨痛甚者。雷火針法。已潰腐爛者。解毒紫金膏。依法施治。年遠毒盛者。元武丹。兼外擦靈藥。年代淺近者。只在百日。自然可愈。毋得再薰爲禍害人也。治法俱照楊梅瘡證。

第二章 梅瘡治法

汗藥 治楊梅瘡

升麻 白芷 甘草 蒼朮 當歸 穿山甲 赤芍 羌活 獨活 防風 荆芥
柴胡 麻黃 連翹 木通 薄荷 桔梗 金銀花 水酒各一鍾。煎八分。乘熱服之。以衣覆身出汗爲妙。

煎藥 治前證

人參 白朮 防風 羌活 金銀花各一錢 木瓜二錢 白蘚皮一錢半 皂莢
子 薏苡仁 當歸 川芎 白芍 熟地各八分 升麻 甘草各三分 用冷飯
團四兩水六碗煎至四碗濾去滓每藥一劑用汁二碗煎八分在上食後在下食前偏
身不拘時服忌茄子糟物牛肉茶葉服四十劑方無後患巔頂加藥本

熏法 治楊梅瘡毒流注四肢或偏身結成大瘡久不能愈者此法熏之極妙能收輕
粉毒

好斬艾葉一斤按熟 雄黃 黃丹各一兩 松香四兩 蒼朮半斤米泔製過 右
四味爲末入艾拌勻用黃紙做成藥筒五寸長以火燒著一頭待烟薰瘡口將筒燒過
一半去筒用水銀膏貼之次日又洗又薰之半月有效如重二十日有效

洗藥方

石菖蒲 荊芥 防風 羌活 獨活 金銀藤 地骨皮 何首烏 甘草 日日
煎湯洗之

熏洗方 夏天一日一洗。冬天兩日一洗。

防風 芍藥 山梔 苦參 薄荷 全銀藤 蒼朮 黃蘗 地榆 黃芩 連翹

斬艾 地骨皮 花粉 稀薺草各三錢 鉛一片 紫蘇一把 水二斗煎數沸去

渣傾在浴盆內。將板一片放在盆上坐之。上下周圍以席遮護。無風處拭乾。後搽點藥。

點藥

珍珠一錢 麝香二分 杏仁去皮 輕粉各五錢 右四味各另研和勻。用雄豬膽

汁調勻。搽入肌肉。不見藥爲效。如有水出。再搥再搽。

行藥 服藥久不愈

白蠟三錢 全蝎七枚 焙 當歸 白芷 穿山甲泡各二錢 大黃 焙四錢 右爲

細末。五更空心密湯調下。作丸酒下亦可。行數次。薄粥補之。或次日。或隔一日如前服。

則濕熱蟲毒自消。

點藥 治棉花瘡