

傷寒溫疫條辨卷
卷

渭珍氏



南京中医药大学图书馆版权所有

傷寒瘟疫條辨目錄卷三

頭目眩辯

咳嗽辯

口燥咽乾辯

咽痛辯

渴辯

嗽水不欲嚥辯

嘔吐辯

喘辯

短氣辯

呃逆辯

嘔厥辯

厥逆辯

大便自利辯

大便膿血辯

小便不利不通辯

小便自利辯

小便數辯

心悸辯

痙辯

內瞤筋惕陽辯

舌捲囊縮辯

循衣抹床辯

煩燥辯

懊懃辯

憊鬱辯

鬱冒辯

動氣辯

藏結辯

狐惑病辯

百合病辯

主客交病辯

婦女傷寒溫病辯

熱入血室辯

妊娠病辯



產後病辯

傷寒溫病復病辯

凡三十七條

小兒溫病辯



南京中医药大学图书馆版权所有

傷寒瘟疫條辨卷三

頭目眩

眩者頭旋眼黑也。傷寒頭眩多因汎吐下虛其上焦元氣之所致也。傷寒邪在半表半裏，表中陽虛故時時頭目眩。葛根湯風家多頭目眩亦當解肌。葛根湯傷寒論曰少陽口苦咽乾目眩小柴胡湯加天麻川芎傷寒論曰陽明病但頭眩不惡寒故能食而咳其人必咽痛能食爲陽明中風四逆散加天麻桔梗傷寒論曰太陽傷寒誤吐誤下後心下逆滿氣土衝胸

裏虛氣

起則頭眩

表虛陽

邪在裏

發汗則

動

不足也

脉沉緊

不可汗

經身爲振

振搖者

汗則外動

經絡傷損陽

氣則不能

主持諸脉也

桂苓甘

湯

湯以溫經益陽或真武湯

以實衛止汗按真經云上

虛則眩下虛則厥頭目眩皆屬虛宜溫經補陽之劑

吳氏治傷寒汗出過多頭眩身搖發熱脉虛數人參

養榮湯倍人參加天麻少佐酒炒黃柏二服而愈易

老云頭旋眼黑非天麻不能定少佐黃柏以滋腎水

也若血虛頭眩四物湯加人參天麻氣虛頭眩四君

子湯加天麻川芎伏痰頭眩二陳湯加南星白朮天

子湯加天麻川芎

中醫藥大學圖書館版權

麻川芎內兼灸火上攻再加酒炒黃芩竹瀝薑汁若元氣虛脫者人參養榮湯大建中湯俱加天麻川芎內傷勞役者補中益氣湯加天麻川芎惟溫病頭目眩及頭脹頭痛頭汗並目赤目黃目不明目直視目反折與傷寒治法不同俱係雜氣伏鬱中焦邪熱紅丹門上攻頭目乃胃家實也通宜升降散加味涼膈散清利之等證量加大黃自眩赤

咳嗽

咳謂有聲無痰嗽謂有痰無聲咳嗽則有聲有痰也

肺主氣形寒飯冷則傷之使氣逆而不散衝擊咽喉
令喉中溼溼如癢習習如梗而咳嗽也有寒者有熱
者有停飲者有在表者有在裏者有在半表半裏者
病各不同治亦有異如傷寒停飲與表寒相合而咳
嗽者小青龍湯或金沸草散停飲與裏寒相合而咳
嗽者真武湯邪熱在半表半裏而咳嗽者小柴胡湯
加貝母知母天花粉肺熱去人參加沙參凡陰證手
足厥逆而咳嗽者四逆湯加五味子若溫病伏熱內
鬱咳嗽白虎湯合升降散小清涼散加竹葉若煩悶

則加味涼膈散增損三黃石膏湯並加桔梗夫咳爲肺疾必待發散而後已然又有不可發散者傷寒論曰咳而小便利不可發汗發汗則四肢厥逆又曰咳而發汗踰而苦滿腹中復堅此爲逆也不知發汗亦爲溫病所大忌者豈止小便利一節乎又咳而脉數者爲心火刑肺金則死

口燥咽乾

引飲口渴不引飲日燥乾凡傷寒少陽邪在中焦口苦舌乾不甚渴脉弦者小柴胡湯少陽脉弦往來寒

熱而嘔、口燥咽乾者、小柴胡湯。日乾少津液、脉浮勞。
微數者、白虎加人參湯。陽明無大熱、背惡寒、口燥咽
乾者、白虎加人參湯。少陰病得之二三日、口燥咽乾。
急下之以存津液、大承氣湯。此熱在下焦、燥枯腎水。
下不可緩也。若溫病怫熱內鬱、未有不口燥咽乾者。
小清涼散增損三黃石膏湯再看兼證消息之。凡傷
寒汗吐下後、津液少、口燥咽乾及虛人水衰火旺、口
燥咽乾以補陰益氣煎。加麥冬、黃柏知母、天花粉以
滋其水。若脈沉足冷者、多難治。溫病下後須酌之不

可驟補脈沉足冷宜大下之不可以傷寒例拘也

咽痛

凡傷寒咽痛有多般務宜詳辯不可一例以爲熱也
太陽病誤下脉若浮緊必咽痛此熱邪仍在上膈也
小建中湯加桔梗誤汗亡陽漏風而咽痛此陽虛而
陰氣上乘也乾薑附子湯陽明病六七日不大便熱
蒸頭痛而咽痛者調胃承氣湯熱傳少陰而咽痛者
以其經上循喉嚨故也脈必數而有力證必燥渴引
飲小便秘濇短赤急當下奪以泄其熱也大承氣湯

少陰咽痛四逆瀉利下重者、四逆散加薤白桔梗、
陰病一二日咽痛者與甘草桔梗湯卽瘥此湯爲陰
陽通用之劑少陰病下利清穀裏寒外熱脈微欲絕
面赤咽痛此陰盛格陽也通脈四逆湯加桔梗有宣
中陰經而咽喉驟痛不腫不渴始病無發熱頭痛脉
來沉緊而細或疾數無倫或嘔吐清水或瀉利清穀
或燥極悶亂渴不能飲此寒氣客於少陰之經虛陽
上逆之候附子湯乾薑附子湯加入參急溫之或可
救療大抵陽邪上逆而咽痛宜甘寒以解其熱陰寒

邪塞而咽痛宜辛溫以解其結此大較也若夫腎氣
本虛龍火勢盛必挾痰飲於上而腫痛閉塞也當破
出血湧泄痰涎後用六味地黃丸料加牛膝麥冬
五味子頻服又有真陰虧損腎水枯涸陰寒互逆而
咽痛者附子理陰煎大劑濃煎飲之若溫病怫鬱
焦流佈上下卽見少陰經口燥舌乾咽喉腫痛不利
之證以其脈貫腎絡於肺繫舌本故也增損雙解散
加元參牛蒡子或增損普濟消毒飲倍桔梗加荆芥
穗升降散尤爲對證之藥

渴

凡傷寒發渴或因熱耗津液或因汗下太過當分六經而治太陽熱在表不渴若熱入膀胱之本脈浮數小便不利微熱發渴者五苓散切不可與白虎湯陽明病脈長標熱不惡寒無汗而渴者葛根湯加黃芩知母減麻黃二錢若陽明熱傳胃中本熱惡熱濶濶汗出而渴脈洪大而數者白虎湯切不可與五苓散若陽明本熱內實或蒸蒸而熱潮熱煩渴口燥咽乾大便實者調胃承氣湯或大柴胡湯少陽脉弦數口

苦咽乾發熱而渴及心煩喜嘔而渴或往來寒熱而渴並宜小柴胡湯去半夏加陳皮知母麥冬天花粉太陰自利則不渴惟少陰則口渴飲水也小便色白者此下虛有寒也脉沉附子湯厥陰渴欲飲水者少少與之愈以其傳經盡欲飲水爲欲愈之候也若鼻寒厥逆脉滑而口渴者此裏有熱也白虎加人參湯凡陰證煩燥口渴不能飲水此虛陽上迫而爲假熱脉沉足冷者四逆湯加人尿猪膽汁冷飲之若溫病一發卽煩渴引飲以鬱熱自內而達外也故直格曰

身熱爲熱在表引飲爲熱在裏溫病本未身冷不渴

小便不赤脈不洪數者未之有也輕則白虎湯加白

殭蠶蟬蛻天花粉重則增損三黃石膏湯加大黃凡

傷寒溫病大渴
欲飲涼水而世
醫禁用不解何
故

病忽欲飲水者爲欲愈蓋腸胃燥不能散邪得水則和其胃氣汗出而解若不與水則乾燥無由作汗遂至悶亂也但當察邪熱之輕重寧少與之若熱少與多不能滲化則停蓄爲支結喘嘔下利腫滿等證要訣曰亦有下利清穀純是陰證而反見渴者此陰在

下格陽於上兼因洩泄津液既去枯燥而渴雖引飲

景岳此論發前人所未發每見

鄉曲人言溫病

飲涼水而汗出

熱退此即助陰

解熱之義也此

即裏熱清而表

自解之義也

自少而常喜溫不可投寒劑宜理由湯加附子四逆
湯加入參以溫之○景岳曰水爲天一之精涼能解
熱甘可助陰非苦寒傷氣者之比如陽虛無火者其
不宜水無待言也其有陰虛火旺者元氣既衰精血
又涸則津液枯燥多見鼻乾唇烈舌胎黑色二便閉
結使非借天一之精何以濟燃眉之急故先以水水
解其標繼以甘溫壯水之劑培其本水藥並進無不

可也其有內真寒而外假熱陰盛格陽之證察其元
氣非甘溫大補則不足以挽回察其喉舌則些小辛