

驗方彙輯幼科卷之七

胎病論

胎毒論

胎毒論

胎毒論

胎毒論

胎毒論

胎寒論

胎寒論

胎寒論

胎熱論

胎熱論

胎熱論

不乳論

不乳論

不乳論

指迷七氣湯

助胃膏

集成疳積丹

天麻丸

六味地黃丸

調中散

茵陳地黃湯

大連翹飲子

浴體法



馬方真車

調元散

八味地黃丸

逕

海藏桂枝葛根湯

海藏柴胡防風湯

海藏桂枝川芎防風湯

海藏防風當歸湯

金匱蔓根桂枝湯

翔羊角散

海藏附子散

當歸四逆湯

暑症

却暑丹

瘧疾



南京中医药大学图书馆版权

清脾飲

痢疾

集成沆瀣丹

方見胎疾

集成三仙丹

咳嗽

集成金粟丹

附製南星法

丹毒

集成定痛丸

河車八味丸

幼科預宜修製應用丸藥七方

集成沆瀣丸

瀉青丸

集成金粟丹



理中丸

三仙丹

太極丸

愈風丹

乳子傷寒證治

桂枝防風湯

小柴胡大黃湯

理中湯

柴胡白虎湯

大柴胡湯

惺惺散

痢疾證治

集成沆瀣丹

見胎

集成三仙丹

同丸

倉廩湯

胃風湯

河間芍藥湯

黃連阿膠丸

胃苓丸

止痢保和丸

和中丸



加味四物湯

加味四君子湯

升麻湯

脫肛洗藥

參苓白朮散

補腎地黃丸

痢疾簡便方

六一散

又方

又方

集成至聖丹

治小兒各症

小兒喫生米茶葉

小兒兩腮腫硬

小兒臍風

小兒臍突

小兒臍濕不乾

小兒變蒸

小兒胎毒

小兒瘡毒

小兒初生不啼

小兒臍風等症



小兒初生三急病 口噤 撮口 臍風 天麻丸 定命丹

硃銀丸

治口噤撮口搽藥

又方 小兒病後不言

小兒初生無皮

小兒蝦蟆瘟

小兒夜啼症

小兒猝驚啼哭

小兒吐乳

小兒喫泥喫炭

小兒初生撮口臍風

赤遊風

小兒初生口泡

小兒馬牙

小兒重舌木舌

小兒牙疳

走馬牙疳

小兒口疳

小兒疳症仙方

疳疾生蟲

疳疾壞目

小兒腹中蟲疼

小兒火丹

走馬疳生肌方

鵝口白瘡

小兒初生肛門封閉

小兒囊腫

小兒三歲不能行走



小兒嘔吐泄瀉

小兒麴米食積

太和丸

小兒腮門腫

小兒中惡

小兒肝臟受疳

小兒腎受疳

小兒痞塊

小兒痢疾

小兒瘡疾

又外治方

小兒蟲疾

小兒瘡痘入眼

小兒防痘入眼

急驚痰迷

小兒慢驚

治急驚神方

治小兒痰熱方

小兒疳痢垂死

小兒冷疳

小兒臍腫

小兒中蟲毒

小兒火毒

小兒禿瘡

小兒疳腮

小兒耳爛

小兒重舌

小兒鎖喉

治小兒急慢驚風

初生小兒開乳藥方

月內胎驚

小兒遲語



小兒夜哭

治小兒陽物中蚯蚓毒方

洗兒方法

小兒初生稀痘方

小兒火毒

小兒疳積

小兒驚風

小兒疳積

小兒疳積

小兒疳積

小兒驚風

小兒疳積

小兒疳積

小兒疳積

小兒驚風

小兒疳積

小兒疳積

小兒疳積

小兒驚風

小兒疳積

小兒疳積

小兒疳積

小兒驚風

小兒疳積

小兒疳積

小兒疳積

小兒驚風

小兒疳積

小兒疳積

小兒疳積

小兒驚風

小兒疳積



驗方彙集精選幼科

壽春筱軒戴緒安集註

胎病論
陳飛霞輯

兒之初生有病亦惟胎弱胎毒二者而已矣稟受於氣之不足



南京中医药大学图书馆版权所有

也子於母一體而稟受不可不察如稟肺氣爲皮毛肺氣不足則皮毛怯寒毛髮不生稟心氣爲血脉心氣不足則血不華面無彩色受脾氣爲肉脾氣不足則肌不生手足如削受肝氣爲筋肝氣不足則筋不束骨機關不利受腎氣爲骨腎氣不足則骨節軟弱久不能行此皆胎稟之病隨其臟氣而求之所謂父強母生女必瘦父弱母弱生兒必弱故小兒頭頸解紳慢氣怯項軟頭傾手足痿弱齒生不齊髮生不黑行往坐立須人扶掖者皆胎稟不足之故也

胎毒

胎毒者卽父母命門相火之毒也命門者男子以藏精女子以繫胞道家謂之下丹田也二五之精妙合而凝純粹之精鑄液而成胎淫佚之火蓄之則爲胎毒矣蓋人而靜天之性也感物而動人之欲也成胎之後其母之關係尤緊凡思慮火起於心悲怒火起於肝悲哀火鬱於肺甘肥火積於脾淫縱火發於腎五欲之火隱於母胎獨結爲胎毒凡胎毒之發如蟲疥流丹濕瘡癰癤結核重舌木舌鶯口口瘡與夫胎熱胎寒搐胎黃胎之類是也臍風百日之痰嗽半載之眞搐一週之流丹此又毒之至酷至烈而不可解者也

胎寒

胎寒者母娠時患熱多服涼葯或過殮生冷令兒受之生後昏多睡間或睨乳瀉白此內因也或百日之內忍病懺慄目冷手足踈曲不伸腹痛啼叫不止此生後受寒得之治宜溫中散指迷七氣湯助胃膏三方主之爲佳

胎熱

胎熱者母娠時喜食辛熱炙煨之物或患熱病失於清解使兒受之生後目閉面赤眼胞浮腫呢呢作聲或啼叫驚煩遍身壯熱小便黃澁此胎熱也若不早治則丹瘤瘡癰由此而至宜集

成沆瀣丹徐服解之以平爲度

胎搐

胎搐者母娠時曾因驚恐氣傳於子生後頻頻身熱面青手足
搐掣牙關緊閉腰直身僵邪目多啼不乳此乃胎癇不治之證
如因身有熱而作者必先啼叫誰曰胎病由外因也宜天麻丸
後以六味地黃湯滋其化源搐胎自愈

胎黃

胎黃者而生下後面目渾身皆黃如金色或目閉身上壯熱大
便不通小便如莢子汁皮膚生瘡不思乳食啼哭不止此胎中



受濕熱也宜茵陳地黃湯母子同服以黃消爲度

胎肥

胎肥者遍身肌厚肉色通紅面色亦紅而黑睛多時時生痰目滿月以後漸漸肌腴五心熱而大便難白睛粉紅色此名胎肥是因在胎時母食甘肥濕熱太過流入胞中以至形實虛肥血分壅熱也宜加減大連翹飲外以浴體法浴之

胎怯

胎怯者生下無光色肌肉瘦薄大便白而身無血色目無精彩時時哽氣多噦者卽胎怯也非育於父母之暮年卽生於產多

之孕婦成胎之際元精既以澆漓受胎之後氣血復難長養以

至生來怯弱若後天調理得宜十可保全一二調元散助之

盤腸氣

盤腸氣者幼科稱內吊者是也因胎氣鬱積雍結營衛五臟

腑無一舒暢其氣不能升降築滯腸胃之間拽心而痛其身輒

輒如猫吐惡乾啼口開手足皆冷宜疎散通氣調中散及木香

丸

臍突

臍突者小兒多啼所致也臍之下爲氣海啼哭不止則觸動氣

氣動於中則臍突於外其壯光浮如吹起者捏之則微有聲用

亂髮燒灰枯礬等分爲末敷突臍上以膏葯貼之自消

馬氏金車米選 卷一
四
不乳者小兒生下二三日間忽然不乳當詢問之勿以不乳作
臍風治蓋臍風有多啼撮口之證此則無之但不乳耳有吐之
乳乳之又吐者或因拭口不淨惡臟入腸也宜用檳榔木香甘
草煎湯與服如啼哭不乳者腹痛也亦胎寒之證宜木香丁香
乳香當歸甘草煎湯與服如無上諸證故不乳宜問其母之乳
汁多少乳多者傷乳也宜少節之不久自思乳矣乳少者必有
他證也當細心察之

指迷七氣湯

一治腹痛寒熱多啼不乳等證皆由陰陽不升降氣道壅塞而

然並宜此方凡人身內之氣味呼吸出入無刻不與天地陰陽之氣通故六淫外襲則感而致病翕受之理也內氣閉塞則氣道不通升者不升降者不降寒熱由此而生也是方疎則臟腑神化無極最宜領會

廣皮

青皮

藿香葉

桔梗

莪朮

香附

法半夏

肉桂

益智

炙草

公丁香

右分兩隨加老薑三片紅棗三枚水煎母子同服

助胃膏

治胎寒內助胃氣虛弱胸膈脹滿