

傷寒直指目錄

卷之十類證

發熱

惡風

惡寒

頭痛

項強

體痛

自汗 上太陽經

不大便

不得卧

潮熱

譫語

鄭聲

發狂

循衣摸床

渴

發黃

發斑 上陽明經

口苦咽乾

口乾舌乾

頭眩目眩

耳聾

往來寒熱

胸脇滿痛

嘔吐乾嘔 上少陽經

卷十一類證二

腹滿

腹痛

上太陰經

但欲寐

嗜卧

咽痛

下利

吐利

上少陰經

氣上衝

吐衄

厥

少腹滿

舌卷囊縮

上厥陰經

喘

咳嗽

噫氣

胸

噦

短氣

結胸

痞

支結

臍結

心下鞭滿

心痛

懊懷

動氣

奔豚

除中

齲胃

煩躁

煩上各兼證



傷寒直格卷第十

金壇 王肯堂字泰畧纂本

雲間 李中梓士材刪潤

武林 林 瀾觀子重訂

上海 強 健順之校補

類證一

太陽經

發熱

發熱者無休止時也。寒熱者寒已而熱，熱已而寒也。潮熱者有時而熱，有時而寒。

時止如潮汛之不失期也。煩熱者虛而煩，際發熱也。

傷寒發熱證多，其不同者太陽邪氣拂鬱在表，多作

壯熱。若微熱者邪已衰也。陽明主乎潮熱，少陽主往

來寒熱。然亦皆有發熱者，其兼證必異，其施治亦殊。

也。少陰反發熱者。外未離乎表也。裏寒外熱者。陰盛格陽之熱也。太陰不言發熱。而有中風脈浮可汗之條。原陰有陰極陽生。先厥後熱之熱。是六經皆有發熱也。汗下後亦有發熱者。非邪猶在。即陰陽已虛也。合併病異氣病。亦無不發熱者。與瘧後發熱。皆宜詳本條之說。而各區別。毋混視焉。可矣。

太陽發熱。頭痛項強。腰脊痛。身痛。骨節痛。惡寒無汗。脈緊。

麻黃湯。惡風有汗。脈浮緩。桂枝湯。中風脈浮。發熱惡寒。體痛。

無汗煩躁。大青龍湯。表不解。心下有水氣。乾嘔發熱而欬。小青龍湯。

中風發熱而煩。有汗。裏證渴欲飲水。水入則吐。為水逆。五苓散。

散。大汗後脈浮。微熱消渴。小便不利。為太陽傳本。上方服。

桂枝湯。或下之。心下強痛。發熱無汗。心下滿痛。小便不。

利桂枝湯
茯苓木湯

六日大下後身熱不去心中結痛死

致湯九藥大下之

身熱不去微煩梔子乾薑湯傷寒發熱汗出

不解心下痞澀嘔吐下利

大柴胡湯發汗不解仍發熱心悸頭

眩身暈動振振欲擗地

真武湯發熱頭痛脈反沉不瘥身體

痛當救裏四逆湯

○陽明發熱日痛鼻乾不眠微惡寒頭額

痛脈洪長葛根湯

脈浮滑表裏有熱白虎湯吐下後熱結在裏

表裏俱熱惡風大渴煩躁脈洪數

白虎加人參湯陽明中風口苦

咽乾腹滿喘發熱惡寒脈洪緊

小柴胡湯加葛根若發熱汗出不

太反惡熱身重

柴葛解肌湯

陽明下之外有熱懊懷饑不能

仁頭汗梳子 太陽三日發汗不解蒸蒸發熱調胃承陽

明汗多微發熱惡寒熱不潮外未解也未可與大承氣其

腹大滿不通小承氣 小便不利大便乍難乍易時有微熱

喘冒不卧大承氣 陽明發熱汗多急下之上方 六七日日中不

了了睛不和無表裏證大便難身微熱急下之上方 無表裏

證發熱七八日雖脈浮數可下之已下脈數不解善饑不

大便有瘀血也抵 脈浮而遲表熱裏寒下利清穀四逆

○少陽發熱耳 脇痛寒熱嘔口苦頭角痛脈弦數小柴

傷寒頭痛發熱上方 熱者屬少陽上方 嘔而發熱上方 四五日

身熱惡風頸項強而滿而渴。上方傷寒中風狂來寒熱胸

脇滿不欲飲食。煩喜嘔。或不渴。外有微熱。小柴胡去人參加桂六

七日發熱微惡寒。又節項疼微嘔。心下支結。柴胡桂枝湯○少

陰始得之。反發熱足冷脈沉。麻黃附子細辛湯下利清穀裏寒外

熱。取逆脈微欲絕。反不惡寒而赤色。通脈四逆湯吐利手足

不死。脈不至。少陰。○取陰下利清穀裏寒外熱汗出而厥。通脈四逆湯

大汗出熱不去內拘急四肢疼下利厥逆惡寒。四逆湯嘔而

脈弱小便復利微熱見厥難治。上方先取復發熱下利必自

以汗出必喉痺口苦發熱不惡寒而渴為溫病發汗已

猶灼熱為風温

節菴翁翁發熱為表熱是風寒客於皮
膚邪氣鬱於外表熱而裏不熱也取浮

緊無汗宜發表浮緩有汗宜解肌蒸蒸發熱為裏熱是陽
邪陷入陰中裏熱而表不熱也脈沉實而渴宜下之其在

半表裏者表熱未罷邪氣傳裏而裏未作實則表裏俱熱
脈必弦數宜和解太陰厥陰皆不發熱惟少陰有反發熱

是未離於表也麻黃附子細辛湯若發熱煩渴小便赤脈
浮大此表裏俱見也五苓散利之汗下後發熱者大汗則

損氣氣損則陽微致脈虛而惡寒天下則傷血血傷則陰
弱故脈濡而發熱此誤汗誤下如此也若陰陽俱虛熱不

止者汗下後復熱脈躁亂者下利熱不止者皆死矣○復
菴謂陰不發熱惟少陰發熱有二證初得病即見證發熱

惡寒頭不疼宜麻黃附子細辛湯若下利清穀身熱躁擾
裏寒外熱乃陰盛也陽宜四逆湯附子理中湯蓋陽邪傳

陰經而利者是利陽陷入裏外所以無熱陰邪入陰經
而利者乃裏寒利寒既在裏為主則陽氣必客於外而

以反發也要知此而熱者頭必疼發於陰而熱者頭
不痛為驗乙乙發後只惡寒者為虛虛乃表虛是汗出

太過所謂月時則一寒宜芍藥附子甘州湯發汗後只惡
 然者為實賢乃又表解而裏不消所謂陰微則發熱
 宜大柴胡湯或承氣湯又汗下後陰陽不相入水火不
 相濟致餘熱未不可更用冷藥其人已虛虛能生熱宜
 小建中湯加當歸一錢或四君子加黃芪或十全大補其
 營衛虛甚者真武湯審是邪熱未解雖經汗下却不畏寒
 者宜竹葉石膏湯○副真仲景論中三陰皆有發熱天抵
 陰證雖發熱必有手足厥冷下利清穀脈沉之跡與陽證
 目不類

惡風

衛氣者所以溫分肉充皮毛肥腠理司開闔者
 也風邪中於衛則腠理不密故惡風惡寒者不

當風而時自畏怯惡風者居密室之中則無所畏惟
 當風則漸然惡也惡寒者有陰陽之別惡風惡寒屬於
 陽所以三陰經證無惡風也裏證雖
 具而惡風未罷者當先解其外也

陽熱汗惡風

麻黃湯

有汗惡風

桂枝湯

項背強几几反汗出

風 桂枝加葛根湯 無汗惡風 葛根湯 汗多亡陽惡風小便難四肢

急難屈伸 桂枝加木附湯 吐下後不解表裏俱熱時惡風大渴而

煩 白芍加人參湯 四五日身熱惡風頸項強脇下滿而渴 小柴胡湯 風

濕相搏骨節痛短氣小便不利身微腫自汗惡風 甘州附子湯

惡寒 寒邪客於營衛致惡寒身雖熱不欲去衣由陰氣上入陽中或陽微或風虛相搏而致也惡寒

一切屬表雖裏證悉具而微惡寒者亦表未解當先解其外俟不惡寒方可攻裏然雖屬表亦有虛實之

分汗出惡寒為表虛宜解肌無汗惡寒為表實可發汗若無熱惡寒脈沉細陰證也宜溫裏治之

太陽發熱無汗一寒 麻黃湯 中風自汗惡寒 桂枝湯 中風脈浮

緊發熱惡寒身痛汗煩躁 大青龙湯 八九日如瘧熱多寒少

脉浮緩愈取微而惡寒陰陽俱虛也不可更發熱惡寒熱

多寒少脉微弱陽也不可更汗桂枝二越婢一湯取浮目汗小

便數心煩脚掣急微惡寒誤與桂枝必取五六日頭汗出

微惡寒心下滿手足冷不欲食便數脉細為陽微結有表

復有裏也小柴胡湯六七日發熱微惡寒更節煩疼微嘔心下

交結柴胡桂枝湯發汗病不解反惡寒虛故也芍藥附子甘艸湯下後

復汗振寒脉微細內外俱虛也當歸四逆湯真武湯下後脉促胸滿

微惡寒桂枝去芍藥加附子湯大下復汗心下痞惡寒表未解也不

先攻痞解表桂枝湯攻痞心下痞復惡寒汗出附子瀉心湯

陽明脈遲汗出多微惡寒桂枝湯陽明中風口苦咽乾腹

滿喘發熱惡寒脈浮緊小柴胡湯陽明汗多微發熱惡寒外

未解也其熱不潮未可與大承氣若腹大滿不通小承氣湯

○少陽頭汗出微惡寒小柴胡湯○少陰無熱惡寒理中湯

下利惡寒而踈四逆湯真武湯大汗出熱不去內拘急四肢

疼下利厥逆惡寒四逆湯○陽明背微惡寒口燥渴心煩白虎

加人參湯○少陽口中和背惡寒附子湯○少陰惡寒身踈而利

手足逆冷者不以四逆惡寒身踈脈不至不煩而踈者死

損發太陽病在表故惡寒少陽半表半裏故微惡寒陽明在裏本不惡寒或惡寒者與太陽合病也三陰惟少陰有

惡寒之證。然少陰惡寒。亦有二發。於陰者。無熱而惡寒。宜溫之。理中。四逆類。若下利惡寒而墜。手足溫者。小建中類。惡寒而墜。時自欲去衣被。陽氣將復。活人云。宜大柴胡。趙氏謂宜溫散陰邪。導引真陽。汗出而解。若下之。不能解。表反虛其裏。惡之邪內陷矣。雖脈浮滑。內寒。亦未可遽用大柴胡。必先解表。使惡寒證罷。而後用之。至於太陰自利不渴。厥陰下利。厥逆。俱成惡寒。太陰宜理中。厥陰宜四逆。夫太陰厥陰。本無惡寒。今或惡寒者。陰入陰者也。特少陰為多耳。○背惡寒者。陽弱也。有二證。少陰以陰寒氣盛。不能消耗津液。故口中和。三陽合病。以陽氣陷入津液已涸。故舌乾口燥。少陰附子湯。三陽合病。白朮湯。○面陽大抵太陽惡寒。亦不可過覆衣被。及迎火氣。惡寒熱相搏。脈道沉伏。愈令人寒甚。但飲以和表之藥。自不惡也。若婦人尤忌迎火。惡寒氣入血室。結聚。鍼藥所不能治也。

頭痛

頭痛。腦後痛者。太陽也。頭額痛者。陽明也。頭角痛者。少陽也。頭痛專主表。太陽為病。屬表。故太

陽經獨多。三陰脈至頭而還。故無頭痛。惟厥陰會於巔。故亦有頭痛。然却無身熱。與陽證自不同也。若風

溫病在少陰濕溫病在太陰而頭反痛及陰毒亦然此疾與氣逆壅而上氣不得降故頭痛是又不可拘拘為也內曰頭痛亦止有時外曰頭痛常常有之必傳入裏方罷

太陽頭痛有汗惡風桂枝湯無汗惡寒麻黃湯不大便六七日

頭痛有熱小便清如不在裏當頭發汗若頭痛者必與桂枝

湯服桂枝湯或下之仍頭項強痛發熱心下滿痛小便不

利桂枝去桂加茯苓白朮湯頭痛心下痞鞅滿引脇下痛乾嘔短氣汗

出不惡寒表解裏未和也十棗湯○二病發熱頭痛脈反

沉不差體痛當心裏四逆湯○陽明頭額痛日痛鼻乾不眠

脈微洪葛根解肌湯表裏大熱煩渴頭痛如破石膏湯頭

痛不惡寒反惡熱大便實

調胃承氣湯

潮熱譫閉渴而頭痛脈

沉數有力

小承氣湯

身熱頭痛救水不欲咽必發衄脈數

者

犀角地黄湯 茅花湯

○傷寒頭痛發熱脈弦細屬少陽

少陽頭

角痛脈弦數

並小柴胡加川芎

膈上有涎頭痛胸滿寒熱脈弦而

不大

承翳散

○太陰頭痛氣逆有痰

二陳加枳實芎辛

○少陰頭痛

足寒氣逆

麻黃附子細辛湯

○厥陰乾嘔頭痛吐涎沫

吳茱萸湯

厥陰

頭痛脈緩為欲愈

小建中湯

○熱病後頭痛不止

石膏湯

○濕

家鼻塞頭痛

承翳散搐鼻黃水出即愈

○兩感頭痛口乾煩滿而渴與

月痛極連胸手足寒者真頭痛也皆不治

復菴三陽有頭痛三陰無頭痛