

本草綱目 十四

卷九

黑之一 五黑

卷三十

黑之二 崇

卷卅一

黑之三 藜

卷卅二

黑之四 菘



本草綱目果部目錄第二十九卷

李時珍曰、木實曰果、草實曰蓏、熟則可食、乾則可脯、豐儉可以濟時、疾苦可以備藥、輔助粒食以養民生、故素問云、五果爲助、五果者、以五味五色應五臟、李杏桃栗柰是矣、占書欲知五穀之收否、但看五果之盛衰、李主小豆、杏主大麥、桃主小麦、栗主稻、柰主禾、禮記內則列果品、棗根、

榛瓜之類、周官職方氏辨五地之物、山林宜阜物、

柞栗

之川澤宜膏物、菱芡丘陵宜核物、梅李之屬、甸師掌野果

蓏、場人樹果蓏珍異之物、鉢時藏之、觀此則果蓏之

土產常異性味良毒、豈可縱嗜欲而不知物理乎。於
是集草木之實、號爲果蓏者爲果部凡一百二十七
種分爲六類曰五果曰山曰夷曰味曰蓏曰水

舊本
果部

三品共五十三種今移一種入菜部四種入草部自
水部移入併附三十種草部移入四種菜部移入

種外類

後入四種

神農本草經十一種

染陶弘景註

名醫別錄十七種

同上

唐本草十一種

唐蘇恭

本草拾遺二十種

唐陳藏器

海藥本草一種

唐李珣

食性本草一種

唐陳士良

食療本草一種

唐孟詒

開寶本草十九種

宋馬志

嘉祐本草二種

宋掌禹錫

圖經本草五種

宋蘇

日華本草二種

宋人大明

食物本草一種

明庄

日用本草一種

元吳瑞

本草會編一種

明方

本草綱目三十三種

明李時珍

附註

魏吳普本草

李當之本草

朱雷效炮炙論

齊徐之才藥對

唐甄權藥性

孫思邈千金

唐蕭炳四聲

楊楫之刪繁

蜀韓保昇重註

宋寇宗奭衍義

唐慎微證類

金張元素珍珠囊

元李杲注象

王好古湯液

朱震亨補遺

明寧原食鑑

周憲王救荒

陳嘉謨蒙筌

果之一

五果類十一種

李

別錄
徐李附

杏

別錄

巴旦杏

綱目

梅本經

櫻梅

綱目

桃

本經

栗

別錄

天師栗

綱目

棗

本經

仲思棗

寶

苦棗

食性

右附方舊一百一十三新一百零八



本草綱目果部第二十九卷

果之一

五果類一十二種

李

別錄
下品

釋名嘉慶子

時珍曰按羅願爾雅翼云李乃木之多子者故字從木子竊謂木之多子

芥多矣何獨李稱木子耶

按素問言李味酸歸肝

東方之果也則李於五果屬木故得專稱爾今人呼乾李爲嘉慶子

按韋述兩京記云東都嘉慶坊有美李人稱爲嘉慶子久之稱謂既熟不復知其所自矣梵書名

李曰居陵迦

集解

弘景曰李類甚多京口有麥李麥秀時熟小而肥甜核不入藥姑熟有南居李解核如杏

子形者入藥爲佳志曰李有綠李黃李紫李李水李並甘美堪食核不中用有野李味苦核仁入

本草綱目果部
藥頌曰李處處有之郭璞註爾雅休乃無實李也
一名趙李座音磋乃接慮李也陶氏所謂南居李
溝道與麥同熟驗乃赤李也宋氏所謂南居李
不復識醫家但用核若杏核者宗奭曰李樹夫者
高丈許一種御李子大如櫻桃紅黃色先諸芥熟
醫家用者亦少時珍曰李綠葉白花樹能耐久其
種近百其子大者如杯如卵小者如彈如櫻其味
有甘酸苦澀數種其色有青綠紫朱黃赤裸綿膩
脂青皮紫灰之殊其形有牛心馬肝柰李杏李水
李離核合核無核區縫之異其產有武陵房陵諸
李早則麥李御李四月熟遲則晚李冬李十月
李早則麥李御李四月熟遲則晚李冬李十月
一月熟又有季春李冬花春實也按王禎農書云
北方一種御黃李形大而肉厚核小甘香而美江
南建寧一種均亭李紫而肥大味甘如蜜有掌李
熟則自裂有餚李肥枯如餚皆李之嘉美者也今
人用鹽曝糖藏蜜煎爲果惟曝乾白李有益其法
夏李色黃時摘之以鹽浸汁合鹽
晒萎去核復晒乾薦酒作飴皆佳

實氣味苦酸微溫無毒

時珍曰李味甘酸其苦能
水者不可食不沉水者有毒

不可食大明曰多食令人臚脹發虛熱說曰論李

食之令發痰瘡不可合雀肉食合蜜食損五臟

毒曰不可合漿水食發霍亂溫氣而然服木大忌之

主治曝食去痼熱飴中

一錄去骨節間勞熱孟思曰

邈

說肝病宜食之

核仁氣味苦平無毒主治僵仆踒折瘀血骨痛劉氏曰

令人好顏色吳普治女人少腹腫滿利小腸下水氣

除浮腫甄權

蘇頌

附方

舊一新一

女人面黑

用李核仁去皮細研以雞子白和如稀鷄塗之至旦以漿

水洗去後塗胡粉不過五六日効忌見風崔元亮海上方

蠍蟲蟹痛苦李仁嚼塗之

良 古

根白皮修治

時珍曰李根皮取東行者刮去皺皮
蒸熟入藥用不言何等李根

亦不言其味但藥性論云大藥用苦李根皮

而張仲景治奔豚氣奔豚湯中用甘李根白皮則

甘苦二種

皆可用與

氣味大寒無毒

天明曰涼無毒

主治消渴止心煩逆奔豚

氣錄

別治瘡普煎水含漱治齒痛

弘景煎汁飲主赤白

痢大明灸黃煎湯日再飲之治女人卒赤白下有驗

益治小兒暴熱解丹毒

時珍苦李根皮味鹹治脚下

氣主熱毒煩躁煮汁服止消渴

甄甄

附方

新 小兒丹毒

從兩股走及陰頭用李根燒爲
末以田中流水和塗之 千金

咽喉卒塞

無藥處以皂角末吹鼻取嚏仍以李樹
近根皮磨水塗喉外良驗

菽潤雜記

花氣味苦香無毒主治

令人面澤去粉澤黯黯

附方

新 面黑粉滓

用李花梨花櫻桃花白葵花白
蓮花紅蓮花旋復花秦椒各六

兩桃花木瓜花丁香沉香青木香鍾乳粉各三兩

珍珠玉屑各二兩蜀木花一兩大豆末七合爲細

末瓶收每日鹽蘸用洗手面

百日光潔如玉也 普濟才

葉氣味甘酸平無毒主治

小兒壯熱痞疾驚癇煎

湯浴之良

大明

附方

新 惡刺瘡痛

李葉棗葉搗汁
點之妙 千金

樹膠氣味苦寒無毒主治目翳定痛消腫時

珍

附錄徐李

別錄有名未用曰生太山之陰樹如李而小其實青色無核熟則采食之輕身

益氣延年時珍曰此卽無核李也唐崔奉國家有之乃異種也謬言龍耳血墮地所生

杏

下品別錄

名甜梅

釋名

甜梅

時珍曰杏字篆文象子在木枝之形或云從口及得可者並非也江南錄云楊

行密改杏

集解

別錄曰杏生晉川山谷五月采之頌曰今處

處有之有數種黃而圓者名金杏相傳種出自濟南郡之分流山彼人謂之漢帝杏言漢武帝上苑之種也今近汴洛皆種之熟最早其扁而青黃者名木杏味酢不及之山杏不堪入藥杏仁以從東來人家種者爲勝宗奭曰金杏深赭色核

大而扁乃接成者其味最勝又有白杏熟時青色
白或微黃味甘淡而不酢生杏可晒脯作乾果食
之山杏輩只可收仁用耳每珍曰諸杏葉皆圓而
有尖二月開紅花亦有千葉者不結實甘而有沙
者爲沙杏黃而帶酢者爲梅杏青而帶黃者爲柰
杏其金杏大如梨黃如橘西京雜記載蓬萊杏花
五色蓋異種也按王禎農書云北方肉杏甚佳赤
大而扁謂之金剛拳凡杏熟時榨濃汁塗盤中晒
乾以手摩刮收之可和水調
炒食亦五果爲助之義也

實氣味酸熱有小毒生食多傷筋骨別錄頤曰杏
醉類桃者味甘宗奭曰凡杏性皆熱小兒多食致
瘡瘍脹熱扁鵲曰多食動宿疾令人目盲鬚眉落
源曰多食生痰熱昏
精神產婦尤忌之

主治曝晡食止渴去冷熱毒心之果心病宜食之

思邈

核仁修治

別錄曰五月采之弘景曰凡用杏仁以湯浸去皮尖炒黃或用麪麸炒過日

几用以湯浸去皮尖每斤入白火石一斤烏豆合以東流水同煮從巳至午取出晒乾用瓶珍存

治風寒肺病藥中亦有連皮尖用者取其發散也

氣味

甘苦溫冷利有小毒兩仁者殺人可以毒狗

震亨曰杏仁性熱因寒者可用

思邈曰杏仁作湯如白沫不解者食之令氣壅身熱湯經宿者動冷

氣時珍曰凡杏桃諸花皆五出若六出必雙仁爲

其反常故有毒也○徐之才曰得火良惡黃芩黃

芪葛根畏蘿蔔

主治欬逆上氣雷鳴喉痺下氣產乳金瘡

寒心竇豚

本驚癲心下煩熱風氣往來時行頭痛

解肌消心下急滿痛殺狗毒

別解錫毒之治腹癰
錄解錫毒之治腹癰

不通發汗主溫病脚氣欬嗽上氣喘促入天門冬

煎潤心肺和略作湯潤聲氣

甄權除肺熱治上焦風

燥利胸膈氣逆潤大腸氣秘

元素殺蟲治諸瘻疥消

瞳去頭面諸風氣瘡炮

時珍

發明

元素曰杏仁氣薄味厚濁而沉墜降也陰也入手太陰經其用有三潤肺也消食積也散

滯氣也

巢曰杏仁散結潤燥除肺中風熱欬嗽杏

仁下喘治氣也

桃仁療狂治血也俱治大便秘當

分氣血

晝則便難行陽氣也夜則便難行陰血也

故虛人便閉不可過泄

脈浮者屬氣用杏仁陳皮

脉沉者屬血用桃仁陳皮

手陽明與手太陰爲表裏責門主往來魄門主收閉爲氣之通道故並用

陳皮佐之好古曰張仲景麻黃湯及王朝奉治傷寒氣上喘逆並用杏仁者爲其利氣瀉肺解肌也

時珍曰杏仁能散能降故解肌散風降氣潤燥消積治傷損藥中用之治瘡殺虫用其毒也按醫餘

云凡索麵豆粉近杏仁則爛墳一兵宮食粉成積

醫師以積氣丸杏仁相半研爲丸熟水下數服愈

又野人閒話云翰林學士辛士遜在青城山道院

中夢皇姑謂曰可服杏仁令汝聰明老而健壯心

力不倦求其方則用杏仁一味每鹽漱畢以七枚

納日中良久脫去皮細嚼和津液頓燼日日食之

一年必換血令人輕健此申天師方也又楊士瀛

直指方云凡人以水浸杏仁五枚五更端坐逐粒

細嚼至盡和津吞下久則能潤五臟去壅津驅風

明日治肝腎風虛之人帶青眼翳風痒之病珍按

杏仁性熱降氣亦非久服之藥此特其咀嚼吞納

津液以消積穢則可耳古有服杏丹法云是左慈

之方唐慎微收入本草云久服壽至千萬其說妄

誕可鄙今刪其粃謬之辭存之于不使讀者毋疑

其部

兩方

舊三十八

杏金丹

左慈秘訣云亦名草金丹
方出渾皇子服之長年不

死夏姬服之壽年七百乃仙去也世人不信皆由不肯精心修治故也其法須人罕到處宣用鑿斷

杏樹地下通陽氣二月除樹下草三月離樹五步作畦壟以通水亢旱則引泉灌溉有雪霜則燒火

樹下以救花苞至五月杏熟自落收杏六斗以
浸去皮及雙仁者用南流水三石和研取汁兩石
入斗去滓以新鐵釜用酥三斤以糠火及炭然釜
少少磨酥至盡乃內汁入釜釜上安盆盆上鑽孔
用弦懸車轄至釜底以紙塞孔勿令泄氣初着糖
火一日三動車轄以袞其汁五日有露液生十日
白霜起又二日白霜盡卽金花出丹乃成也開盆
灸乾以翎掃下棗肉和九梧子大每服三丸空心
燒酒下至七日宿疾皆除瘡盲攀跛瘍癰瘍瘡
腫萬病皆愈久服通靈不死云云衍文不錄○
顧

本草綱目卷二十九
日古方用杏仁修治如法自朝蒸至午便以慢火
微炒至七日乃收之每旦空腹噉之久久不止則
顏延年云是夏姬之法然杏仁能使人血溢少誤
過出血不已或云委頓故近人少有服者或云服
至二三年往往或瀉或

臍中出物皆不可治也

杏酥法

頌曰去風虛除百病搗爛杏仁一石以水

酒二石研濾取汁一石五斗入白蜜一斗

五升攪匀封於新甕中勿洩氣三十日看酒上酥

出卽掠取納瓷器中貯之取其酒滓團如梨大置

空屋中作格安之候成飴脯狀旦服一枚以前酒

下○藏器曰杏酥服之潤五臟去痰嗽生熟喫俱

可若半生半

熟服之殺人

又法

宗頤曰治肺燥喘熱大腸秘潤五臟用杏七
去皮研細每一升入水一升半搗搘汁入生

薑四兩甘草一寸銀石器中慢火熬成稀膏

入酥二兩同收每夜沸湯點服一匙

行義