

噎膈門

呃逆門

心胃門

肝氣門

疝氣門

腹脹黃腫門

醫方

易簡

卷

捌 染

鼓脹門

蠱毒門

蟲症門

痞積門

目疾門

耳疾門

鼻疾門



增訂醫方易簡卷七

噎膈門

治隔食妙方

用老生薑十數斤以布袋盛之將袋口紮

緊放大便缸中浸四十九天取出提往急流水處漂洗

潔淨切片放屋上晒乾四十九天以新瓦焙爛研細末

每服一兩開水冲服至入日而病卽瘥飲食大進如常

不復爲憂矣此方必須預先備製庶免期及不應手耳

其大便缸必須淨人糞不可雜及畜糞在其
中如有雜亂糞之厠切不可放至要至囑

又方

用女人用過吃油多年之頭梳一隻用刀劈碎新

瓦焙乾研細末每服一錢開水冲服數次

立能飲食大
進而無患矣

膈食 小兒胎髮團一陰陽瓦焙存性研細末陳酒送下

膈食 凡患此症胸前有二小骨漸次交合則不能飲食

而死 取鷺血不用鹽乘熱飲之數次則此二骨俱化

飲食可進 又牛乳人乳薑汁薤汁和勻常服食牛鷺

或飲自已小便去頭尾常服自愈

五噎膈氣 白鷺毛燒灰酒服

噎食開關 白礬砂一錢五分青黛一錢好沈香二錢三味研細末

聽用白馬尿一斤白蘿蔔一斤生薑半斤取汁共入銅鍋內熬

成膏每服用膏三匙加前藥末一分酒下一日三服可

以開關如係反胃以黑驢尿一斤易馬尿



噎膈酒

葶薺

四兩

厚朴

一兩

陳皮

一兩

白豆蔻

一兩

白梅

四兩

橘餅

一兩

冰糖

四兩

蜜

二兩

白酒漿

三斤

燒酒

十數日早中晚飲之

噎膈不通

野貓頭骨炒爲末酒服

噎膈反胃食水穀不進

夏月中伏天糞坑中蛆愈大

愈好撈出以長流水洗淨用桶瓦二個盛蛆在內鹽水

和泥將瓦兩頭封固炭火煨一柱香至蛆身黃色如未

黃再入砂鍋內炒黃最忌銅鐵器每服用黃蛆一錢五

分細松蘿茶七分五厘廣木香

五厘

製豆扣

四分

共研

極細末五更時空心溫燒酒半茶鍾調服如不能飲酒



水酒調下切忌麵食葷腥

噎膈反胃

糯米和牛涎拌作小丸煮熟食之取牛涎法

以水洗淨老牛口用鹽塗之少頃涎自出

愈後戒食牛肉

又方

大枳殼

破兩半箇去根

阿魏

六分

杏仁

十粒

研勻裝殼內對合

綿紙包七層紮緊砂鍋內大火煮半日去杏魏留枳殼

切片曬乾炙研末一個作一服燒酒調送

噎膈食不下痞塞不通

白蜜一兩滾湯調服

噎隔初起

老薑一斤童便浸七日土內埋七日洗淨爲末

白朮

各土炒爲末

飯丸梧子大每晨空心服一錢米湯下

又方

貓初生衣胞以新瓦焙乾研末每服一二分好酒

送下口含竹筆管睡恐傷牙及咳嗽米粒不下者五

服亦愈取貓胞法貓將產以小木枷枷之使其不能食方

公英根大如拳旁有人形拱抱者佳搗汁酒服神效

翻胃噎膈 老生薑數斤將粗麻線紮縛連串不可穿損置

糞窖底浸七日不須水洗在露天掘一地坑約二尺深

將薑安放仍以原土覆蓋七日取出掛透風簷下勿令

日晒及著雨水七日將薑放瓦上用烈炭火煨煉存性

每斤只煉三錢待冷用乳硃搗為細末秤作分一包用

紙包每日五更用無灰老酒盃調服一包服二十餘日

即愈不宜以他藥雜之又用枳殼一個杏仁七粒將杏仁包



在枳殼內放甑上蒸過以三炷香爲度焙乾研末

黃酒調服

噎膈翻胃

用花椒樹上蚕繭內蛹子以老瓦焙酥去盡

用蛹子七枚研末米酒調服數次可以斷根進食

又方

柿餅放乾飯上蒸食不用水亦勿雜以他物

十日即愈

翻胃

白豆蔻

去殼二錢

檀香

二錢

川鬱金

二錢

共爲末每服七分

薑汁調藥陳紹酒一盃送下

翻胃

白蘿蔔

一個

剗空入壯年人糞在內以竹簽簽住炭

火煨至粉紅色研末不拘茶酒飯食拌入少許頻服

又方

取驢尿服二合吐稍減再服二合白漸不吐緩緩

以粥食之即漸愈

噎食轉食 黃鱔魚一條用無灰黃酒量魚大小酌酒多

寡煑乾爲度連皮帶骨用淨砂鍋焙存性研爲細末病

勢重者每服錢三輕者每服二錢五分爲止不可多用

噎食黃酒調服若在上半月其效尤速若在下半月其

效較遲三服見功五服全愈愈宜薄多淡飲食性續吃

稀粥忌一切思慮籌畫氣惱葷腥椒酒色慾房勞尤煩

之 轉食用旋花水送下

噎食不下 鳳仙花子合酒浸三夜晒乾爲末酒糊丸录

豆大每服六丸溫酒下不可多服 或白鷺尾毛燒灰

存性每服一錢米湯下

治噎食方 用碓嘴上細糠蜜丸如彈子大每服一九口

含化津液嚥下極效

又杵頭糠以布包時時拭齒男

煎湯時時呷之即效

噎食即噎隔症俱名隔食

噎食除根方

用大木中蛀木蟲七個瓦焙研末酒冲服

或加茴香蟲七枚更妙

噎食

生薑不拘多少五月五日午時用布袋裏好浸於不見

天之東厠內四十九日取起掃去穢物懸空即晒至極

乾爲末病二年者用薑末三分病一年者用薑末二分入麝

香一分厘仲白滾水吃下只一服而愈服藥後不可急

吃飯須先飲米湯一日次日方可少吃稀粥五六日後

漸漸吃飯總以少食為妙忌葷腥鹽醬并醬小菜五十

日永不再發

又方

五穀蟲以麻布包好水內洗淨炒黃色加木香

沈香共研為末燒酒調和服

又方

生薑汁

鍾一

韭菜汁

鍾一

童便

鍾一

同放大碗內入鍋中

水煮數沸候冷取出露一宿重煎溫服日日如是

為止

噎方

白馬尿

斤一

地骨皮

斤一

白蜜

斤一

羊糞

四十九粒

以上用水

升七滾數滾濾去渣再熬至

碗一

為度每服

鍾一

忌馬齒莧蒸

鍋水

卒噎

祀竈飯取一粒食之即下

反胃噎疾

干槌花

即鑿柄木

燒灰酒服

或鯉魚一尾

童便

浸一夜炙焦研末同米煮粥食之

或羊屎

錢五

童便

鐘煎六分沉去滓分三次服

反胃吐食

凡朝食暮吐暮食朝吐

用甘蔗汁

升七

薑汁

一和勻日日細呷之

又乾柿

三枚

連蒂搗爛酒服甚效

切勿雜以他藥

或竈中土年久者為末米飲服

三錢

翻胃吐食

抱出鷄子殼為末酒服二錢

又方

烏雄鷄

一隻

治淨入胡荽子

半斤

於腹內烹食

食二隻即愈

翻胃嘔吐

生薑

三斤

鐵絲穿串入糞坑內四十九日取起

長流水擺淨晒乾為末陳米麵打糊為丸如梧子大每

服二

三 丸滾水下

又方

白礬半生半熟不拘多少冷水調下

神治隔食翻胃痢疾水洩等症

紅豆蔻

去皮

肉豆蔻

去皮

豆蔻

用

粗紙包

白豆蔻

去殼

高良薑

切片

研末

甜玉桂

去粗

公丁香

各

研細末戥准

五分

先用上白糖

四兩

水一飯碗

入銅鍋內煎

化再入鷄子清

二個

煎十餘沸

入燒酒

一斤

以火點着燒酒

片刻用紗羅濾去渣

入磁瓶內

用冷水冰去火氣

隨量

少少飲之無不應效

韭汁飲

治血膈

或因跌撲或因大怒血積胸膈所致

生韭汁

一鍾

無灰酒

一鍾

共一處煮熟溫服之

二神膏 治一切痰膈食膈神效 黑砂糖斤一連皮生薑

斤一二味共搗如泥成膏入磁罐封口埋乾燥地下七天

每日調滾送下

壯脾健胃

白羊肉

二斤切碎梁米一升同煮下五味作粥食

健脾能食

猪舌和五味煮汁食之

脾弱不食

大黃豆二升大麻子三升炒香爲末每服合飯下

日四

服孕婦忌之

呃逆門

呃逆不止 黃蜡燒烟燻口中 二三次卽止 或燒酒

盃新汲水一盃和服

諸氣呃逆

橘皮

去瓢二兩

水一大碗煎五分燉服

呃逆

開口川椒

四兩去子

麵糊丸如桐子大每服十九食

以醋湯下

又方

荔枝七個連殼核燒枯爲末食遠以白湯送下

嘔逆

橘皮

四兩生薑

兩

加開口川椒粒水二大碗煎至

碗徐徐呷之卽止

中酒嘔吐煩亂

煮赤小豆汁徐徐飲之



乾嘔 蔗糖 薑汁各一盃和勻服之

又方 生薑頻頻嚼之

治熱嘔方 若服熱藥愈嘔卽用 麥冬 蘆根 石羔

粳米 炙草 水煎服立止

治男婦嘔吐不止用 屋簷滴水墻處之小石子 粒七 煨薑

三門斗灰一撮以開水沖服婦人加胡椒粒七 綠豆 粒七 柿

柄七 煎濃汁同前三味沖服卽愈

治食入卽吐不食亦嘔症 此寒嘔也 法半夏 丁香

白蔻 砂仁水煎以生薑打濃汁湯一碗對服效驗

食物直出 梔子二十粒微炒去皮煎湯服

食物作酸 蘿蔔生嚼數片 或生菜嚼之亦止

食物酸心 核桃嚼爛以生薑湯下

久患吞酸諸藥不效 用魚鱸 鮮活魚薄切洗淨血味腥沃以蒜薤薑醋五味而食

是也 食之即愈勿夜食及飲冷水

吞酸不止口吐清水或吐苦水 用生何首烏燉肥老母

雞食之立效

口吐清水 艾葉煎汁飲之



心胃門

心痛

凡一切心痛均治

不拘男女老少

大川芎

一個

爲末燒酒服

之

或舊氈襪後跟一對燒灰酒服

或馬兜鈴

一個燒

存性研末溫酒調服怒痛不止用羊毫敗筆頭

三個

燒灰

無根水服立效

年久者濃汁煮小蒜食飽勿著鹽

心下大痛者胡椒

豕豆四十九粒研爛酒下神效

心痛

硃砂

木香

各二錢

黃占

一兩

化開爲丸如豕豆大每

燒酒服七丸

又方

真麻油一鍾煎入燒酒一小盃乘熱飲之

又方

飯粒粘白礬爲丸每服三分